



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.



À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



























12

215a

4/

HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

DE L'IMPRIMERIE D'ABEL LAMOE,
RUE DE LA HARPE, N.º 78.



HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

PRÉSENTANT

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX, LEUR DISTRIBUTION, LEURS CLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS GENRES, ET LA CITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y RAPPORTENT;

PRÉCÉDÉE

D'UNE INTRODUCTION offrant la Détermination des caractères essentiels de l'Animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels, enfin, l'Exposition des Principes fondamentaux de la Zoologie.

PAR M. LE CHEVALIER DE LAMARCK,

Membre de l'Académie Royale des sciences de Paris, de la Légion d'Honneur, et de plusieurs Sociétés savantes de l'Europe ; Professeur de Zoologie au Muséum d'Histoire naturelle.

Nihil extra naturam observatione notum.

TOME QUATRIÈME.

PARIS,

CHEZ { DETERVILLE, Libraire, rue Hautefeuille, n.º 8.
VERDIÈRE, Libraire, Quai des Augustins, n.º 27.

Mars. — 1817.

171



592
L215a
v.4

(H.2)

HISTOIRE NATURELLE

D'ES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

LES SPHINGIDES

ou

LÉPIDOPTÈRES CRÉPUSCULAIRES.

Antennes en massue allongée , prismatique ou en fuseau. — Ailes horizontales ou en toit dans l'inaction.

Les *sphingides* qui , dans Linné , ne constituent qu'un seul genre qu'il nomme *sphinx* , semblent faire le passage des lépidoptères nocturnes aux lépidoptères diurnes. Les uns , en effet , ne volent que le soir et la nuit , tandis que les autres volent le jour , et même par un beau soleil. Leurs antennes vont en s'épaississant de la base vers le sommet , de manière à former , dans la plupart , une massue allongée , prismatique ou en fuseau , et terminée , soit par un filet court , soit par une pointe arquée et crochue. Mais les *sphingides* tiennent aux lépidoptères nocturnes en ce qu'ils ont leurs ailes horizontales ou en toit dans l'inaction , et qu'à la naissance des ailes inférieures , il y a un crochet subulé qui va s'insérer dans une boucle de la base des ailes supérieures.

Tome IV.

I

Dans les *sphingides*, les ailes supérieures sont presque toujours plus grandes et plus longues que les inférieures. L'abdomen est conique et nu dans les grandes espèces ; il est obtus avec une brosse dans les petites. Cette famille comprend huit genres qui paraissent très-distincts et que je divise de la manière suivante.

DIVISION DES SPHINGIDES.

- [1] *Antennes bipectinées, soit dans les deux sexes, soit seulement dans les mâles.*

Stygie.

Procris.

- [2] *Antennes simples dans les deux sexes.*

- (a) Palpes grêles, barbus ou hérissés.

Zygène.

Sésie.

Macroglosse.

- (b) Palpes larges, très-écaillés.

- (x) Troisième article des palpes peu distinct.

Une corne caudale sur le dos de la chenille.

Sphinx.

Smérinthe.

- (x x) Troisième article des palpes très-distinct.

Point de corne caudale sur le dos de la chenille.

Castnie.

STYGIE. (Stygia.)

Antennes bipectinées dans les deux sexes, à sommet
Deux palpes triarticulés. Trompe plus ou moins distincte.

Ailes oblongues, en toit. Port des zygènes.

Antennæ in utroque sexu bipectinatae; apice imbi. Palpi duo triarticulati. Proboscis plus minusve tincta.

Alæ oblongæ, deflexæ. Habitus zygænarum.

OBSERVATIONS.

Sous la dénomination de *stygie*, je réunis les aglaopès, glaucopides et les stygies de M. Latreille. Toutes ces angides ont le port des zygènes, et les antennes bipectinées dans les deux sexes. En cela, elles se distinguent des *oris* dont les antennes ne sont bipectinées que dans les mâles.

ESPÈCES.

Stygie polymène. *Stygia polymena*.

St. nigra: alis maculis luteis: anticarum tribus, posticarum duabus; abdomine cingulis duobus coccineis.

Zygæna polymena. Fab. *Sphinx polymena*. Lin.

Glaucopis. Latr.

Habite en Chine.

Stygie dos-bleu. *Stygia auge*.

St. sanguineo cæruleoque varia, lateribus sanguineo pilosis; alis fenestratis, posticè nigris.

Zygæna auge. Fab. *Sphinx auge*. Lin.

Habite en Amérique, sur le parthenium.

Stygie argynne. *Stygia argynnis*.

St. alis virescenti-atris: maculis aureis, posticis fuscis basi aureis.

Zygæna argynnis. Fab.

Habite au Brésil.

Stygie malheureuse. *Stygia infausta*.

St. alis fuscis: posticis internè sanguineis.

Zygæna infausta. Fab.

Engr. pap. d'Europe. pl. 103. n.º 152.

Aglaope. Latr.

Habite l'Europe méridionale.

5. Stygie australe. *Stygia australis*.

St. luteo fulvo fuscoque varia : ano barbato.

Stygia australis. Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 16. fig. 45

Habite dans le midi de la France.

PROCRIS. (Procris.)

Antennes bipectinées dans les mâles, simples ou un peu velues dans les femelles, avec le sommet nu. Deux palpes écailleux.

Ailes en toit.

Antennæ masculis bipectinatæ, feminis simplices vel tantum subhirtæ : apice imberbi. Palpi duo squamati.

Alæ deflexæ.

OBSERVATIONS.

Les *procris*, de même que les *stygies*, tiennent aux *zygènes* par leurs rapports, et sont remarquables en ce que leurs antennes sont bipectinées, au moins dans les mâles, ainsi qu'on le remarque ici. Sous cette coupe, je réunis les *procris* et les *atychies* de M. Latreille. Les premières ont les ailes longues et les palpes non velus, ne s'élevant pas au-delà du chaperon ; mais les secondes ont les ailes courtes et des palpes très-velus, qui s'élèvent davantage.

ESPÈCES.

1. Procris du statice. *Procris statices*.

P. viridi-cærulea ; alis posticis fuscis.

Sphinx statice. Lin.

Zygæna statice. Fab. *Procris*. Latr.

La turquoise. Geoff. 2. p. 130.

Habite en Europe, dans les prairies.

2. *Procris* du prunier. *Procris pruni*.

P. viridi-cærulea ; *alis posticis nigris*.

Zygæna pruni. Fab.

Engram. pap. d'Europe, pl. 103. n.º 151.

Habite en Allemagne, et aux environs de Paris.

Antennes simples dans les deux sexes.

ZYGENE. (*Zygæna*.)

Antennes simples, courbées en cornes de bélier, renflées en massue pointue vers son extrémité. Deux palpes pointus.

Ailes en toit : les supérieures oblongues. Larve dépourvue de corne. Chrysalide dans une coque.

Antennæ in utroque sexu simplices, clavæ apice subacutâ terminatæ, cornua arietina incurvatione simulantæ. Palpi duo acuti.

Alæ deflexæ : superioribus oblongis. Larva cornu nullo. Pupa folliculata.

OBSERVATIONS.

Les *zygènes* ont le vol court et diurne. Elles paraissent, ainsi que les genres précédens, plus rapprochées des bombyces que les sésies et les sphinx. Mais leurs antennes épaissies ou renflées vers le bout, les distinguent de toutes les phalénides, et les font ranger naturellement parmi les sphingides, dans le voisinage des sésies.

Dans la plupart des espèces, les ailes sont ornées de couleurs vives, le plus souvent rouges avec des taches noires, et ont un aspect assez agréable.

Les *zygènes*, en général, volent lourdement, et ne parcourent que de petites distances à chaque vol. Leurs chenilles n'ont point de corne, et ne se retirent point dans la terre pour se métamorphoser.

On trouve ces insectes sur les herbes, sur les fleurs des plantes les moins élevées.

ESPÈCES.

1. Zygène de la filipendule. *Zygæna filipendulæ*. Fab.

Z. alis anticis cyaneis : punctis sex rubris, posticis rubris : margine cyaneo.

Sphinx filipendulæ. Lin.

Sphinx. Geoff. 2. p. 88. n.º 13.

Habite en Europe, dans les prairies.

2. Zygène du lotier. *Zygæna loti*.

Zyg. alis anticis viridibus : punctis quinque rubris : posticis sanguineis : limbo cyaneo.

Zygæna loti Fab.

Engr. pap. d'Europe, pl. 18. n.º 158.

Habite en Europe.

3. Zygène de la scabieuse. *Zygæna scabiosæ*. Fab.

Z. atra ; alis anticis viridibus : maculis oblongis, approximatis, sanguineis ; posticis rubris.

Engr. pap. d'Europe, pl. 95 et 96. n.º 133—135.

Habite en Europe, sur la scabieuse des bois, la piloselle.

4. Zygène de l'esparcette. *Zygæna onobrychis* Fab.

Z. atra ; alis anticis cyaneis : punctis sex sanguineis oculatis, posticis rubris : limbo nigro.

Engr. pap. d'Europe, pl. 89. n.º 40.

Habite en Autriche.

5. Zygène de la bruyère. *Zygæna fausta*. Fab.

Z. alis concoloribus rubris : maculis nigris, margine nigro-connexis.

Sphinx fausta. Lin.

Engr. pap. d'Europe, pl. 100. n.º 142.

Habite en Europe.

Etc.

SÉSIE. (*Sesia*.)

Antennes cylindriques, un peu renflées et fusiformes vers le bout. Deux palpes.

Langue filiforme, rétractile.

Ailes horizontales, vitrées. Anus barbu et obtus. Vol diurne et rapide. Chenille dépourvue de corne.

Antennæ cylindricæ, versus apicem fusiformes. Palpi duo. Lingua filiformis, retractilis.

Alæ horizontales, subdivaricatæ, hyalino-fenestratæ. Anus barbatus. Volitus celer, diurnus. Eruca cornu nullo.

OBSERVATIONS.

Toutes les *sésies* sont beaucoup moins grandes que les sphinx, et néanmoins s'en rapprochent davantage que les *tygènes*. Elles ont le vol très-rapide, bourdonnent comme les mouches, et volent le jour et même par un beau soleil, tandis que les sphinx ne volent que le soir. Ces insectes se soutiennent en l'air, devant les fleurs, et paraissent alors presque immobiles en volant.

Les vraies *sésies* ont leurs ailes peu chargées d'écailles, et offrant des espaces nus, transparens, comme vitrés. Par leur aspect et leur petite taille, ces sphingides ressemblent à des abeilles, des guêpes, etc. Leurs larves n'ont point de corne, et vivent cachées dans l'intérieur des parties des végétaux.

ESPÈCES.

1. Sésie apiforme. *Sesia apiformis*. Fab.
S. alis fenestratis ; abdomine flavo ; incisuris atris ; thorax nigro : maculis duabus flavis.
Sphinx apiformis. Lin.
 Engr. pap. d'Europe, pl. 91. n.º 121.
 Habite en Europe.
2. Sésie tipuliforme. *Sesia tipuliformis*. Fab.
S. alis fenestratis : margine fasciæque nigris ; abdom. barbato nigro : incisuris alternis margine flavis.
Sphinx tipuliformis. Lin.
 Engr. pap. d'Europe, pl. 94. n.º 129 et 130.
 Habite en Europe.
3. Sésie culiciforme. *Sesia culiciformis*. Fab.
S. alis hyalinis : margine fasciæque nigris ; abdomine barbato : cingulo fulvo.
Sphinx culiciformis. Lin.
 Engr. pap. d'Europe, pl. 93. n.º 126.
 Habite en Europe.
4. Sésie vespiforme. *Sesia vespiformis*. Fab.
S. alis fenestratis : margine fasciæque nigris ; abdom. barbato nigro : segmentis pluribus flavis.
Sphinx vespiformis. Lin.
 Engr. pap. d'Europe, pl. 92. n.º 124.
 Habite en Europe.
 Etc.

MACROGLOSSE. (Macroglossum.)

Antennes subcylindriques, un peu renflées et fusiformes vers le bout. Deux palpes.

Langue longue, filiforme, rétractile.

Ailes horizontales, couvertes d'écailles, quelque vitrées. Anus barbu et obtus. Vol diurne et rapide. Cille munie d'une corne caudale.

C'est ordinairement dans l'intérieur de la terre ou à sa surface que ces chenilles se changent en chrysalide. Elles se fabriquent des enveloppes grossières avec des feuilles et des articles de terre qu'elles réunissent avec de la soie.

ESPÈCES.

. Sphinx du liseron. *Sphinx convolvuli*.

S. alis integris nebulosis : posticis subfasciatis ; abdomine cingulis rubris, atris albisque.

Sphinx convolvuli Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 86 n.º 9.

Engr. pap. d'Europe, pl. 86—87 — 122. n.º 14.

Habite en Europe.

. Sphinx tête de mort. *Sphinx Atropos*.

S. alis integris : posticis luteis, fasciis fuscis ; abdomine luteo : cingulis nigris.

Sphinx Atropos. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 85. n.º 8.

Engr. pap. d'Europe, pl. 105 et 106. n.º 154.

Habite en Europe, sur la pomme-de-terre, etc.

. Sphinx du tithymale. *Sphinx euphorbiæ*.

S. alis integris griseis : fasciis duabus virescentibus, posticis basi strigisque nigris, antennis niveis.

Sphinx euphorbiæ. Lin. Fab.

Engr. pap. d'Europe, pl. 107 et 108. n.º 155.

Habite en Europe.

Sphinx du troëne. *Sphinx ligustri*.

S. alis integris, posticis rufis : fasciis tribus nigris ; abdomine rubro : cingulis nigris.

Sphinx ligustri. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 84. n.º 7.

Engr. pap. d'Europe, pl. 85. n.º 113.

Habite en Europe.

. Sphinx de la vigne. *Sphinx elpenor*.

S. alis integris, viridi purpureoque variis : posticis rubris, basi atris.

Sphinx elenor. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 86. n.º 10.

Engr. pap. d'Europe, pl. 112. n.º 160.

Habite en Europe.

Etc.

SMÉRINTHE. (*Smerinthus.*)

Antennes insensiblement plus épaisses dans leur moitié supérieure, prismatiques, subpectinées ou en scie un peu crochues à leur sommet. Deux palpes comprimés écailleux. Langue très-courte, presque nulle.

Ailes anguleuses. Une corne caudale sur le dos de la chenille.

Antennæ versùs medium et sensim crassiores, prismaticæ, subserratæ; apice uncinato. Palpi duo compressi, squamati. Lingua brevissima, ferè nulla.

Alæ angulatæ. Eruca cornu dorsali postico.

OBSERVATIONS.

Les *smérinthes* sont éminemment distingués des sphinx par leur trompe ou langue très-courte et presque avortée. Ils volent peu et se posent pour prendre leur nourriture; on peut même penser qu'ils n'en prennent guère ou que pendant peu de temps. Ces lépidoptères ont d'ailleurs de très-grands rapports avec les sphinx, et sont en général assez élégamment ornés. Leurs ailes, surtout les supérieures, sont anguleuses et leur abdomen se termine en pointe.

ESPÈCES.

1. Smérinthe du tilleul. *Smerinthus tiliae.*

S. alis angulatis, virescenti-nebulosis, saturatius fasciatis; posticis supra luteo-testaceis.

Sphinx tilia Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 80. n.º 2.

Engr. pap. d'Europe, pl. 117—118. n.º 163.

Habite en Europe.

Smérinthe demi-paon. *Smerinthus ocellatus*.

S. alis angulatis : posticis rufis ; ocello cœruleo.

Sphinx ocellata. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 79. n.º 1.

Engr. pap. d'Europe, pl. 119. n.º 164.

Habite en Europe.

Smérinthe du peuplier. *Smerinthus populi*.

S. alis dentatis , reversis griseis : anticis puncto albo , posticis basi ferrugineis.

Sphinx populi. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 81. n.º 3.

Engr. pap. d'Europe, pl. 114 et 116. n.º 162.

Habite en Europe.

Smérinthe du chêne. *Smerinthus quercus*.

S. alis angulato-dentatis , cinereis : strigis obscurioribus , posticis ferrugineis : angulo ani albo.

Sphinx quercus. Fab.

Habite en Allemagne. Rare.

CASTNIE. (Castnia.)

Antennes filiformes , se terminant en massue allongée , avec un petit crochet au bout. Deux palpes triarticulés , non contigus.

Ailes horizontales ou en toit ?

Antennæ filiformes , clavæ oblongæ terminatæ ; apicacuto uncinato. Palpi duo distinctè triarticulati , non contigui.

Alæ horizontales aut deflexæ ?

OBSERVATIONS.

Les *castnies* ont été confondues parmi les papillons , parce que la massue des antennes ne commence que vers

l'extrémité de ces parties. Elles se rapprochent, en e par leurs antennes, de ceux des papilionides que nous r mons, avec M. Latreille, les *uranies* et les *hespéries*. leurs ailes inférieures sont munies de crochets pour re celles de dessus, et il est probable que, dans le repos, ailes sont plutôt horizontales ou en toit que relevée. sont des sphingides qui font le passage aux papilionide

ESPECES.

1. Castnie de Surinam. *Castnia Icarus*.

C. alis integris, supra albis : fasciis fuscis, subtus / albis nigrisque alternis.

Hesperia Icarus. Fab. *Pupilio Icarus*. Gmel.

Pap. Philemon. Cram. 2. tab. 22. fig. G—H.

Habite à Surinam.

2. Castnie de Guinée. *Castnia Dædalus*.

C. alis integerrimis fuscis, albo-maculatis, subtus neis.

Papilio Dædalus. Fab. 3. 1. p. 53.

Habite la Guinée.

3. Castnie Cyparisse. *Castnia Cyparissias*.

C. alis integerrimis nigris : fasciis duabus albis ; a rum obliquis, posticarum punctatis.

Papilio Cyparissias. Fab. 3. 1. p. 39.

Cram. 1. t. 1. fig. A—B.

Habite l'Amérique méridionale.

4. Castnie d'Inde. *Castnia Orontes*.

C. alis caudatis nigris : fasciis duabus virescentibus dis albis distantibus.

Papilio Orontes. Fab. 3. 1. p. 69.

Cram. 7. t. 38 fig. A—B.

Habite dans l'Inde.

Etc.

SECTION DEUXIÈME.

Point de crochets au bord externe des ailes inférieures.

LES PAPILIONIDES.

Antennes filiformes , simples , terminées par un bouton droit ou par un renflement oblong et crochu. Deux palpes apparens , courts , comprimés , velus. — Les ailes élevées dans l'inaction ; leur bord intérieur étant alors moins élevé que l'extérieur. Vol diurne. — Larve à seize pattes et sans corne. Chrysalide presque toujours à nu.

OBSERVATIONS.

Les *papilionides* embrassent tous les lépidoptères connus généralement sous le nom de papillons , et par conséquent le genre *papilio* de Linné et de tous les auteurs. Ils constituent la dernière , la plus grande et la plus belle famille des lépidoptères.

On les distingue des autres lépidoptères , 1.^o parce qu'ils n'ont point de crochets subulés à la naissance des ailes inférieures ; 2.^o parce que , dans le repos , ils ont leurs ailes plus ou moins complètement relevées , mais jamais tout-à-fait horizontales , ni en toit ; 3.^o parce que tous généralement ne volent que le jour ; 4.^o enfin , parce que , dans la plupart , leur chrysalide est suspendue , nue et angulense.

De tous les lépidoptères , et peut-être de tous les insectes en général , ce sont les papilionides qui offrent le plus d'intérêt par leur beauté , leur vivacité , l'élégance

de leur forme et l'admirable variété de leurs couleurs. En effet, la beauté du papillon, sa légèreté, son air animé, ses courses vagabondes et volages, tout nous plaît en lui. Il voltige de fleur en fleur, parcourant ainsi les vergers, les prairies et les plaines : l'inconstance semble former son caractère.

Une collection de papillons, riche en espèces et bien conservée, nous présente un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir dans un cabinet d'histoire naturelle. Ces insectes semblent se disputer à l'envi la beauté des couleurs, l'élégance de la forme. Ce sont, en général, les papillons de la Chine et de l'Amérique méridionale, surtout ceux de la rivière des Amazones et du Brésil, qui se font remarquer par leur grandeur, et par le vif éclat de leurs couleurs.

Avec de grandes ailes légères, la plupart des papillons, néanmoins, volent d'assez mauvaise grâce : ils vont toujours par zigzag, de haut en bas, de bas en haut, à droite et à gauche : cela provient de ce que leurs ailes sont libres, ne frappent l'air que l'une après l'autre, et peut-être avec des forces alternativement inégales. Ce vol leur est très-avantageux, parce qu'il leur fait éviter les oiseaux qui les poursuivent ; car le vol de la plupart des oiseaux est en ligne droite ou par lignes droites, et celui du papillon est continuellement hors de cette ligne.

Pour faciliter l'étude des nombreuses espèces de papillons, dont on connaît plus de 900, on les avait divisées en plusieurs tribus, auxquelles on avait donné des noms particuliers ; ce qui, jusqu'à un certain point, eût pu suffire, si les caractères de ces tribus eussent été moins vagues, mieux circonscrits. Mais il paraît que personne, avant M. Latreille, n'avait assez étudié les papillons pour les



partager en différens genres, et en former une famille articulière.

Je ne suivrai point cet entomologiste dans toutes les distinctions qu'il a établies parmi les *papilionides* ; mais, profitant des principaux caractères qu'il a fait connaître, je me bornerai à présenter ces papilionides partagés en six compes circonscrites, que je considère comme contenant dix genres distincts. Voici la division de ces genres.

DIVISION DES PAPILIONIDES.

§. Quatre épines aux jambes postérieures : deux vers le milieu du côté interne, et deux au bout.

Uranie.

Hespérie.

§§. Deux épines seulement aux jambes postérieures.

- (1) Troisième article des palpes toujours très-distinct et presque nu.

Chenille courte, ovale ou en forme de cloporte.

Argus.

- (2) Troisième article des palpes, soit presque nul, soit très-distinct, mais alors couvert d'écaillés ou très-velu.

Chenille allongée, subcylindrique.

* Chrysalide nue, suspendue par son extrémité postérieure.

Quatre pattes ambulatoires, soit dans les deux sexes, soit dans les mâles seulement; les deux pattes antérieures étant relevées contre le cou (en palatine).

- (a) Les deux pattes antérieures relevées et non ambulatoires dans les deux sexes.

(+) Palpes courts, comprimés, presque contigus.

Nymphale.

(+++) Palpes longs, cylindracés, grêles, très-écartés.

Danaïde.

(b) Les deux pattes antérieures relevées et non ambulatoires dans les mâles seulement.

Libythée.

** Chrysalide quelquefois dans une coque, le plus souvent et alors attachée par un cordon dans son milieu.

Toutes les pattes ambulatoires dans les deux sexes.

(a) Ailes inférieures formant, par le rapprochement du bord interne, un canal qui reçoit le corps.

Piérade.

(b) Ailes inférieures écartées à leur bord interne, et le corps à découvert en dessus et en dessous.

(+) Chrysalide dans une coque.

Une poche cornée à l'extrémité de l'abdomen des mâles.

Parnassien.

(++) Chrysalide nue:

Point de poche particulière à l'abdomen des femelles.

Thaïs.

Papillon.

URANIE. (Urania.)

Antennes filiformes, très-grêles, sétacées et crochues à leur extrémité. Deux palpes grêles et longs, à trois articles nu.

Ailes n'étant point toutes relevées dans l'inaction. Trois épines aux jambes postérieures.

Antennae filiformes, ad apicem graciliores,



SANS VERTÈBRES.

19

: et arcuatæ. Palpi duo elongati, graciles; articulo tertio nudo.

Alæ omnes in quiete non erectæ. Pedes postici quadrispinosi.

OBSERVATIONS.

Les *uranies* tiennent aux *hespéries* par les quatre épines de leurs jambes postérieures; mais on les en distingue facilement par leurs antennes sétacées et courbées ou crochues au sommet, et par leurs palpes grêles, longs, à troisième article nu.

ESPÈCES.

Uranie leilus. *Urania leilus*.

U. alis caudatis, concoloribus nigris: fasciâ strigisque viridibus, nitentibus, numerosis.

Papilio leilus. Lin. Fab. 3. p. 21.

Cram. ins. 8. t. 85. fig. D—E.

Habite en Amérique, sur le citronnier.

Uranie d'Inde. *Urania ripheus*.

U. alis sexdentato caudatis, nigris, viridi-fasciatis: posticis subius macula ani ferruginea, nigro punctata.

Papilio ripheus. Fab. p. 21.

Cram. ins. 33. t. 385. fig. A—B.

Habite la côte de Coromandel.

Uranie Oronte. *Urania Orontes*.

U. alis caudatis nigris: fasciis duabus virescentibus; caudis albis distantibus.

Papilio Orontes. Lin. Fab. p. 69.

Cram. ins. 7. t. 38. fig. A—B.

Habite dans l'Inde.

Uranie Patrocle. *Urania Patroclus*.

U. alis caudatis concoloribus fuscis: fasciâ lineari, obliquâ, albâ, apicibusque albis.

Papilio Patroclus. Lin. *Noctua Patroclus*. Fab.

Habite dans les Indes.

Etc.

HESPÉRIE. (Hesperia.)

Antennes filiformes, terminées en bouton ou en massue oblongue. Deux palpes courts, larges, très-écailleux.

Les deux ailes inférieures peu relevées dans le repos. Quatre épines aux jambes postérieures.

Antennæ filiformes, apice capitulo vel clavâ oblongâ terminatæ. Palpi duo breves, lati, valdè squamati.

Alæ inferiores in quiete vix erectæ. Pedes postici quadrispinosi.

OBSERVATIONS.

Les *hespéries*, ainsi que l'*uranie*, paraissent être les papilionides les plus rapprochés des lépidoptères précédens ; car leurs ailes ne sont point toutes relevées dans le repos, et leur chrysalide, en général, n'est ni nue, ni anguleuse. C'est au moins ce que l'on sait à l'égard des espèces d'Europe qui ont été observées. Leur chrysalide est enveloppée d'une légère coque de soie, et l'insecte parfait n'a pas ses quatre ailes entièrement relevées dans les temps de repos.

D'ailleurs les *hespéries* et les *uranies* sont bien distinguées des autres papilionides, ayant quatre épines aux jambes postérieures, et les autres papilionides n'en ayant que deux.

ESPECES.

1. Hespérie de la mauve. *Hesperia malvæ*.

H. alis dentatis, divaricatis, fuscis cinereo-undatis : antice punctis fenestratis ; posticis subitis punctis albis.

Papilio plebeius malvæ. Lin.

Hesperia malvæ. Fab. 3. p. 350.

Le plein-chant. Geoff. 2. p. 67. n.º 38.

Habite en Europe. Commune.

Hespérie grisette. *Hesperia tages*.

H. alis integerrimis denticulatis, fuscis, obsolete albo-punctatis.

Papilio plebeius tages. Lin.

Hesperia tages. Fab. 3. p. 354.

Le p. grisette. Geoff. 2. p. 68. n.º 39.

Habite en Europe, dans les bois.

Hespérie plein-chant. *Hesperia fritillum*.

H. alis integris, divaricatis, nigris, albo-punctatis.

Hesperia fritillum. Fab. 3. p. 351.

Engr. pap. d'Europe, suppl. 3. pl. 7. n.º 97 bis.

Habite en Europe, dans les prés.

Hespérie bande-noire. *Hesperia comma*.

H. alis integerrimis, divaricatis, fulvis : lineola nigra, subtus punctis albis.

Papilio comma. Lin. *Hesperia comma*. Fab. p. 325.

Geoff. 2. p. 66. n.º 37.

Engr. pap. d'Europe, suppl. 3. pl. 7. n.º 97 bis.

Habite en Europe, dans les prés.

Etc.

 A R G U S. (Argus.)

Antennes filiformes, terminées en massue. Troisième article des palpes très-distinct et presque nu.

Ailes relevées dans le repos. Un canal au bord interne des ailes inférieures. Chenille courte, subovale. Chrysalide obtuse aux extrémités.

Antennæ filiformes, clavæ terminatæ. Palporum articulo tertio distincto, subnudo.

Alæ in quiete erectæ : posticæ abdomen subtus in canali excipientes. Eruca brevis, subovata. Chrysalis apicibus obtusis.

OBSERVATIONS.

Les *argus*, comme les autres papilionides qui suivent, n'ont que deux épines aux jambes postérieures. Ils sont nombreux en espèces, et remarquables par la singularité de leur chenille. Elle est courte, presque ovale, et a, en quelque sorte, la forme d'un cloporte. Dans l'insecte parfait, le troisième article des palpes est toujours bien distinct, grêle presque nu ou peu chargé d'écailles.

A ce genre, je rapporte les *erycinæ* de M. Latreille, et ses *polyommates*. Dans les premières, les deux pattes antérieures sont beaucoup plus courtes dans les mâles que dans les femelles; les six pattes des seconds sont également ambulateires dans les deux sexes.

ESPECES.

* Toutes les pattes ambulateires dans les deux sexes.
(*Argus* européens.)

1. *Argus* commun. *Argus vulgaris*.

A. alis rotundatis, integris, fuscis, fasciâ marginis fulvâ, subtilius cinereis, ocellisque cœruleo-argenteis.

Hesperia argus. Fab. *Papilio argus*. Lin.

Geoff. 2. p. 63. n.º 32.

Engr. pap. d'Europe. pl. 38. n.º 80.

Habite en Europe; très-commun.

2. *Argus* Corydon. *Argus Corydon*.

A. alis integris, cœruleo-argenteis: margine nigra, subtilius cinereis, punctis ocellaribus, posticis macula centrali albâ.

Hesperia Corydon. Fab. p. 298.

Engr. pap. d'Europe. pl. 39. n.º 85.

Habite en Allemagne, en France.

3. *Argus* minime. *Argus alsus*.

A. alis integerrimis, fuscis, immaculatis subtilius cineristriga punctorum ocellatorum.

Hesperia alsus. Fab. p. 295.

Habite en Europe.

4. Argus Méléagre. *Argus Melenger*.

A. alis dentatis, cæruleis : limbo nigro, subtus canis : punctis ocellaribus nigris.

Hesperia Melenger. Fab. p. 292.

Habite en France, en Allemagne.

5. Argus de la ronce. *Argus rubi*.

A. alis subcaudatis, supra fuscis, subtus viridibus.

Hesperia rubi Fab. p. 287.

L'argus vert ou aveugle. Geoff. 2. p. 64. n.º 34.

Habite en Europe; commun dans les bois.

Etc.

* Mâles ayant les deux pattes antérieures plus courtes
et non ambulatories (Argus étrangers).

6. Argus Cupidon. *Argus Cupido*.

A. alis posticis sexdentato-caudatis : subtus albidis ; maculis argenteis.

Hesperia Cupido. Fab. p. 258.

Habite en Amérique, sur le cotonnier.

7. Argus Endymion. *Argus Endymion*.

A. alis bicaudatis, subtus viridibus aureo rufoque irrorationibus : posticis strigæ atræ fasciæque sanguineæ.

Hesperia Endymion. Fab. p. 268.

Papilio regalis. Cram. ins. 6. t. 72. fig. E—F.

Habite à Surinam.

8. Argus Mélibée. *Argus Melibeus*.

A. alis bicaudatis cærulescentibus : limbo fusco, subtus flavescens : anticis fusco, posticis nigro, strigosis, angulo ani atro ; annulis cæruleis.

Hesperia Melibeus. Fab. p. 271.

Habite dans l'Inde.

9. Argus Lysippe. *Argus Lysippus*.

A. alis angulatis fuscis : omnibus strigæ rubræ, subtus cinereo punctatis.

Hesperia Lysippus. Fab. p. 331.

Habite en Amérique.

Etc.

NYMPHALE. (*Nymphalis.*)

Antennes filiformes, terminées en massue. Deux palpes courts, comprimés, presque oontigus.

Les deux pattes antérieures inutiles et relevées contre le cou dans les deux sexes. Les ailes inférieures embrassant l'abdomen en dessous. Onglets des tarses bifides.

Antennæ filiformes clavâ terminatæ. Palpi duo breves, compressi, subcontigui.

Pedes duo antici spurii, collo appressi in utroque sexu. Alæ posticæ abdomen infra amplexentes, Tarsu unguibus bifidis.

OBSERVATIONS.

Ce genre embrasse non-seulement les nymphales de M. Latreille, mais en outre ses *satyrus*, *biblis*, *vanessa argynis* et *cethosia*. Il est conséquemment fort étendu, et comprend beaucoup d'espèces exotiques.

Dans toutes les nymphales, les deux pattes antérieures sont en palatine et sans usage dans les deux sexes. La même chose a lieu dans les danaïdes, mais celles-ci ont des palpes allongés, cylindratés, très-écartés.

Je ne citerai que quelques espèces d'Europe.

E S P È C E S.

1. Nymphale demi-deuil. *Nymphalis Galathea.*

N. alis dentatis, albo nigroque variis : subius anticis oculo unico, posticis quinque.

Papilio Galathea. Lin. Fab. p. 239.

Le demi-deuil. Geoff. p. 74. pl. 11. f. 3—4.

Habite en Europe, dans les prairies.

1. Nymphale Procris. *Nymphalis Pamphilus*.

*N. alis integerrimis flavis : subtus anticis ocello unico ,
posticis cinereis : fasciâ ocellisque quatuor oblitteratis.*

Papilio Pamphilus. Lin. Fab. p. 221.

Procris. Geoff. 2. p. 53. n.° 21.

Habite en Europe. Espèce petite; commune.

Nymphale Céphale. *Nymphalis arcanius*.

*N. alis integerrimis ferrugineis : subtus anticis ocello
unico , posticis quinis : primo fasciâ remoto.*

Papilio arcanius. Lin. Fab. p. 221.

Le Céphale. Geoff. 2. p. 53. n.° 22.

Habite en Europe.

Nymphale Myrtil. *Nymphalis janira*.

*N. alis dentatis , fuscis : anticis subtus luteis ; ocello utrin-
que unico ; posticis subtus punctis tribus.*

Papilio janira. Lin. Fab. p. 241.

Le Myrtil. Geoff. 2. p. 49. n.° 17.

Habite en Europe.

Nymphale Amaryllis. *Nymphalis pilosellæ*.

*N. alis dentatis , fuscis : disco fulvo , anticis utrinque
ocello nigro : pupilla gemina , posticis subtus punctis
ocellaribus niveis.*

Papilio pilosellæ. Lin. Fab. p. 240.

Geoff. 2. p. 52. n.° 20.

Habite en Europe.

Nymphale Hermione. *Nymphalis Hermione*.

*N. alis dentatis , fuscis : fasciâ pallidâ , anticis ocellis
suprà duobus , subtus unico.*

Papilio Hermione. Lin. Fab. p. 232.

Le Silène. Geoff. 2. p. 46. n.° 13.

Habite en Allemagne, en France.

Nymphale satyre. *Nymphalis mæra*.

*N. alis dentatis , fuscis : utrinque anticis sesquicoello ;
posticis ocellis suprà tribus , subtus sex.*

Papilio mæra. Lin. Fab. p. 227.

Le satyre. Geoff 2. p. 50. n.º 19.

Habite en Europe. Le *papilio megara* s'en rapproche beaucoup.

Etc.

DANAÏDE. (Danaus.)

Antennes filiformes, terminées par un bouton. Deux palpes longs, grêles, cylindracés, très-écartés.

Les deux pattes antérieures courtes et en palatine dans les deux sexes. Les ailes ovales ou oblongues : les inférieures embrassant à peine l'abdomen en dessous. Ongles des tarses toujours simples.

Antennæ filiformes, capitulo terminatæ. Palpi duo elongati, graciles, cylindracei, valdè remoti.

Pedes duo antici spurii, collo appressi in utroque sexu. Alæ ovales vel oblongæ : posticæ abdomen infra vix amplexantes. Tarsi unguibus simplicibus.

OBSERVATIONS.

Ce genre embrasse les danaïdes et les héliconiens de M. Latreille. Ces lépidoptères, dans les deux sexes, ont les deux pattes antérieures en palatine, comme dans les nymphales, mais leurs palpes allongés, grêles et écartés, les en distinguent principalement. Quant aux héliconiens, on les distingue des autres danaïdes parce qu'ils ont les ailes oblongues et étroites. Ils ont en outre les palpes un peu plus longs et le bouton des antennes plus droit.

ESPÈCES.

[*Danaïdiens*].

1. Danaïde pieds-liés. *Danaus plexippus*.

D. alis integerrimis fulvis : venis nigris dilatatis, mar-

nigro : punctis albis, anticis fasciâ apicis alba.

Papilio plexippus. Lin. Fab. p. 49.

Cram. ins. 1. tab. 3. fig. A—B.

Habite en Amérique.

Danaïde concolore. *Danaus similis*.

D. alis subrepandis concoloribus : punctis cœrulescenti-albis versùs basim lineatis

Papilio similis. Lin. Fab. p. 58.

Habite dans l'Inde.

Danaïde midamus. *Danaus midamus*.

D. alis integerrimis nigris albo punctatis : anticis suprâ cœrulescentibus, posticis suprâ punctorum alborum strigâ.

Papilio midamus. Lin. Fab. p. 39.

Habite les Indes orientales.

Danaïde veinée. *Danaus idea*.

D. alis rotundatis denudato-albis : venis maculisque nigris.

Papilio idea. Lin. Fab. p. 185.

Habite dans les Indes.

[Héliconiens.]

Danaïde rouge. *Danaus horta*.

D. alis integerrimis rubris; anticis apice hyalinis, posticis subtilius albidis nigro-punctatis.

Papilio horta. Lin. Fab. p. 159.

Habite en Afrique.

Danaïde Terpsichore. *Danaus Terpsichore*.

D. alis oblongis integerrimis fulvis : posticis nigro punctatis.

Papilio Terpsichore. Lin. Fab. p. 164.

Habite en Asie.

Danaïde Polymnie. *Danaus Polymnia*.

D. alis oblongis integerrimis : anticis maculis apiceque nigris; fasciâ flavâ; posticis fasciis 3 nigris : mediâ serratâ.

Papilio Polymnia. Lin. Fab. p. 164.

Habite l'Amérique méridionale.

8. Danaïde Doris. *Danaus Doris*.

D. alis oblongis integerrimis atris : anticis flavo-maculatis, posticis supra basi cœruleo-radiatis.

Papilio Doris. Lin. Fab. p. 166.

Habite à Sarinam.

Etc.

LIBYTHÉE. (*Libythea*.)

Antennes filiformes, un peu courtes, terminées par un bouton allongé. Deux palpes souvent plus longs que la tête, réunis en un bec avancé.

Les deux pattes antérieures en palatine dans les mâles seulement. Les ailes inférieures embrassant l'abdomen en dessous.

Antennæ filiformes, breviusculæ, capitulo elongato terminatæ. Palpi duo sæpius capite longiores, in rostellum porrectum conniventes.

Pedes duo antiqui, in maribus tantum, brevissimi, spurii. Alæ posticæ abdomen infra amplexantes.

OBSERVATIONS.

Ce genre est le même que celui ainsi nommé par M. Latreille. Il est caractérisé par la réunion des deux palpes qui forment un bec avancé devant la tête, et parce que les mâles seulement ont les deux pattes antérieures en palatine, c'est-à-dire, qu'elles ne sont pas ambulateires.

ESPÈCES.

1. Libythée du Celtis. *Libythea Celtis*.

L. alis angulato dentatis fuscis : maculis fulvis unicâque alba, posticis subtilius griseis.

Papilio Celtis. Fab. p. 140.

Habite dans l'Europe australe, sur le micocaulier.

Libythée de Surinam. *Libythea carinenta*.

L. alis falcato-dentatis, fuscis flavo-maculatis : anticis apice atris; maculis quatuor albis.

Papilio carinenta. Fab. p. 139.

Cram. ins 9. t. 108. fig. E—F.

Habite à Surinam.

Libythée Calliope. *Libythea Calliope*.

L. alis oblongis integerrimis luteis: anticis striis tribus, posticis fasciis 3 nigris.

Papilio Calliope. Lin. Fab. p. 160.

Habite dans les Indes. Port des héliconiens.

Libythée Vulcain. *Libythea atalanta*.

L. alis dentatis, nigris albo maculatis : fasciâ communi purpureâ anticarum utrinque, posticarum marginali.

Papilio atalanta. Lin. Fab. p. 118.

Le Vulcain. Geoff. 2. p. 40. n.º 6.

Habite en Europe. Commune et fort belle.

Libythée du chardon. *Libythea cardui*.

L. alis dentatis, fulvis albo nigroque variegatis : posticis subitis ocellis quatuor.

Papilio cardui. Lin. Fab. p. 104.

La belle-dame. Geoff. 2. p. 41. n.º 7.

Habite en Europe.

Libythée oeil de paon. *Libythea Io*.

L. alis angulato-dentatis, fulvis, nigro-maculatis : singulis oculo cœruleo.

Papilio Io. Lin. Fab. p. 88.

Le paon du jour. Geoff. 2. p. 36. n.º 2.

Habite en Europe.

Libythée de l'ortie. *Libythea urticae*.

L. alis angulatis, fulvis, nigro-maculatis : anticis supra punctis tribus.

Papilio urticae. Lin. Fab. p. 122.

La petite tortue. Geoff. 2. p. 37. n.º 4.

Habite en Europe, sur l'ortie.

Etc.

PIÉRIDE. (Pieris.)

Antennes filiformes, terminées en massue ou en bouton. Deux palpes triarticulés.

Les quatre ailes relevées dans le repos : un canal au bord interne des inférieures embrassant l'abdomen par dessous.

Antennæ filiformes, clavæ vel capitulo terminatæ. Palpi duo articulis tribus.

Alæ omnes in quiete erectæ : posticæ abdomen subtus in canali excipientes.

OBSERVATIONS.

Les *piérides*, dont il s'agit, sont celles de M. Latreille, auxquelles je réunis ses *coliades*. Ces papilionides ont leur chrysalide attachée dans son milieu par un cordon, et différent de ceux qui viennent après, par le canal que le bord interne et rapproché des ailes inférieures forme au-dessous de l'abdomen. Ils ont les crochets des tarsi unidentés ou bifides.

La plupart des espèces des *piérides* sont communes en Europe.

ESPÈCES.

1. Piéride du chou. *Pieris brassicæ*.

P. alis rotundatis, integerrimis albis : anticis maculis duabus apicibusque nigris, major.

Papilio brassicæ. Lin. Fab. p. 486.

Le grand papillon blanc du chou. Geoff. 2. p. 68, n.º 40.

Habite en Europe. Espèce très-commune. Chenille panachée de jaune, de noir et de bleu.

Piéride mineure. *Pieris rapæ*.

P. alis integerrimis : anticis maculis duabus apicibusque nigris, minor.

Papilio Rapæ. Lin. Fab. p. 186.

Le petit papillon blanc du chou. Geoff. 2. p. 69. n.º 41.

Habite en Europe, sur le chou. Chenille verte, avec une bande d'un blanc jaunâtre de chaque côté.

Piéride du navet. *Pieris napi*.

P. alis integerrimis albis : subtus venis dilatatis virescentibus.

Papilio napi. Lin. Fab. p. 187.

Le petit papillon blanc veiné de vert. Geoff. 2. p. 70. n.º 42.

Habite en Europe; très-commune.

Piéride de la moutarde. *Pieris sinapis*.

P. alis rotundatis, integerrimis albis : apicibus fuscis.

Papilio sinapis. Lin. Fab. p. 187.

Engram. pap. d'Europe. pl. 1. n.º 106.

Habite en Europe.

Piéride gazée. *Pieris crataegi*.

P. alis rotundatis integerrimis albis : venis nigris.

Papilio crataegi. Lin. Fab. p. 182.

Le gazé. Geoff. 2. p. 71. n.º 43.

Habite en Europe, dans les jardins.

5. Piéride aurore. *Pieris cardamines*.

P. alis rotundatis integerrimis albis : posticis subtus viridi-marmoratis.

Papilio cardamines. Lin. Fab. p. 193.

L'aurore. Geoff. 2. p. 71. n.º 44.

Habite en Europe.

7. Piéride citron. *Pieris rhamni*.

P. alis integerrimis angulatis flavis : singulis puncto ferrugineo.

Papilio rhamni. Lin. Fab. p. 211.

Le citron. Geoff. 2. p. 74. n.º 47.

Habite en Europe.

8. Piéride souci. *Pieris hyale*.

P. alis rotundatis flavis : posticis maculâ fulvâ, subitè puncto sesquialtero argenteo.

Papilio hyale. Lin. Fab. p. 207.

Le souci. Geoff. 2. p. 75. n.º 48.

Habite en Europe.

Etc.

PARNASSIEN. (*Parnassius*.)

Antennes filiformes, terminées par un bouton court. Deux palpes élevés au-delà du chaperon, ayant leur troisième article très-distinct.

Ailes relevées dans le repos : les inférieures écartées et n'embrassant point l'abdomen en dessous. Crochets des tarses simples. Chrysalide dans une coque.

Antennæ filiformes, capitulo brevi erecto terminatæ. Palpi duo ultra clypeum assurgentes ; articulo tertio valdè distincto.

Alæ insecto sedente erectæ : inferiores remotæ abdomen infra non amplexentes. Tarsi unguibus simplicibus. Chrysalis subfolliculata.

OBSERVATIONS.

Ce genre, le même que celui de M. Latreille, n'embrasse que peu d'espèces connues ; mais elles sont singulières en ce que les femelles ont une poche à l'extrémité de l'abdomen, et que les chrysalides sont renfermées dans une espèce de coque. Les ailes des parnassiens connus sont peu chargées d'écailles. Par leur écartement, les inférieures laissent le corps libre et à découvert en dessus et en dessous.

ESPECES.

1. Parnassien Apollon. *Parnassius Apollo*.

P. alis rotundatis integerrimis albis, nigro-maculatis : posticis supra ocellis quatuor, subitè sex.

Papilio Apollo. Lin. Fab. p. 181.

Engr. pap. d'Europe, pl. 47. n.º 99.

Habite en Europe, dans les Alpes, les Pyrénées, etc.

2. Parnassien du nord. *Parnassius Mnemosyne*.

*P. alis rotundatis; integerrimis, albis, nigro-nervosis :
anticis maculis duabus nigris marginalibus.*

Papilio Mnemosyne. Lin. Fab. p. 182.

Engram. pap. d'Europe, pl. 48 n.º 100.

Habite en Europe, surtout dans le nord.

THAÏS. (Thais.)

Antennes filiformes, terminées par un bouton allongé, courbé. Deux palpes élevés au-delà du chaperon, à troisième article très-distinct.

Ailes relevées dans le repos : les inférieures écartées n'embrassant point l'abdomen en dessous. Onglets des tarses simples. Chrysalide nue, attachée dans son milieu par un cordon.

Antennæ filiformes, capitulo elongato, arcuato terminatæ. Palpi duo ultrà clypeum assurgentes; articulo tertio valdè distincto.

Alæ insecto sedente erectæ : inferiores abdomen infra non amplectentes. Tarsi unguibus simplicibus. Chrysalis nuda, filo transverso alligata.

OBSERVATIONS.

Les *thais* seraient des piérides, si leurs ailes inférieures formaient un canal au-dessous de l'abdomen. N'ayant pas ce caractère, elles se rapprochent des papillons, et n'en diffèrent principalement, que parce qu'elles ont les palpes plus longs, triarticulés, à troisième article très-distinct. Le

bouton qui termine leurs antennes est un peu allongé courbé.

ESPÈCES.

1. *Thais* Diane. *Thais Hypsipyle*.

*Th. alis dentatis, flavis nigro variis. ap. ce radiatis: pos
cis punctis septem rubris.*

Papilio Hypsipyle. Fab. p. 214.

Engr. pap. d'Europe, pl 52. n.º 109.

Habite le Piémont, l'Autriche.

2. *Thais* Proserpine. *Thais rumina*.

*Th. alis dentatis, flavis nigro variis: anticis maculis
rubris.*

La Proserpine. Engr. pap. d'Europe, pl 78. n.º 109 bis.

Habite la France méridionale, le Portugal.

PAPILLON. (Papilio.)

Antennes filiformes, terminées par un bouton pr
qu'ovale. Deux palpes très-courts, atteignant à peine
chaperon, à troisième article très-petit, peu distinct.

Les ailes relevées dans le repos : les inférieures écart
par leur bord interne, et n'embrassant point l'abdom
en dessous. Chrysalide nue, anguleuse, attachée dans
milieu par un cordon.

*Antennæ filiformes, capitulo subovato terminæ
Palpi duo brevissimi, clypeum vix attingentes; an
culo tertio minimo, subinconspicuo.*

*Alæ in quiete erectæ: inferiores margine inter
remotæ, abdomen infrà non amplexantes. Chrysi
nuda, angulata, filo transverso alligata.*

OBSERVATIONS.

Le genre *papillon*, ici réduit, est encore fort nombre

en espèces, et comprend les plus beaux papilionides. On n'y rapporte plus ceux qui ont quatre épines aux jambes postérieures, ni ceux dont la chrysalide est suspendue par son extrémité postérieure, ni enfin ceux dont les ailes inférieures, rapprochées par leur bord interne, embrassent le dessous de l'abdomen.

Les *papillons*, dont il s'agit maintenant, embrassent principalement les chevaliers [*equites*] de Linné, qu'il distingue en grecs et en troyens. Je n'en citerai que quelques-uns ; les divisant en ceux dont les ailes sont sans queue postérieurement, et en ceux dont les ailes se terminent en queue.

ESPÈCES.

[*Papillons sans queue.*]1. Papillon Priam. *Papilio Priamus*.

P. alis denticulatis holosericeis : anticis supra viridibus, macula atrâ; posticis maculis sex nigris.

Papilio Priamus. Lin. Fab. p. 11.

Cram. ins. 2. tab. 23. fig. A—B.

Habite l'île d'Amboine.

2. Papillon Remus. *Papilio Remus*.

P. alis dentatis, subconcoloribus nigris : posticis utrinque maculis flavis marginalibus.

Papilio Remus. Fab. p. 11.

Habite l'île d'Amboine.

3. Papillon Memnon. *Papilio Memnon*.

P. alis dentatis omnibus subtilius basi rubro-notatis.

Papilio Memnon. Lin. Fab. p. 12.

Habite en Chine.

4. Papillon Anchise. *Papilio Anchises*.

P. alis dentatis, concoloribus nigris : posticis maculis septem ovalis coccineis.

Papilio Anchises. Lin. Fab. p. 13.

Habite en Amérique.

Etc.

[*Papillons à queue.*]5. Papillon Ajax. *Papilio Ajax.* L.

P. alis caudatis concoloribus fuscis : fasciis flavescen-
tibus ; posticis subtus sanguineis , anguloque ani fulvo.

Papilio Ajax. Fab. p. 33.

Habite l'Amérique septentrionale.

6. Papillon flambé. *Papilio Podalirius.* L.

P. alis caudatis subconcoloribus flavescen-
tibus ; fasciis fuscis geminatis ; posticis subtus lined sanguineis.

Papilio Podalirius. Fab. p. 24.

Geoff. 2. p. 56. n.º 24.

Habite l'Europe australe, la France dans le midi.

7. Papillon du fenouil. *Papilio Machaon.* L.

P. alis caudatis concoloribus flavis : limbo fusco ; lunulis
flavis ; angulo ani fulvo.

Papilio Machaon. Fab. p. 30.

Geoff. 2. p. 54. n.º 23. Engr. pap. d'Europe, pl. 34. 70. et
suppl. 3. pl. 6. n.º 68.

Habite en Europe, sur le fenouil, la carotte, etc. C'est un des
beaux papillons de France.

Etc.

INSECTES BROYEURS.

Leur bouche offre des mandibules , le plus souvent
accompagnées de mâchoires sous leur forme appro-
priée. Ils coupent ou broient des corps concrets.

Dans les quatre premiers ordres déjà exposés, on n'a
vu, dans les insectes parfaits, que des suceurs, c'est-à-dire,
que des animaux dont la bouche est munie d'un suçoir
pour prendre leur nourriture. Ce suçoir, composé de
deux à cinq pièces qui se réunissent pour former un tube,
est trouvé muni d'une gaine dans les trois premiers or-

, et, dans le quatrième, nous l'avons vu tout-à-fait, formant une trompe que l'animal roule en spirale qu'il ne s'en sert pas. Enfin, ce suçoir s'est montré tout plus ou moins long, plus ou moins apparent, seque l'insecte parfait qui en est muni prend plus ou moins de nourriture après sa dernière transformation.

Maintenant nous allons trouver à la bouche des insectes des organes qui nous restent à considérer, des instruments qui paraîtront nouveaux, et effectivement cette bouche accomplit des fonctions réellement nouvelles. Nous trouvons des mandibules utiles qui se meuvent transversalement, et, dans le plus grand nombre, nous verrons que ces mandibules sont accompagnées de mâchoires raménées à leur forme appropriée : en sorte que les insectes qui possèdent ces parties ne sont plus des suceurs, mais véritables broyeurs ou rongeurs qui font usage d'aliments solides.

Depuis, comme la nature ne passe jamais brusquement d'un mode à un autre, sans offrir les traces de sa transition, nous croyons que notre distribution des insectes est naturelle en ce que, dans le premier des quatre ordres qui nous restent à exposer, nous retrouvons encore une espèce de suçoir constitué par la réunion des mâchoires de la lèvre inférieure encore allongées et étroites ; ce suçoir est accompagné de mandibules utiles. Il résulte que les insectes qui sont dans ce cas, sont à-la-fois suceurs et rongeurs.

C'est effectivement ce que l'on observe à l'égard des *hétéroptères* qui vont maintenant nous occuper.

ORDRE CINQUIÈME.

LES HYMÉNOPTÈRES.

Bouche munie de mandibules utiles , et d'un suçoir formé de trois pièces , imitant une trompe divisée. Une gaine courte à la base du suçoir. Quatre palpes. Trois petits yeux lisses sur la tête. — Quatre ailes nues , membraneuses , veinées , inégales : les inférieures toujours plus petites. — Anus des femelles armé d'un aiguillon , ou muni d'une tarière. — Larves vermiformes , les unes sans pattes , les autres avec des pattes. Nymphe immobile.

OBSERVATIONS.

C'est dans l'ordre des *hyménoptères* qu'on trouve pour la première fois des mandibules véritablement utiles , et qui se meuvent transversalement. Néanmoins ces insectes offrent encore une espèce de suçoir qui en fait effectivement les fonctions , et auquel on a donné d'abord le nom impropre de *langue* , et ensuite celui de *promuscide* , qui vaut mieux. Ce suçoir est plus ou moins allongé , selon les races qui en font plus ou moins d'usage. Il est composé de trois pièces , dont les deux latérales sont des mâchoires allongées , étroites , qui ne sont encore que préparées , et la troisième une lèvre inférieure aussi préparée , et qui est embrassée par ces espèces de mâchoires. Ces pièces forment , par leur réunion , un demi-tube qui fait les fonctions de suçoir ou de trompe. On sent qu'en dé-

unissant et raccourcissant ces trois pièces, la nature a pu, dans les insectes des ordres suivans, offrir des mandibules, des mâchoires libres et des lèvres ramenées aux formes appropriées à ces parties.

Quant à la gaine comme qui embrasse la base du suçoir des hyménoptères, c'est évidemment le menton de l'animal qui la fournit.

Ainsi, l'on peut dire que les *hyménoptères* ne sont pas encore complètement des insectes broyeurs, puisque la plupart sucent encore ; et déjà néanmoins, ils le sont en partie, possédant des mandibules propres à couper ou à déchirer, dont ils font usage.

C'est M. Latreille qui a, je crois, le premier remarqué que la langue ou le suçoir des *hyménoptères* était formé par l'union des mâchoires avec la lèvre inférieure qu'elles embrassent ; et c'est assurément une observation très-importante pour ceux qui s'intéressent à l'étude de la nature.

An lieu de considérer comment les mâchoires, en s'unissant à la lèvre inférieure, ont pu former un suçoir, il faut rechercher comment, en désunissant et raccourcissant les pièces du suçoir, la nature a pu transformer ce suçoir en deux mâchoires et en une lèvre séparée. Alors on concevra que ces parties, raccourcies et devenues libres, ont donné lieu à la bouche des insectes des ordres suivans, en qui le suçoir a tout-à-fait disparu.

Il est donc très-curieux de voir qu'en quittant les insectes suceurs, l'on trouve d'abord des demi-broyeurs, et qu'après ceux-ci l'on ne rencontre plus que des broyeurs complets.

Ces considérations, intéressantes pour la philosophie de la science, eussent été plutôt senties, si, dans l'étude

des insectes , comme dans celle des autres classes d'animaux, l'on n'eût pas toujours procédé du plus composé vers le plus simple, c'est-à-dire, dans un ordre inverse à celui de la nature.

Les hyménoptères sont liés, d'une part, aux lépidoptères par leur langue ou espèce de suçoir, ainsi que par leur nymphe immobile qui s'enferme dans une coque légère; et d'une autre part, ils tiennent aux névroptères par leurs mandibules et par leurs ailes nues et membraneuses. Ils ont même de si grands rapports avec les névroptères, que Geoffroy ne les en distinguait pas; mais il les y réunissait et en formait un ordre sous le nom de *tétraptères à ailes nues*. Il résulte de ces considérations, qu'il n'est pas possible de contester la transition naturelle que forment les *hyménoptères* des insectes suceurs aux insectes rongeurs, c'est-à-dire, de ceux qui n'ont qu'un suçoir pour prendre leur nourriture, à ceux qui ont des mâchoires et des mandibules utiles.

Les hyménoptères ont quatre ailes nues, membraneuses et d'inégale grandeur, les inférieures étant constamment plus courtes et plus petites que les supérieures. Ce caractère fait distinguer au premier aspect les *hyménoptères* des névroptères; car dans ceux-ci les ailes inférieures sont à-peu-près aussi longues que les supérieures, et quelquefois plus longues. Les unes et les autres, dans les premiers, sont chargées de nervures longitudinales peu nombreuses, et qui se joignent obliquement sans former de véritable réticulation comme celles des névroptères.

Lorsque l'insecte fait usage de ses ailes, il les étend sur le même plan l'une à côté de l'autre, et les unit fortement par le moyen de petits crochets qui ne sont visibles qu'au microscope. Ces ailes ne se séparent point tant que

le vol dure, et semblent n'en former qu'une seule de chaque côté. Nous avons vu des crochets analogues dans une grande partie des lépidoptères; mais, dans les papilionides où ces crochets n'existent point, nous avons remarqué que le vol était très-irrégulier et ne s'exécutait que par sauts et en zigzag.

Dans un grand nombre d'hyménoptères, l'anüs des femelles et celui des neutres de certaines races, est armé d'un aiguillon que l'insecte tient caché dans l'extrémité de son abdomen.

Un grand nombre d'autres hyménoptères n'ont pas l'aiguillon dont je viens de parler, mais parmi eux, les femelles sont munies d'une tarière à l'extrémité de leur abdomen; instrument qui leur sert à déposer leurs œufs, et souvent à percer les corps étrangers dans lesquels elles veulent les placer. Cette tarière, composée ordinairement de trois pièces, pique quelquefois comme un aiguillon, mais elle en est néanmoins très-distincte.

Les *hyménoptères* sont en général du nombre des insectes qui présentent les particularités les plus remarquables par des habitudes, qui sont quelquefois tellement singulières, qu'on a cru pouvoir les qualifier d'*industrie*, comme si elles provenaient de la faculté de combiner des idées, en un mot, de penser. L'illusion que l'on s'est faite sur la source de celles de leurs habitudes et de leurs manœuvres qui nous paraissent si étonnantes, sera détruite dès qu'on aura reconnu les produits, sur l'organisation intérieure, des habitudes contractées et conservées dans les diverses races, selon les circonstances dans lesquelles chacune a été forcée de vivre; et dès que l'on considérera que les individus de chaque race ne peuvent faire autrement que comme ils font.

Quoiqu'il en soit, ces insectes, sous toute sorte de rapports, sont très-intéressans, méritent d'être étudiés, et déjà beaucoup d'entr'eux ont attiré l'attention des naturalistes observateurs, et surtout de M. *Latreille* qui a beaucoup contribué à nous les faire bien connaître.

Il y en a qui vivent en société, qui semblent alors dirigés par une police admirable, et qui font des ouvrages étonnans par leur composition et leur régularité.

Toujours fidèle à mon plan qui consiste à employer les principales divisions établies par M. *Latreille* parmi les insectes, je partage l'ordre intéressant des *hyménoptères* en deux sections qui embrassent huit grandes familles : voici l'énoncé de ces divisions.

DIVISIONS PRINCIPALES DES HYMÉNOPTÈRES.

I.^{re} SECTION. HYMÉNOPTÈRES A AIGUILLON.

Point de tarrière distincte dans les femelles, pour déposer les œufs. Un aiguillon piquant caché dans le dernier anneau de l'abdomen des femelles et des neutres.

- (a) Larves vivant du pollen ou du miel des fleurs. Pattes postérieures ordinairement pollinifères.

Les Anthophiles.

- (b) Larves carnassières ou omnivores. Pattes postérieures jamais pollinifères.

Les Rapaces.

II.^e SECTION. HYMÉNOPTÈRES A TARRIÈRE.

Abdomen des femelles muni d'une tarrière distincte, qui sert à déposer les œufs.

- § Tarrière tubulaire, non fissile : elle forme à l'extrémité de l'ab-

domen un tube qui ne se divise point longitudinalement en plusieurs valves.

Les Tubulifères.

§§ **Tarrière plurivalve, fissile** : elle se divise longitudinalement en plusieurs valves, dont les latérales servent de gaine aux autres.

* **Abdomen pédiculé ou subpédiculé**. Il tient au corselet par un filet ou par un point, c'est-à-dire, par une petite portion de son diamètre transversal.

Larves apodes.

(1) **Antennes filiformes ou sétacées, de vingt articles ou davantage, le plus souvent vibratiles.**

Les Ichneumonides.

(2) **Antennes de seize articles au plus, et souvent d'un nombre moindre.**

(*) **Abdomen des femelles non caréné en dessous. Il s'insère sur le corselet ou au-dessus de son extrémité postérieure.**

Les Évantaies.

(*) **Abdomen des femelles caréné en dessous. Il s'insère à l'extrémité postérieure du corselet.**

(a) **Antennes brisées, s'épaississant en masse vers leur sommet. Tarrière non roulée en spirale dans l'inaction.**

Les Cinipsaires.

(b) **Antennes droites. Tarrière roulée en spirale dans l'inaction, et alors cachée entre deux lames sous l'abdomen.**

Les Diplolépaires.

** **Abdomen tout-à-fait sessile** : il tient au corselet par toute sa largeur.

Larves pédifères.

Les Érucaires.

PREMIÈRE SECTION.

HYMÉNOPTÈRES A AIGUILLON.

Abdomen des femelles dépourvu de tarière. Un aiguillon piquant, caché dans le dernier anneau de l'abdomen des femelles et des neutres. Larves apodes.

Les hyménoptères de cette section n'ont point de tarière, et même ne montrent au dehors aucun aiguillon apparent. Cependant ils en ont un, surtout les femelle et les neutres, et cet aiguillon est caché dans l'extrémité de leur abdomen. Il paraît que cet aiguillon ne leur sert nullement à déposer les œufs, et qu'il n'est réellement qu'une arme pour ces insectes. Cette arme qu'ils emploient tantôt pour se défendre de leurs ennemis ou de ceux qui les incommode, tantôt pour tuer d'autres insectes, est vénéfère, et fait en général une douleur très cuisante.

Comme les hyménoptères à aiguillon sont très-nombreux et que les uns ne vivent que du miel ou du pollen des fleurs, tandis que les autres pompent différents sucres et même vivent de proie, on les a partagés en deux familles naturelles ; savoir :

Les Anthophiles;

Les Rapaces.

Examinons successivement chacune de ces familles.

PREMIÈRE FAMILLE.

LES ANTHOPHILES.

Larves vivant du pollen ou du miel des fleurs. Les pates postérieures de l'insecte parfait ordinairement pollinifères.

Parmi les hyménoptères à aiguillon, on distingue les *anthophiles* ou ceux qui aiment les fleurs dont ils sucent le miel, des *rapaces*, c'est-à-dire, de ceux qui vivent de proie. On peut considérer les anthophiles comme composant une grande famille, de laquelle les abeilles font essentiellement partie.

Comme la plupart ramassent le pollen des fleurs, et qu'ils rassemblent cette poussière des étamines sur la palette que forme le premier article des tarses postérieurs, on a, en effet, remarqué que, dans les *anthophiles*, le premier article des tarses postérieurs est fort grand, dilaté, comprimé, et, en général, velu ou muni d'une brosse.

Dans les insectes de cette famille, la division intermédiaire de la lèvre inférieure, qui fait partie de leur sucoir, est fort allongée, subfiliforme, surtout dans ceux de la division des apiaires. Le menton est cylindrique, et sert de gaine à la partie inférieure de la langue ou promuscide.

Les larves des *anthophiles* sont apodes et vermiformes. Elles vivent, en général, solitairement dans la loge ou l'alvéole où elles sont renfermées avec leur provision de nourriture.

Abdomen ovale-trigone ; allongé-conique dans les femelles. Premier article des tarses postérieurs dilaté, comprimé, en carré long, ayant une dent marginale vers sa base, et velu d'un côté, avec des stries transverses dans les neutres. Gâteaux formés de cire, ayant des alvéoles sur les deux faces.

Antennæ filiformes ; fractæ. Labrum transversum. Mandibulæ subtrigonæ ; dorso lævi. Palpi quatuor inæquales : maxillaribus uniarticulatis. Lingua elongata, filiformis, in quiete inflexa et mento incumbens.

Insecta societates ineuntia : ordinibus tribus pro specie ; masculi, femineæ et neutra.

Abdomen ovale, subtrigonum : in feminis elongato-conicum. Tarsorum posticorum articulus primus dilatatus, compressus, elongato-quadratus, versus basim dente vel auriculâ auctus, uno latere hirsutus cum striis transversis in neutris.

Nidi è cerâ constructi ; alveolis in utraq. superficie insidentibus.

OBSERVATIONS.

Le genre abeille (*apis*), établi par Linné, était très-nombreux en espèces. On y réunissait une multitude d'apiaries qui offraient, entr'elles, de grandes différences dans leurs habitudes et leur manière d'être. On y associait même celles qui vivent en société formée de trois sortes d'individus, avec celles qui vivent solitairement et dont l'espèce ne se compose que de mâles et de femelles. On devait donc s'attendre que tant de diversité dans la manière d'être de ces apiaries, avait dû produire dans les caractères des parties de ces insectes, des différences remarquables; ce qui fut effectivement constaté par l'observation.



SANS VERTÈBRES.

49

, les entomologistes modernes, et surtout M. Latrond considérablement réduit le genre *apis* de Linné, tagé en différens genres particuliers, employant nsidérations dont les principales sont tirées, soit e la langue ou promuscide, soit de celui du pre- e des tarses postérieurs.

pté plusieurs de ces distinctions génériques parmi hiles; et dans la division des apiaires, le genre nt il s'agit ici, est le même que celui qu'a institué lle.

illes ont le corps velu ou pubescent, l'abdomen ssile, les ailes non plissées longitudinalement, guépiaires, des brosses de poils au premier arti- s tarses postérieurs sur une de ses faces, surtout eûtres où cet article est strié transversalement en lue. Ces insectes vivent en grandes sociétés, com- trois sortes d'individus, parmi lesquels les mâles iquent point, et manquent probablement d'aigui- ; petits yeux lisses sont disposés en triangle. Leurs stérieures sont inermes et non terminées par des comme dans les bourdons et les englosses.

combien ces insectes sont intéressans, soit par leurs utiles pour nous (le miel et la cire), soit par les ités singulièrement curieuses de leurs sociétés, de act, de leurs travaux et des habitudes particulières sorte d'individu de ces sociétés. Les neutres, qui ue des femelles avortées ou sans sexe, forment, ue société, le plus grand nombre d'individus; ce qui font tout le travail, et l'on sait maintenant quels noyens qu'ils employent au besoin, pour obtenir : femelles fécondes.

cela est actuellement bien connu; mais ce qui ne encore suffisamment, c'est la source de la cire. On nsé que la cire provenait du pollen des fleurs, et nt le naturaliste Hubert prétend qu'elle n'est que du
n. IV.

miel altéré ou changé par la digestion dans l'estomac des abeilles. Un mélange de cire et de miel trouvé dans le second estomac de l'abeille, paraît avoir donné lieu à cette opinion. M. *Hubert* a considéré ce mélange comme de la cire en partie formée et plus ou moins perfectionnée. Son opinion à cet égard est-elle fondée ?

Les abeilles ici déterminées sont originaires de l'ancien continent. Celles que l'on connaît dans le nouveau (l'Amérique), offrant quelques caractères particuliers, constituent le genre des mélipones, qui vient ensuite.

E S P È C E S.

1. Abeille domestique. *Apis mellifica*.

A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco: tribus posterioribus ciliatis, intus transversè striatis. Lin.

Apis mellifica. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 10.

L'abeille domestique. Geoff. 2. p. 407.

Habite en Europe, dans les bois. On l'élève ou la cultive en domesticité dans des ruches pour en retirer le miel et la cire qu'elle recueille.

2. Abeille de Madagascar. *Apis unicolor*.

A. subnigra, pubescens; thoracis dorso nudiusculo; abdomine nitido, partim glabro, unicolore.

Apis unicolor. Latr. Annales du mus. vol. 5. p. 168. pl. 13. f. 4.

Habite l'île de Madagascar, celles de France et de Bourbon. Elle est un peu plus petite que la précédente, à abdomen un peu plus court proportionnellement, et donne un miel très doux d'un goût exquis.

3. Abeille indienne. *Apis indica*.

A. nigra, cinereo-pubescens; abdomine subglabro: segmentis primariis fusco-rubentibus.

Apis indica. Latr. Annales du mus. 4. p. 390. pl. 69. f. 1. et vol. 5. p. 169. pl. 13. f. 5.

Habite au Bengale et à Pondichéry.

4. Abeille ailes-noires. *Apis nigripennis*.

A. fusco-nigra, pubescens; abdominis dorso hirsutis rufescente oblecto; alis anticis nigrinis.

Apis nigripennis. Latr. Annales du mus. 5. p. 170. pl. 13. f. 7.

Habite au Bengale. *Massé*.

5. Abeille fasciée. *Apis fasciata*.

A. fusco-nigrescens, *supernè hirsutie cinereo-flavicante onusta*; *scutello abdominisque segmentis primariis rubentibus*.

Apis fasciata. Latr. Annales du mus. 5. p. 171. pl. 13. f. 9.

Habite l'Italie, près de Gênes; l'Égypte.

6. Abeille ligurienne. *Apis ligustica*.

A. abdominis segmentis duobus primariis basique tertio pallidè rubentibus.

Apis ligustica. Spinol. Latr. mém. sur les ab. Humboldt.... p. 28. pl. 19. f. 4-6.

Habite l'Italie et probablement la Morée, l'Archipel, le Levant. Etc.

MÉLIPONE. (Melipona.)

Antennes comme dans les abeilles. Lèvre supérieure souvent à peine apparente. Petits yeux lisses en une ligne transverse.

Insectes vivant en société formée de trois sortes d'individus. Abdomen court, arrondi-conique.

Premier article des tarses postérieurs comprimé, rétréci à sa base, obtrigone, inauriculé, jamais strié transversalement. Onglets des tarses non dentés.

Nids alvéolaires formés de cire.

Antennæ ut in apibus. Labrum sæpè vix conspicuum. Ocelli in lined transversa dispositi.

Insecta societates ineuntia : ordinibus tribus pro spec. *Abdomen breve, conico-rotundatum.*

Tarsorum posticorum articulus primus compressus,

basi attenuatus , obtrigonus , inauriculatus , nunquam transversè striatus. Ungues tarsorum edentuli.

Nidi alveolares è cerâ constructi.

OBSERVATIONS.

Ce genre embrasse les mélipones et les trigones de *M. Latreille*. Il se compose d'apiaries qui vivent en Amérique, et qui ont tant de rapports avec les abeilles qu'on aurait pu ne pas les en séparer. Cependant, comme elles offrent quelques caractères distinctifs, et qu'elles ont peut-être des habitudes particulières, j'ai conservé cette distinction déjà établie.

Les jambes postérieures des mélipones sont sans épines au sommet comme celles des abeilles; mais elles sont proportionnellement plus larges. Le bout inférieur de ces jambes paraît concave ou échancré, et offre à son angle interne un faisceau de cils nombreux et serrés. Le premier article des tarses postérieurs n'offre point cette dent ou cette oreillette marginale que l'on observe à celui des abeilles.

ESPECES.

1. Mélipone ruchaire. *Melipona favosa*.

M. nigra; thorace hirsutie rufescente oblecto; clypeo maculato; abdominis segmentis margine flavis.

Apis favosa. Fab. suppl. p. 275.

Coqueb. illustr. ic. dec. 3. t. 22. f. 3.

Latr. Annales du mus. 5. p. 175. t. 13. f. 12.

Habite à Cayenne.

2. Mélipone Amalthée. *Melipona Amalthea*.

M. nigra, immaculata; tarsi apice obscure rufis.

Apis Amalthea. Oliv. dict. n.º 102. Fab. n.º 52.

Latr. Annales du mus. 5. p. 174. pl. 13. f. 13.

Habite à Cayenne, à Surinam. Les alvéoles de son nid sont très-grandes relativement à la petitesse de l'insecte. Son miel est très-fluide, doux, fort agréable.

Mélipone jambes-rousses. *Melipona ruficrus*.

M. nigra; tibiis posticis articuloque primo tarsi luteo-brunneis.

Apis ruficrus. Latr. Annales, 5. p. 176.

Trigona ruficrus. Jurin. hyménopt. p. 26.

Habite le Brésil.

Mélipone cul-jaune. *Melipona postica*.

M. nigra: capitis anticiis, antennarum scapo, pedibus anticiis aliorumque maximâ parte, rufescentibus; thorace pubescente; abdomine posticè flavescenti-sericeo.

Melipona postica. Illig. magaz. 1806. p. 157.

Latr. mém. sur les ab. Humboldt. voyage, p. 33. pl. 20. f. 4.

Habite le Brésil.

Mélipone pâle. *Melipona pallida*.

M. abdomine trigono, depresso; corpore penitus rufescenti.

Trigona pallida. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 183.

Apis pallida. Latr. Annales du mus. 5. p. 177. pl. 13. f. 14.

Habite à Cayenne.

Etc.

BOURDON. (Bombus.)

Antennes filiformes, brisées. Lèvre supérieure transverse. Mandibules en cuilleron, à sommet arrondi, denté. Quatre palpes : les maxillaires spatulés. Petits yeux lisses ligne transverse.

Le corps gros, très-velu : couleur des poils variée par bandes transverses ou par taches. Les jambes postérieures terminées par deux épines.

Trois sortes d'individus pour l'espèce.

Antennæ filiformes, fractæ. Labrum transversum. Mandibulæ cochleariformes, apice rotundatæ, dentatæ. Palpi quatuor : maxillaribus spatulatis. Ocelli in lineâ transversâ dispositi.

Corpus magnum, hirsutissimum. Pilis in fasciis aut maculas versicolores dispositis. Tibiæ posticæ apice bispinosæ.

Societas è tribus ordinibus individuorum pro specie.

OBSERVATIONS.

Les *bourdons* constituent un genre qui mérite d'être conservé. Ils se distinguent des abeilles non-seulement par leur corps gros, très-velu, offrant des zones colorées transversales ou des taches fort remarquables, et par leurs jambes postérieures terminées par deux épines, mais parce que leurs mandibules sont en cuilleron, surtout dans les femelles et les neutres, et parce que leurs petits yeux lisses sont disposés en ligne transverse.

Ces apiaires vivent en société comme les abeilles; mais leur nombre y est bien moins considérable, car il ne va guère, dit-on, qu'à une vingtaine.

On sait que la plupart de ces grosses apiaires, à corps très-velu et coloré par zones transverses, font leur nid dans la terre, et particulièrement dans les terrains recouverts de gazon. Les trous qu'elles y forment sont assez vastes et se maintiennent par l'entrelacement des racines qui affermit le terrain. On dit que les gâteaux que se construisent les *bourdons* n'ont des cellules que d'un seul côté; que ces cellules sont cylindriques et non hexagones; et que les larves vivent plusieurs ensemble dans la même cellule. Au reste, c'est dans les cellules de ces gâteaux que ces insectes déposent leurs œufs avec une quantité de miel nécessaire pour la nourriture des petits.

ESPECES.

1. Bourdon terrestre. *Bombus terrestris.*

B. hirsutus, niger; thorace abdomineque cingulo flavo; ano albo.

Apis terrestris. Lin. Fab. Oliv.

Panz. fasc. 1. tab. 16.

Geoff. 2. p. 418. n.º 24.

Habite en Europe; très-commun.

Bourdon des pierres. *Bombus lapidarius*.

B. hirsutus, ater; ano fulvo; alis albo hyalinis.

Apis lapidaria. Lin. Fab. Olivier.

Abeille. Geoff. 2. p. 417. n.º 21 et n.º 22. *Apis arbustorum*.
Fab.

Habite en Europe; commun. On a pris le mâle et la femelle
pour deux espèces.

Bourdon des jardins. *Bombus hortorum*.

B. hirsutus, ater; thorace flavo : fasciâ atrâ; abdomine
anticâ flavo; ano albo.

Apis hortorum. Lin. *Apis ruderata*. Fab.

Abeille. Geoff. 2. p. 418. n.º 25.

Habite en Europe. Il fait son nid dans la terre.

Bourdon cul-blanc. *Bombus soroeensis*.

B. hirsutus, ater; ano albo.

Apis soroeensis. Fab. Panz. fasc. 7. t. 11. et fasc. 85. t. 18.

Habite en Europe, dans les bois; il est tout noir, à cul blanc.

Bourdon des forêts. *Bombus sylvarum*.

B. hirsutus, pallidus; thoracis fasciâ nigrâ; ano rufo.

Apis sylvarum. Lin. Fab. Oliv. n.º 35.

Habite en Europe, dans les forêts.

Bourdon d'été. *Bombus vestalis*.

B. niger; thoracis basi, abdominisque extremitatibus latera-
libus flavis; ano albo.

Bombus vestalis. Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 14. p. 65.

Abeille. Geoff. 2. p. 419. n.º 26.

Panz. fasc. 89. tab. 16.

Habite aux environs de Paris.

Etc.

EUGLOSSE. (Euglossa.)

Antennes comme dans les abeilles. Lèvre supérieure carrée. Mandibules dentées. Quatre palpes : les labiaux très-longs, sétiformes. Trompe ou promuscide très-longue, atteignant jusqu'aux pattes postérieures dans le repos.

Les jambes postérieures terminées par deux épines.

Antennæ ut in apibus. Labrum quadratum. Mandibulæ dentatæ. Palpi quatuor : labialibus longissimis, setiformibus. Promuscis longissima, ad pedes posticos usque in quiete productâ.

OBSERVATIONS.

Les *euglosses* sont des apiaires étrangères, distinguées des abeilles et des mélipones par leurs jambes postérieures munies d'éperons à leur extrémité. Leurs petits yeux lisses sont disposés en triangle.

ESPECES.

1. Euglosse dentée. *Euglossa dentata*. Latr.
E. viridis, nitida; alis nigris; femoribus posticis dentatis.
Apis dentata. Lin. Fab. p. 339.
 Sulz. ins. tab. 17. f. 16.
 Habite l'Amérique méridionale.
2. Euglosse cordiforme. *Euglossa cordata*,
E. viridis, nitida; alis hyalinis; abdomine cordato; tibiis posticis dilatatis.
Apis cordata. Lin. Fab.
 Degeer ins. 3. tab. 28. f. 5.
 Habite à Surinam.
 Etc.

MÉLITURGE. (Meliturga.)

Antennes subfiliformes, de la longueur de la tête, à : en massue obconique dans les mâles. Mandibules s dent au côté interne. Palpes labiaux semblables aux xillaires, filiformes.

Corps velu. Les pattes postérieures pollinifères.

Antennæ subfiliformes, capitis longitudine; caule conico-clavato. Mandibulæ latere interno edentulo. Ipi labiales maxillaribus similes, filiformes. Corpus hirsutum. Pedes postici polliniferi.

OBSERVATIONS.

Les *méliturges* ont, comme nos anthophores, les divisions latérales de la lèvre inférieure beaucoup plus courtes que ses palpes; mais ils s'en distinguent par leurs palpes labiaux semblables aux maxillaires. On ne connaît encore que l'espèce suivante.

ESPÈCE.

Méliturge clavicorne. *Meliturga clavicornis*.

Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 14. f. 9. et vol. 4. p. 177.

Habite aux environs de Lyon et de Montpellier.

ANTHOPHORE. (Anthophora.)

Antennes courtes dans les deux sexes, filiformes ou un peu épaissies vers leur sommet. Mandibules unidentées

ou quadridentées. Palpes dissemblables : les labiaux se formes.

Corps comme dans les abeilles. Pattes postérieures pollinifères.

Antennæ in utroque sexu brevès , filiformes aut e trorsum paulò crassiores. Mandibulæ unidentatæ et quadridentatæ. Palpi dissimiles : labialibus setiformibus.

Corpus ut in apibus. Pedes postici polliniferi.

OBSERVATIONS.

Sous cette coupe, je réunis les anthophores, les saropodes et les centris de M. Latreille. Toutes ces apiaires viv solitairement, ont les pattes postérieures pollinifères, et distinguent des eucères parce qu'elles ont, ainsi que méliturges, les divisions latérales de la lèvre inférieure beaucoup plus courtes que ses palpes. On ne les confond point avec les méliturges, puisqu'ils ont les palpes dissemblables, que les labiaux sont différens des maxillaires.

Dans les anthophores et les saropodes de M. Latreille, mandibules sont unidentées au côté interne; dans les centris, elles sont quadridentées.

Les anthophores font leur nid, les uns dans les murs, autres dans la terre.

E S P E C E S.

(Mandibules unidentées.)

1. Anthophore velu. *Anthophora hirsuta*. Latr.

A. ferrugineo-hirta ; *pedibus posticis elongatis, apicibus sutissimis.*

Andrena hirsuta. Fab. p. 312. mas.

Apis hispanica. Fab. p. 318. Panz. fasc. 55. t. 6.

Apis pilipes. Panz. *ibid.* t. 8.

Habite en Europe. Il fait son nid dans les murs. On le trouve à Paris.

Anthophore des murs. *Anthophora parietina*. Latr.

A. hirsuta, atra; abdominis segmento tertio quartoque cinerascens.

Apis parietina. Fab. p. 323. Abeille, n.º 9. Geoff.

Habite aux environs de Paris; en Allemagne.

Anthophore grosse-cuisse. *Anthophora femorata*. Latr.

A. cinereo-villosa; abdominis segmentis margine albido ciliatis; ventre lano cinereo; tibiis posticis elongatis dilatatis, intus obsolete dentatis.

Panz. fasc. 105. tab. 18 et 19.

Habite en Europe.

Anthophore fourchu. *Anthophora furcata*.

A. cinereo-pubescent, atra; antennarum articulo primo fronte labioque flavis; abdomine apice furcato; tarsis ferrugineis.

Panz. fasc. 56. tab. 8.

Habite en Allemagne.

Anthophore saropode. *Anthophora saropoda*.

A. nigra, cinereo-hirta; abdomine subgloboso; segmentorum marginibus albis.

Apis rotundata. Panz. fasc. 56. tab. 9.

Saropoda. Latr.

Habite en Allemagne.

(*Mandibules quadridentes.*)

6. Anthophore hémorrhoidale. *Anthophora hæmorrhoidalis*.

A. atra; abdomine cæneo rufo.

Apis hæmorrhoidalis. Fab. p. 339.

Centris. Latr.

Habite les îles de l'Amérique.

7. Anthophore grosse-patte. *Anthophora crassipes*.

A. fusca; abdomine brevi; tibiis posticis compresso-clavatis abdomine majoribus.

Apis crassipes. Fab. p. 340.

Centris. Latr.

Habite les îles de l'Amérique méridionale.

8. Anthophore versicolor. *Anthophora versicolor*.

A. thorace hirsuto-cinerascente; abdomine cyaneo; aurorifescente.

Apis versicolor. Fab. p. 340.

Centris. Latr.

Habite les îles de l'Amérique.

Etc.

SYSTROPHE. (*Systropha*.)

Antennes des mâles plus longues, filiformes, contournées presque en spirale à leur extrémité. Mandibules bidentées. Palpes semblables : les labiaux à second article plus long.

Les femelles diffèrent des mâles par leurs antennes plus courtes, etc.

Antennæ masculorum longiores, filiformes, apice convolutæ. Mandibulæ bidentatæ. Palpi conformes: labialibus articulo secundo longiore.

Feminae à masculis differunt antennis brevioribus, etc.

OBSERVATIONS.

Les *systrophes* ressemblent à de petites abeilles par leur aspect; mais, outre que ce sont des apiaires solitaires, ils ont des caractères particuliers qui les distinguent des autres. Leurs petits yeux lisses sont en ligne transverse. On ne connaît encore que l'espèce suivante.

ESPECE.

Systrophe spirale. *Systropha spiralis*. Illig.

Andrena spiralis. Oliv. Fab. p. 308.

Anthidium spirale. Panz. fasc. 35. tab. 22.

Coqueb. illustr. ic. dec. 2. t. 15. f. 8.

Habite en Provence.

PANURGE. (Panurgus.)

Antennes courtes dans les deux sexes, droites, pressées en fuseau. Mandibules aiguës, sans dentelures au côté interne. Petits yeux lisses en triangle. Palpes semblables. Corps épais.

Antennæ in utroque sexu breves, rectæ, subfusiformes. Mandibulæ acutæ, edentulæ. Ocelli in triangulum dispositi. Palpi conformes.

Corpus crassum.

OBSERVATIONS.

Ce que les panurges ont de commun avec les systrophes, c'est d'avoir les palpes semblables pour la forme; mais le premier article des labiaux est plus long que les autres. Ces antennes sont noires, plus allongées que les systrophes, à segments courtes, divergentes.

ESPECES.

Panurge à lobes. *Panurgus lobatus*. Latr.

P. pubescens, ater; mandibulis arcuatis edentulis; antennis apice ferrugineis; femoribus posticis laminis quadratis auctis.

Andrena lobata. Panz. fasc. 72. tab. 16. mas.

Trachuza lobata. Panz. fasc. 96. t. 18. *femina*.

Dasypoda lobata. Fab. n.º 3.

Habite en Allemagne, sur les fleurs composées et ombragées.

2. *Panurge unicolor*. *Panurgus unicolor*. Latr.

P. villosus, *ater*; *antennis nigris*.

Philanthus ater? Fab. p. 292.

Habite l'Italie, près de Gènes. Les cuisses postérieures ont une dent comme dans l'espèce précédente.

XYLOCOPE. (Xylocopa.)

Antennes courtes, filiformes, brisées. Lèvre supérieure transversale, carénée, épaisse à sa base. Mandibules à bout obtus et tridenté. Palpes inégaux. Les labiaux sétiformes.

Corps et pattes velus. Ailes colorées.

Antennæ breves, filiformes, fractæ. Labrum transversum, carinatum, ad basim incrassatum. Mandibula apice obtuso tridentata. Palpi dissimiles: labiales setiformibus.

Corpus pedesque hirsuti.

OBSERVATIONS.

Les xylocoques, ou percebois, n'ont pas les palpes sétiformes comme les panurges et les systrophes, et ont leurs mandibules en cuilleron, tridentées au sommet. Ce sont de grosses apiaires, velues, noires, avec des ailes d'un bleu violet ou blanches. Elles diffèrent des cératins par leur lèvre supérieure transversale, non fléchie en bec; elles sont distinguées des mégachiles, parce que leur lèvre supérieure n'est point plus longue que large.

Ces apiaires, dites *charpentières*, font leur nid dans les vieux bois ou dans les troncs d'arbres morts, qu'elles percent ou qu'elles trouvent déjà percés. Elles y placent successivement un œuf et de la pâtée, avec des séparations faites de pure de bois, agglutinée.

E S P E C E S.

Xylocope violette. *Xylocopa violacea*. Lath.

X. hirsuta, atra; alis violaceis.

Apis violacea. Lin. Fab. Panz. fasc. 59. t. 6.

Abeille, n.º 19. Geoff.

Habite en Europe.

Xylocope orientale. *Xylocopa latipes*.

X. hirsuta, atra; tarsis anticis, explanatis, flavis, intus ciliatis.

Apis latipes. Fab. Drury. ins. 2. t. 48. f. 2.

Habite les Indes orientales, la Chine.

Xylocope morio. *Xylocopa morio*.

X. hirsuta, atra, immaculata; alis cyaneis.

Apis morio. Fab. p. 315.

Habite l'Amérique méridionale, le Brésil.

Etc.

C É R A T I N E. (Cératina.)

Antennes filiformes, un peu en massue. Lèvre supérieure unie, presque carrée, et inclinée verticalement en dedans. Mandibules obtuses, tridentées. Palpes dissemblables. Corps oblong, presque glabre. Abdomen subovale, éci à sa base.

Antennæ filiformes, apice subclavatae. Labrum subdratum, læve, ad perpendiculum cadens. Mandibulae obtusae, tridentatae. Palpi non conformes.

Tome IV.

Habite en Europe. Elle fait son nid sur les murs exposés au soleil.

2. Mégachile centunculaire. *Megachile centuncularis*. Latr.

M. nigra; abdomine lineis albis; subtus laevi fulva. G.

Apis centuncularis. Lin. Fab. p. 357.

Panz. fasc. 55. tab. 12.

Geoff. 2. p. 410. n.° 5.

Habite en Europe. Elle fait son nid dans la terre et coupe des feuilles de rosier pour le tapisser.

3. Mégachile du pavot. *Megachile papaveris*.

M. nigra; mandibulis tridentatis; capite thoraceque rufescente griseo hirsutis; abdominis segmentis lineis marginalibus villosulo-albidis.

Megachiles papaveris. Panz. fasc. 105. tab. 16—17.

Osmia papaveris. Latr. Encycl. n.° 21.

Habite en Europe. Elle fait son nid dans la terre, et coupe des pétales de coquelicot pour le tapisser.

4. Mégachile bicorne. *Megachile bicornis*.

M. rufa; corpore hirsuto; femina clypeo bicorni.

Apis rufa. Lin. Panz. fasc. 56. t. 10.

Osmia bicornis. Latr. Encycl. n.° 3.

Habite en Europe. Elle fait son nid dans les troncs des vieux arbres, dans des poutres, etc.

5. Mégachile à crochets. *Megachile manicata*.

M. cinerea; abdomine nigro: maculis lateralibus flavis; antennis quinque-dentato.

Apis manicata. Lin. Fab. p. 330.

Panz. fasc. 55. tab. 10—11. *Apis maculata*. ejusd. fasc. 7: t. 14.

Abeille. Geoff. 2. p. 408. n.° 3.

Anthidium manicatum. Latr.

Habite en Europe, sur les fleurs. Elle fait son nid dans les creux des arbres. On croit que c'est une cardeuse.

6. Mégachile conique. *Megachile conica*.

M. atra, nitida; abdomine conico, acutissimo: segmentorum marginibus albis.

Apis conica. Lin. *Anthophora conica*. Fab.

Apis bidentata Panz. fasc. 59. t. 7.

Cœlioxya conica. Latr.

Habite en Europe.

7. Mégachile des troncs. *Megachile truncorum*.

M. nigra; abdomine cylindrico: segmentis marginibus albis; subtus cinereo, hirsuto.

Apis truncorum. Lin. *Hylæus truncorum*. Fab. p. 305.

Panz. fasc. 64. tab. 15.

Heriades truncorum. Latr.

Habite en Europe. Commune.

8. Mégachile grandes-dents. *Megachile maxillosa*.

M. nigra; mandibulis prominentibus; antennis thorace brevioribus; abdomine cylindrico subtus luteo, hirsuto.

Apis maxillosa. Lin. *Hylæus maxillosus*. Fab.

Panz. fasc. 53. tab. 17.

Chelostoma maxillosa. Latr.

Habite en Europe. Elle fait son nid sur les vieux bois, les pieux.

Etc.

PHILÉRÈME. (Phileremus.)

Antennes filiformes, courtes, divergentes. Lèvre supérieure plus longue que large, rétrécie vers son extrémité, formant un triangle allongé, tronqué au sommet, et inclinée perpendiculairement en bas. Mandibules étroites, pointues, unidentées au côté interne.

Corps pubescent ou presque glabre.

Antennæ filiformes, breves, divaricatæ. Labrum longius quàm latius, versùs extremitatem angustatum, elongato-trigonum, apice truncatum, ad perpendiculum cadens. Mandibulæ angusto-acutæ, latere interno unidentatæ.

Corpus pubescens vel glabriusculum.

OBSERVATIONS.

Les *philérèmes* ont la lèvre supérieure plus longue que large et inclinée en bas sous les mandibules, comme dans les mégachiles; mais cette lèvre, au lieu d'être en carré long, est en triangle allongé, tronqué au sommet. Ces apiaires ont les mandibules étroites et pointues.

Par ces caractères, les ammobates de M. *Latreille* peuvent se ranger sous cette coupe; ils diffèrent des *philérèmes* par leurs palpes maxillaires à six articles, ceux de ces derniers n'en ayant que deux.

ESPECE.

1. Philérème ponctué. *Phileremus punctatus*.

Ph. niger, cinereo-subvillosus; abdomine rufo: margine nigro albo vario.

Epeolus punctatus. Fab. p. 389.

Habite aux environs de Paris.

NOMADE. (Nomada.)

Antennes filiformes, courtes. Lèvre supérieure demi-circulaire, un peu plus large que longue. Quatre palpes: les antérieurs à six articles; les postérieurs à quatre. Langue allongée, fléchie en dessous.

Corps glabre, oblong; tête large; corselet ovale, convexe; abdomen presque sessile.

Antennæ filiformes, breves, thoracis vix longitudine. Labrum semicirculare, paulò latius quàm longius. Palpi quatuor: anterioribus sexarticulatis, pos-

terioribus quadriarticulatis. Lingua elongata, in quatuor subtilius inflexa.

Corpus glabrum, oblongum; caput latum; thorax subovalis, convexus; abdomen subsessile.

OBSERVATIONS.

Les *nomades* ont la langue ou trompe à-peu-près comme celle des abeilles, longue, à oreillettes ou divisions latérales courtes; et dans l'inaction, elle est fléchie en dessous et rabattue contre la gaine; mais leurs antennes ne sont pas brisées. Leurs palpes sont un peu longs; leurs mandibules sont étroites, aiguës, quelquefois unidentées au côté interne.

Ces apiaires ont le corps glabre ou légèrement pubescent, et n'ont pas le premier article des tarses postérieurs dilaté, muni d'une brosse, et propre à recueillir le pollen. On dit que les femelles vont pondre dans le nid des abeilles et des andrènes. Les *nomades* connues sont déjà nombreuses en espèces: voici la citation de quelques-unes.

ESPÈCES.

1. Nomade panachée. *Nomada variegata*.

N. thorace abdomineque albo-variegatis; pedibus ferrugineis.

Apis variegata. Lin.

Epeolus variegatus. Latr.

Habite en Europe. On la trouve la nuit sur les fruits du *geranium phæum*.

2. Nomade agreste. *Nomada agrestis*.

N. hirta, abdominis segmentis apice nigris.

Nomada agrestis. Fab.

Habite en Espagne.

3. Nomade ruficorne. *Nomada ruficornis*.

N. antennis pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis; abdomine ferrugineo, luteo variegato. F.

Apis ruficornis. Lin.

Nomada ruficornis. Fab. Panz. fasc. 55. t. 18.

Habite en Europe.

4. Nomade jaune. *Nomada flava*.

N. thorace atro, griseo-pubescent; abdomine flavo, ugmentorum marginibus rufis. Oliv.

Nomada flava. Fab. Oliv. dict. n.º 10.

Panz. fasc. 53. tab. 21.

Habite en France, en Allemagne.

Etc.

ANTHOPHILES ANDRÉNÉTTES.

Les *andrénètes* sont des hyménoptères anthophiles comme les apiaires; mais, au lieu d'avoir leur langue ou sa division intermédiaire, réfléchie en dessous dans l'inaction, elles s'en distinguent en ce que, dans le repos, leur langue ou sa division intermédiaire, est alors, soit réfléchie en dessus, soit droite ou presque droite.

Ces insectes ne vivent point en société, n'offrent, pour chaque espèce, que des mâles et des femelles, et leurs larves ne se nourrissent que de miel ou du pollen des fleurs. La plupart des espèces font des trous dans la terre, y déposent un œuf et de la pâte, le bouchent ensuite, et se multiplient de cette manière.

Je ne rapporte à cette division que les trois genres suivans : *Andrène*, *Halicta* et *Collète*.

A N D R È N E. (*Andrena*.)

Antennes filiformes, un peu courtes. Quatre palpes inégaux. Deux mandibules bidentées. Langue trifide : à pièce

intermédiaire lancéolée, repliée en dessus dans l'inaction.

Corps velu.

Antennæ filiformes , breviusculæ. Palpi quatuor inæquales. Mandibulæ bidentatæ. Lingua trifida : intermediâ parte lanceolatâ , in quiete sursum reflexâ.

Corpus villosum.

OBSERVATIONS.

Je réunis ici les andrènes et les dasypodes de M. Latreille. Ils se distinguent des halictes qui suivent, en ce que, dans l'inaction, la partie intermédiaire de leur langue est repliée en dessus.

Les andrènes ont beaucoup de rapports avec les abeilles, mais elles en diffèrent principalement par leur trompe ou langue. Elles ont la tête ovale, penchée; les antennes insérées entre les yeux; l'abdomen noirâtre avec une bordure jaune ou blanche sur chaque anneau.

Ces insectes font leur nid dans la terre ou dans le sable, ou dans de vieux murs, et ne vivent point en société. La femelle construit son nid, fait sa ponte, et y met la provision nécessaire à la larve.

On trouve les andrènes sur différentes fleurs.

ESPÈCES.

1. Andrène cendrée. *Andrena cineraria*. Latr.

A. nigra, thorace hirsuto-albicante : fascia nigra; abdomine cærulescente.

Apis cineraria. Lin. Fab.

Schœff. ic. tab. 22. f. 5—6.

Habite en Europe. Extrémité des ailes, noirâtre.

2. Andrène vêtue. *Andrena vestita*.

A. atra thoracis abdominisque dorso ferrugineo hirtis.

Apis vestita. Fab.

Panz. fasc. 55. tab. 9.

Habite en France.

3. Andréne carbonaire. *Andrena carbonaria*. Fab.

A. atra; thorace cinereo-pubescente, pedibus lævibus, alis fuscis.

Apis carbonaria. Lin.

Habite en Allemagne.

4. Andréne pattes-ciliées. *Andrena pilipes*. Fab.

A. glabra atra; pedibus posticis albo-ciliatis, alis fuscis.

An Andrena aterrima? Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 13. p. 363.

Habite le Piémont.

5. Andréne pattes-hérissées. *Andrena hirtipes*. Fab.

A. cinereo-villosa, abdomine atro: fasciis quatuor atbis; pedibus posticis rufo-hirsutissimis.

Dasygaster hirtipes. Fab. Latr.

Panz. fasc. 7. tab. 13. et fasc. 46. tab. 16.

Habite aux environs de Paris.

HALICTE. (Halictus.)

Antennes filiformes, arquées. Quatre palpes inégaux. Langue trifidé : à division intermédiaire presque droite ou courbée inférieurement.

Corps oblong, plus ou moins velu.

Antennæ filiformes, arcuatæ. Palpi quatuor inæquales. Lingua trifida : intermedia parte subrecta aut incurv.

Corpus oblongum, subvillosum.

OBSERVATIONS.

Sous la dénomination d'*halicte*, je réunis les halictes, les

hécodes et les nomies de M. Latreille. Ces insectes, quoiqu'avoisinant les andrènes, s'en distinguent en ce que, dans l'action, leur langue ou sa division intermédiaire n'est point réfléchie en dessus, mais reste presque droite, ou même est courbée inférieurement.

E S P E C E S.

Halicte à quatre raies. *Halictus quadristrigatus*. Latr. •

H. niger, subvillosus; abdominis segmentis quatuor partim margine villosis-albis.

Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 13. p. 365.

Hylæus grandis. Illig. Schœff. ic. ins. tab. 32. f. 19.

Habite aux environs de Paris, sur les chardons. La femelle fait son nid dans la terre.

Halicte à six raies. *Halictus sexcinctus*. Latr.

H. cinereus; abdomine cylindrico nigro: fasciis sex flavis; pedibus flavis. Fab.

Hylæus sex-cinctus. Fab. n.º 6.

Hylæus arbustorum. Panz. fasc. 46. tab. 14.

Habite aux environs de Paris.

Halicte sphécoïde. *Halictus gibbus*.

H. niger; abdomine rufo apice nigro.

Nomada gibba. Fab. *Apis* n.º 17. Geoff.

Sphecodes gibbus. Latr.

Tiphia rufiventris. Panz. fasc. 53. tab. 4.

Habite aux environs de Paris.

Halicte difforme. *Halictus difformis*.

H. niger, fronte cinereo-villosa, tibiis posticis flavis, incurvis lobo clavato terminatis.

Nomia difformis. Latr. Oliv. dict. n.º 3.

Lasius difformis. Panz. fasc. 89. f. 15.

Habite en France, en Allemagne.

Etc.

COLLÈTE. (Colletes.)

Antennes filiformes, un peu courtes. Quatre palpes presque sétacés, les maxillaires plus longs, à six articles. Division intermédiaire de la langue dilatée et presque en cœur au sommet.

Tête aplatie antérieurement. Abdomen ovale-conique; ailes écartées.

Antennæ filiformes, breviusculæ. Palpi quatuor subsetacei: maxillaribus longioribus sexarticulatis.

Linguae seu proboscidis pars intermedia apice dilatata subcordiformis.

Caput antice planum; abdomen ovato-conicum; alæ divaricatæ.

OBSERVATIONS.

Les collètes, qui réunissent celles de M. Latreille et ses hylées, se distinguent des andrènes et des halictes en ce que la division intermédiaire de leur langue n'est point lancéolée, mais parce qu'elle est membraneuse, élargie et presque en cœur à son sommet. Les deux mandibules sont striées sur le dos, soit unidentées sous leur sommet, soit terminées par deux dents égales.

Comme les collètes de M. Latreille sont velues, les pattes postérieures des femelles sont propres à se charger de pollen; ses hylées, au contraire, étant glabres, n'ont point de pattes pollinifères: celles-ci paraissent parasites.

ESPÈCES.

1. Collète ceinturée. - *Colletes succincta*.

C. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro: cingulis quatuor albis.

Apis succincta. Lin.

Andrena succincta. Fab. *Melitta succincta*. Kirby.

Habite en Europe. Elle fait son nid dans la terre, le tapisse de membranes gommeuses et soyeuses.

Collète fouisseuse. *Colletes fodiens*. Latr.

C. nigra, cinereo-hirsuta; abdomine cylindrico nudo: segmentis niveo-marginatis.

Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 14. f. 7.

Panz. fasc. 105. tab. 21—22.

Habite en Europe, sur les fleurs.

Collète annelée. *Colletes annulata*.

C. nigra, fronte annulisque pedum albis.

Hylæus annulatus. Fab. Latr.

Apis annulata. Lin.

Habite en Europe, sur les fleurs.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES RAPACES. [Prædones. Latr.]

rves carnassières ou omnivores. —Premier article des tarses postérieurs subcylindrique, non dilaté ni velu, et jamais pollinifère.

Parmi les hyménoptères à aiguillon et qui n'ont point viducte en tarière, les *rapaces* constituent une grande famille d'insectes qui tous vivent de proie ou de rapine, sont à-peu-près omnivores. Comme aucun de ces insectes ne ramasse le pollen des fleurs, ils n'ont pas le premier article des tarses postérieurs dilaté et muni d'une soie, ni le dessous de l'abdomen soyeux; ce que l'on trouve dans le plus grand nombre des anthophiles.

On a partagé les *rapaces* en beaucoup de petites familles qui, sans doute, ne sont pas sans intérêt, mais qui compliquent considérablement la méthode. Il nous suffira, pour distinguer en général et pouvoir étudier ces hyménoptères, de les diviser en trois coupes principales; savoir :

1.° En *rapaces guépières* ;

Leurs ailes supérieures sont plissées ou pliées en deux longitudinalement.

2.° En *rapaces subaptères* ;

Leurs ailes supérieures ne sont point plissées longitudinalement, et l'espèce offre constamment des individus aptères.

3.° En *rapaces terrifères*.

Leurs ailes supérieures ne sont point plissées longitudinalement, et tous les individus de l'espèce sont ailés.

RAPACES GUÉPIAIRES.

Leurs ailes supérieures sont plissées ou pliées en deux longitudinalement.

Les insectes de cette division sont ainsi nommés parce qu'ils comprennent parmi eux les guêpes et les genres qui les avoisinent par leurs rapports. Ils ont, en général, des antennes brisées, de huit à treize articles, terminées un peu en massue. Le premier segment de leur corselet forme presque toujours un arc prolongé en dessus, jusqu'à la

naissance des ailes supérieures. On divise ces *guépières* de la manière suivante.

§. *Guépières solitaires.*

Mandibules beaucoup plus longues que larges, étroites ou rétrécies en pointe vers leur sommet.

Insectes vivant solitairement : deux sortes d'individus pour l'espèce.

(1) Antennes de huit ou dix articles, terminées en bouton.

Masaris.

(2) Antennes de douze ou treize articles, en massue allongée.

(a) Lèvre inférieure sans points glanduleux à son extrémité.

Synagre.

(b) Lèvre inférieure ayant quatre points glanduleux à son extrémité.

Eumène.

Odynère.

Zèthe.

§§. *Guépières sociales.*

Mandibules guères plus longues que larges, en carré long, obliquement tronquées au bout.

Insectes vivant en société : trois sortes d'individus pour l'espèce.

Guêpe.

Poliste.

GUÉPIÈRES SOLITAIRES.

Linné et la plupart des auteurs ont confondu dans le même genre ces *guépières* avec les *guépières sociales*.

Outre qu'elles s'en distinguent par la forme de leurs mandibules, elles ont des habitudes différentes, vivent solitairement, et n'offrent pour chaque espèce que deux sortes d'individus, des mâles et des femelles.

Les guépiaires solitaires vivent de proie comme les autres. Elles font leur nid, soit dans les trous des murailles, soit dans la terre, soit sur les tiges des plantes, les construisant en boule avec de la terre fine. L'intérieur de ces nids ne présente point des gâteaux alvéolaires comme les nids des guépiaires sociales. Voici les cinq genres que je rapporte à cette division.

MASARIS. (Masaris.)

Antennes de huit ou dix articles, terminées en massue obtuse ou subglobulense. Lèvre supérieure saillante. Mandibules se rétrécissant insensiblement en pointe, subquadridentées.

Corps oblong, semi-cylindrique, glabre, se contractant en boule par la flexion de l'abdomen.

Antennæ octo vel decim-articulatæ, clavæ obtusæ vel subglobosæ terminatæ. Labrum exsertum. Mandibulæ sensim angustato-acuminatæ, subquadridentatæ.

Corpus oblongum, semi-cylindricum, glabrum, abdominis inflexu in globum contractile.

OBSERVATIONS.

Les *masaris* sont des guépiaires solitaires dont les antennes n'ont pas plus de dix articles distincts, et sont terminées en bouton. M. Latreille en forme, sous le nom de

masarides, une petite famille qui se compose de ses genres *masaris* et *celonite*. La lèvre inférieure de ces insectes est longue, filiforme, sans points glanduleux, et se divise en deux filets reçus dans un tuyau rétractile.

ESPECES.

1. *Masaris vespiforme*. *Masaris vespiformis*.

*M. abdomine longo, graciliusculo nigro : fasciis sex flavis ;
antennis nigris capite thoraceque longioribus.*

Masaris vespiformis. Fab. Latr.

Coqueb. illustr. ic. dec. 2. tab. 15.

Habite en Barbarie. Desfontaines.

2. *Masaris apiforme*. *Masaris apiformis*.

*M. abdomine vix trunco longiore , nigro : fasciis quinque
flavis ; antennis brevibus claud ferrugined terminatis.*

Masaris apiformis. Fab. p. 284.

Celonites apiformis. Fab. Latr.

Panz fasc. 76. t. 19.

Habite l'Italie, les provinces méridionales de la France.

SYNAGRE. (Synagris.)

Antennes brisées, renflées vers leur extrémité. Mandibules saillantes, pointues : celles des mâles très-longues et en forme de cornes. Lèvre inférieure quadrifide : à divisions linéaires, longues, plumeuses.

Abdomen ovale-conique ; à pédicule presque nul.

Antennæ fractæ , versùs apicem incrassatæ. Mandibulæ acuto-productæ, in masculis longissimæ, corniformes. Labium inferius quadrifidum : laciniis linearibus longis plumosis.

Abdomen ovato-conicum ; pediculo subnullo.

OBSERVATIONS.

Les synagres sont des insectes étrangers, propres à l'Afrique et à l'Asie. Ils sont remarquables par la grandeur des mandibules des individus mâles, et par leur lèvre inférieure, dont les divisions longues et plumeuses sont dépourvues de points glanduleux. Les palpes maxillaires ont quatre articles; les labiaux n'en ont que trois.

ESPÈCE.

1. Synagre cornu. *Synagris cornuta*. Latr.

Vespa cornuta. Lin. Fab. p. 255.

Apis cornuta. Drury. ins. 2. t. 48. f. 3.

Habite en Afrique.

EUMÈNE. (Eumenes.)

Antennes brisées, en massue allongée et pointue. Le chaperon souvent prolongé en pointe antérieurement. Mandibules longues, pointues, saillantes et rapprochées en bec, surtout dans les mâles. Lèvre inférieure trifide, à division moyenne bilobée : toutes ces divisions glandulifères.

Corps allongé. Abdomen subpédiculé.

Antennæ fractæ, in clavam elongato-acutam terminatæ. Clypeus sæpè antice productus, acutus. Mandibulæ elongato-acutæ, porrectæ, in rostrum conniventes, præsertim in masculis. Labium trifidum : laciniis intermediis dilatato-bilobis; laciniis omnibus glanduliferis.

Corpus elongatum. Abdomen subpedunculatum.



OBSERVATIONS.

Les *eumènes* sont, comme les *synagres*, des guépiaires itaires; mais, au lieu d'avoir les quatre divisions de leur re inférieure longues et plumeuses, comme ces derniers, s les ont glanduleuses à leur sommet. La plupart ont abdomen pédiculé, plus épais vers le bout qu'à sa naissance. n'en distingue point les *odynères* de M. Latreille.

ESPECES.

Eumène des bruyères. *Eumenes coarctata*. Latr.

E. nigra; abdominis segmento primo infundibuliformi, secundo campanulato maximo, luteo maculato.

Vespa coarctata. Lin. Fab. p. 276.

Geoff. 2. p. 377. n.º 10. pl. 16. f. 2.

Vespa coronata. Panz. fasc. 64, t. 12. et fasc. 63. t. 6.

Habite en Europe. La femelle se construit, avec de la terre, un nid en forme de boule, et le fixe sur la tige de quelque plante et souvent sur la bruyère.

Eumène pomiforme. *Eumenes pomiformis*. Latr.

E. nigra, flavo variegata; abdominis petiolo bipunctato; secundo segmento fasciâ interruptâ, omnibusque marginibus flavis.

Vespa pomiformis. Fab. p. 279.

Panz. fasc. 63. t. 7.

Habite l'Italie, l'Allemagne, etc.

Eumène des murs. *Eumenes muraria*.

E. nigra; thorace maculis duabus ferrugineis; abdomine fasciis quatuor flavis: primâ remotissimâ.

Vespa muraria. Lin. Fab. p. 267.

Vespa parietina. Panz. fasc. 49. t. 24.

Odynerus. Latr.

Habite en Europe. Elle fait son nid dans les trous des murailles.

Etc.

ZÈTHE. (Zethus.)

Antennes brisées, en massue allongée et pointue.
Chaperon aussi large ou plus large que long, sans prolongement antérieur remarquable. Mandibules obtuses, peu allongées et point en bec à leur extrémité. Lèvre inférieure glanduleuse au sommet.

Abdomen pédiculé.

Antennæ fractæ, in clavam elongato-acutam terminatæ. Clypeus longitudine non latitudinem superans. Mandibulæ obtusæ, parum elongatæ. Labium apice quadriglandulosum.

Abdomen pediculatum.

OBSERVATIONS.

Les *zêthes*, dont je ne distingue pas les discalies. M. Latreille, ont le port des eumènes; mais elles en diffèrent par leur chaperon et leurs mandibules. Celles-ci, quoiqu'plus longues que larges, sont plus courtes, non pointues en bec. Ces guépiaires sont assez grandes.

E S P E C E S.

1. Zêthe ailes-bleues. *Zethus cyanipennis*.

Z. niger; abdominis petiolo clavato, basi testaceo; a cyanis.

Vespa cyanipennis. Fab. p. 277.

Coqueb. illustr. ic. dec. 1. tab. 6. f. 4.

Habite à Cayenne.

2. Zêthe zonale. *Zethus zonalis*.

Z. niger; thorace immaculato, abdominis petiolo apud segmento secundo fasciâ simplici flavis.

Vespa zonalis. Panz. fasc. 81. tab. 18.

Habite en Allemagne.

3. Zèthe rufinode. *Zethus rufinodus*.

Z. niger, nitidus, punctatus; thoracis segmento antico ferrugineo-flavo; pedibus rubris.

Eumenes rufinoda. Latr. Gen. crust. et ins. vol. 1. t. 14. f. 4.

Habite les îles de l'Amérique.

GUÉPIAIRES SOCIALES.

De même qu'il y a des apiaires sociales et d'autres qui vivent solitairement; de même aussi l'on trouve des guépiaires sociales; et je viens d'en citer d'autres qui ne forment point de société. Il est donc utile de les distinguer de part et d'autre.

Les guépiaires sociales non-seulement sont remarquables parce qu'elles vivent en société, mais, en outre, en ce que chaque espèce se compose de trois sortes d'individus : de mâles, de femelles et de neutres. Ces derniers néanmoins ne paraissent être encore que des femelles sans sexe, c'est-à-dire, dont le sexe est avorté. Ces trois sortes d'individus forment des sociétés quelquefois nombreuses, selon l'espèce. Ils se construisent des nids singuliers, en partie fermés, de matières diverses, et dont l'enveloppe externe semble, soit papyracée, soit cartonneuse. On a donné à ces nids le nom de guépriers. Dans leur intérieur, on trouve au moins un plan couvert d'alvéoles; et, dans certains, cet intérieur est divisé par des cloisons transverses dont chacune est chargée d'alvéoles d'un seul côté. Ces guépiaires sociales ne sont partagées qu'en deux genres, qui sont les suivants :

GUÊPE. (Vespa.)

Antennes brisées, de douze ou treize articles, renflées vers leur sommet en massue oblongue et pointue. Quatre palpes. Mandibules fortes, tronquées obliquement dentées à leur extrémité. Bord antérieur du chaper largement tronqué, ayant une dent de chaque côté.

Corps oblong, presque glabre, ayant l'abdomen taché par un pédicule très-court. Ailes supérieures pliées ou plissées en deux, étroites.

Trois sortes d'individus, tous ailés, vivant en société dans un nid commun. Larves apodes.

Antennæ fractæ, duodecim aut tredécim articulatæ, clavæ oblongæ acutæque terminatæ. Palpi quatuor. Mandibulæ validæ, apice obliquè truncatæ dentatæ. Clypeus marginè antico latè truncato, utrinque latere denticulo adjuncto.

Corpus oblongum, subglabrum, abdomine brevis pediculato. Alæ superæ angustæ, longitrorsum duplicatæ.

Individua omnia alata, nido communi habitantibus generibus pro specie. Larvæ apodæ.

OBSERVATIONS.

Quoique les guêpes aient les antennes brisées ou tronquées comme les abeilles, on les en distingue au premier aspect par leurs ailes étroites et plissées ou pliées en deux longitudinalement ; par leur corps plus grêle en gé-

moins velu, et même presque glabre; enfin, par leur trompe très-courte, et leurs mandibules fortes et grandes.

Leur corps est ordinairement varié de jaune et de noir. Leurs yeux sont en forme de reins; et leur trompe ou langue est large, échancrée avec un filet de chaque côté. Leur larve est petite, veriniforme et sans pattes.

Les guêpes formant des sociétés composées de trois sortes d'individus, les femelles et les neutres seulement travaillent à la construction de leur nid. En réduisant en forme de pâte, des parcelles de vieux bois ou d'écorce, elles en construisent leur guépier, savoir ses rayons ou gâteaux et l'enveloppe commune, d'une matière analogue à du papier ou du carton. Le guépier est suspendu en dessus par un ou plusieurs pédicules, et les rayons qu'il contient, tantôt en petit nombre et tantôt fort nombreux, sont horizontaux, et ont leur face inférieure seulement garnie de cellules verticales hexagones. Les femelles ne pondent qu'un œuf dans chaque cellule, y joignent une provision de nourriture pour la jeune larve, et ensuite ferment la cellule.

Les sociétés des guêpes ne subsistent que jusques vers le milieu de l'automne. Alors les neutres tuent les larves qui n'ont pas eu le temps de se transformer; les autres périssent pour la plupart, et quelques femelles qui survivent à la mauvaise saison, travaillent au printemps à fonder une nouvelle colonie.

Les guêpes ne sont guère connues en général, que par les ravages qu'elles font dans nos jardins, en dévorant nos meilleurs fruits. Elles se nourrissent aussi d'insectes et même de viandes. Elles font leur nid dans la terre, dans l'intérieur des vieux bois, et souvent dans les greniers des maisons. Leur approche est toujours à redouter.

ESPÈCES.

1. Guêpe frêlon. *Vespa crabro*.

V. thorace nigro, antice rufo immaculato; abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo. L.

Vespa crabro. Lin. Fab. p. 255. Oliv. dict. n.º 47.

Geoff. 2. p. 368 n.º 1.

Habite en Europe. Grosse guêpe qui fait son nid dans les creux des vieux arbres, et quelquefois dans les charpentes des greniers.

2. Guêpe commune. *Vespa vulgaris*.

V. thorace utrinque lineola interrupta; scutello quadrimaculato; abdominis incisuris punctis nigris distinctis. L.

Vespa vulgaris. Lin. Fab. p. 256. Oliv. dict. n.º 49.

Geoff. 2. p. 369 n.º 2.

Habite en Europe. Elle est fort commune, moins grosse que la précédente, plus brillante par ses deux couleurs, le noir et le jaune, et fait son nid dans les toits. Une de ses variétés fait le sien dans la terre.

3. Guêpe de Holstein. *Vespa Holsatica*.

V. nigra; lineola utrinque ad humeros, maculisque scutellaribus luteis; abdomine luteo, segmentis basi transversè punctisque contiguis nigris. L.

Vespa holsatica. Fab. p. 257.

Latr. annales du mus. vol. 1. p. 288. pl. 21. f. 1—3.

Vespa. n.º 2. var. D. Geoff.

Habite en Europe. Se trouve aux environs de Paris. Elle fait un guêpier oviforme, à enveloppe triple, dont les pièces sont minces et inégales.

4. Guêpe fauve. *Vespa rufa*.

V. thorace utrinque lineola; scutello bipunctato; abdomine flavo, antice ferrugineo. L.

Vespa rufa. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 51.

Habite le nord de l'Europe.

5. Guêpe à une bande. *Vespa cincta*.

V. nigra; thorace obscure maculato; abdomine atro : fasciâ ferrugineâ.

Vespa cincta. Fab. p. 253. Oliv. dict. n.º 37.

Habite aux Indes orientales.

Etc.

POLISTE. (Polistes.)

Antennes brisées, en massue allongée, finissant en pointe. Mandibules non tronquées, dentées en leur côté interne. Milieu du bord antérieur du chaperon avancé en pointe.

Corps subovale; abdomen pédiculé.

Antennæ fractæ, in clavam elongatam et acutam terminatæ. Mandibulæ non truncatæ, latere interno et subapicali dentatæ. Clypei margo anticus medio in angulum parvum productus.

Corpus subovale, abdomine pediculato.

OBSERVATIONS.

Les *polistes* sont des guépiaires sociales tellement voisines du genre *guêpe* par leurs rapports, qu'on aurait pu ne les en pas distinguer. Cependant, comme ces guépiaires diffèrent des guêpes proprement dites, par la forme de leurs mandibules et par celle du chaperon, nous avons adopté le genre qu'en a formé M. Latreille.

Ces guépiaires ont aussi l'espèce composée de trois sortes d'individus tous ailés, savoir des mâles, des femelles et des neutres. Leurs ailes sont plissées ou pliées en deux longitudinalement; et comme elles, vivent en société; leur nid contient un ou plusieurs gâteaux alvéolifères. Parmi leurs espèces, les unes sont indigènes; les autres sont exotiques.

ESPÈCES.

[Indigènes.]

1. Poliste française. *Polistes gallica*. Latr.

P. thorace utrinque lineola punctisque duobus; scutello sex-maculato; abdominis incisuris flavis, secundâ bimaculata.

- (2) Insectes vivant solitairement : des mâles et des femelles seulement. Les mâles ailés ; les femelles toujours aptères.

Mutile.

FOURMI. (Formica.)

Antennes filiformes , plus épaisses vers leur sommet , brisées. Lèvre supérieure un peu grande , tombant perpendiculairement. Quatre palpes filiformes , inégaux. Mandibules fortes , surtout dans les femelles et les neutres. Promuscide courte : à lèvre inférieure concave , arrondie au sommet.

Tête trigone ; tronc déprimé sur les côtés ; abdomen attaché au corselet par un pédicule qui porte , soit un nœud en forme d'écaille , soit deux nœuds. Anus muni , soit d'un aiguillon piquant , soit de glandes vénéni-fères.

Trois sortes d'individus pour l'espèce. Des mâles et des femelles ailés ; des neutres toujours aptères.

Antennæ filiformes , versùs apicem crassiores , fractæ. Labrum majusculum , ad perpendiculum cadens. Palpi quatuor filiformes , inæquales. Mandibulæ validæ , præsertim in feminis et neutris. Promuscis brevis : labio cucullato , apice rotundato.

Caput trigonum ; truncus ad latera compressus ; abdomen pediculo uninodo vel binodo thoraci affixum. Anus vel aculeo punctorio , vel glandulis venéniferis instructus.

Individua tribus generibus pro specie. Masculi et feminae alati ; neutra semper aptera.

OBSERVATIONS.

Les *fourmis* sont des insectes connus de tout le monde, et moins quant à leur forme générale. Ces insectes sont petits en général, courent assez rapidement, et offrent un corps allongé, comme formé de trois parties principales, en séparées : la tête, le corselet, l'abdomen. Leur tête, qui est assez grosse proportionnellement, est trigone, avancée en pointe antérieurement, et munie de deux antennes filiformes, brisées, leur premier article étant plus long que chacun des autres.

Ce qui caractérise le plus généralement ces insectes, est que le pédicule qui attache leur abdomen au corselet, soutient tantôt une petite écaille relevée, et tantôt deux écailles distinctes selon les espèces. Ces espèces de fourmis squamiformes sont dues, selon M. Latreille, à un certain nombre d'anneaux de l'abdomen, et se trouvent dans tous les individus de toutes les espèces.

Les neutres ici sont, comme dans les abeilles et les guêpes, des femelles dont le sexe est entièrement avorté. Ce sont les individus les plus nombreux de leur société, ceux qui sont chargés de tous les travaux, et qui n'ont jamais d'ailes. Les mâles sont les plus petits individus de l'espèce, et sont toujours ailés. Les femelles sont pareillement ailées, mais elles perdent souvent leurs ailes à une certaine époque.

On sait que les fourmis demeurent dans des nids placés dans la terre ou près de sa surface, et auxquels on a donné le nom de *fourmilières*. Il y en a néanmoins qui font les leurs dans l'intérieur des troncs d'arbres ou des bois, comme certains termites. Le jour, elles en sortent, vont et viennent continuellement, s'occupent de leurs travaux ou courent à la picorée. Comme elles sont omnivores, presque tout leur est bon, et dès qu'elles ont trouvé quelque butin, elles le portent à la fourmilière.

Formica rufa. Lin. Fab. p. 351. Oliv. dict. n.º 9.

Latr. hist. nat. des f. p. 143 pl. 5. f. 28.

Habite en Europe, dans les bois. Elle y forme sur la terre de grandes fourmilières larges, convexes, offrant des amas considérables de paillettes de différens débris amoncelés et sans ordre. Elle est plus grande que nos fourmis de jardins.

5. Fourmi noire-cendrée. *Formica fusca*.

F. cinereo-fusca ; *antennis pedibusque ferrugineis*.

Formica fusca. Lin. Fab. p. 352. Oliv. dict. n.º 13.

Latr. hist. nat. des f. p. 159. pl. 6. f. 32.

Habite en Europe, dans la terre, sous les pierres, au pied des arbres. Commune.

6. Fourmi des jardins. *Formica nigra*.

F. nigra, *nitida* ; *ano piceo*. F.

Formica nigra. Lin. Fab. p. 352. Oliv. dict. n.º 11.

Latr. hist. nat. des fourmis, p. 156.

Habite en Europe. Très-commune dans les jardins où elle fait beaucoup de tort. Elle fait son habitation dans la terre.

7. Fourmi sanguine. *Formica sanguinea*. Latr.

F. sanguinea ; *abdomine cinereo-nigro*. Latr. hist. nat. des fourmis, p. 150. pl. 5. f. 29.

Habite en Europe, dans les bois. C'est une de celles que M. Hubert nomme *fourmis amazones*.

8. Fourmi amazone. *Formica rufescens*.

F. pallidè rufa ; *mandibulis angustis arcuatis subdentatis* ; *stemmaibus tribus* ; *thorace posticè elevato*. Latreille.

Formica rufescens. Latr. hist. nat. des fourm. p. 186. pl. 7. f. 38.

Polyergus rufescens. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 127. et vol. 1. t. 13. f. 1.

Habite en France, dans les bois. C'est encore une espèce guerrière dont M. Hubert a décrit les habitudes si étonnantes.

9. Fourmi resserrée. *Formica contracta*.

F. elongata, *subcylindrica*, *fusco-brunnea* ; *oculis nullis*.



SANS VERTÈBRES.

97.

aut obsoletis; antennis pedibusque lutescente-brunneis.

Latr. hist. nat. des fourm. p. 195. pl. 7. f. 40.

Ponera. Latr.

Habite en France, à Paris. Rare. Société peu nombreuse. Elle paraît aveugle.

ux écailles ou deux nœuds sur le pédicule de l'abdomen.

Fourmi céphalote. *Formica cephalotes*.

F. thorace quadrispinoso; capite didymo magno utrinque posticè mucronato.

Formica cephalotes. Lin. Fab. p. 362. Oliv. dict. n.º 47.

Latr. hist. nat. des fourm. p. 222. pl. 9. f. 57.

Atta. Latr. gén. crus. et ins. 4. p. 129.

Habite l'Amérique méridionale. Espèce fort grande, voyageant souvent par quantité innombrable.

Fourmi à crochets. *Formica hamata*.

F. ferruginea; capite maximo pallido; mandibulis porrectis hamatis.

Formica hamata. Fab. p. 364.

Latr. hist. nat. des fourm. p. 242. pl. 8. f. 54.

Atta. Latr.

Habite à Cayenne.

1. Fourmi goulue. *Formica gulosa*.

F. castaneo-brunnea; mandibulis capite longioribus; abdominis apice nigro. Latr. hist. nat. des fourm. p. 215. pl. 8. f. 49.

Formica gulosa. Fab. p. 363. Oliv. dict. n.º 50.

Myrmecia gulosa. Latr.

Habite la Nouvelle-Hollande.

3. Fourmi souterraine. *Formica subterranea*.

F. ferrugineo-brunnea; ore antennisque dilutioribus; thorace elongato, bispinoso; abdomine fusco; pedibus dilutè fulvis.

Latr. hist. nat. des fourm. p. 219. pl. 10. f. 64. et pl. 11. f. 70.

Myrmecia. Latr.

Habite en France, au pied des arbres.

Tome IV.

7.

14. Fourmi rouge. *Formica rubra*.

F. rubescens, *rugosula*; *nodo primo infra unispinoso*; *abdome nitido lævi*, *segmento antico subbrunneo*. Lat.

Formica rubra. Lin. Fab. p. 353. Oliv. dict. n.º 14.

Latr. hist. nat. des fourm. p. 246. pl. 10. f. 62.

Myrmecia. Latr.

Habite en Europe. Espèce très-commune. Elle fait son nid dans la terre, soit sous des pierres, soit sous de la mousse, dans les bois.

15. Fourmi des gazons. *Formica cœspitum*.

F. brunneo-nigra; *antennis mandibulisque brunneo-rubris*; *capite thoraceque striatis*; *thorace posticè bispinoso*; *tarsis dilutioribus*. Latr.

Formica cœspitum. Lin. Fab. p. 358. Oliv. n.º 30.

Lat. hist. nat. des fourm. p. 251. pl. 10. f. 63.

Myrmecia. Latr.

Habite en Europe. Espèce très-commune; elle fait son nid dans la terre, entre les racines des gazons.

Etc.

MUTILLE. (Mutilla.)

Antennes filiformes, vibratiles, à premier et troisième articles allongés. Mandibules fortes, saillantes, pointues, quelquefois dentées. Quatre palpes; les maxillaires plus longs.

Insectes solitaires, à deux sortes d'individus pour l'espèce. Des mâles ailés; des femelles aptères. Les femelles manquant de petits yeux lisses, et ayant un aiguillon très-piquant à l'anus.

Corps oblong, velu.

Antennæ filiformes, vibratiles; *articulo primo tertioque elongato*. *Mandibulæ validæ, exsertæ, acu-*

interdum dentatæ. Palpi quatuor ; maxillaribus ioribus.

*insecta solitaria: ordinibus duobus pro specie. Mas-
alati ; femine apteræ : ant aculeo punctorio va-
simo. Ocelli in feminis nulli distincti.
corpus oblongum, hirsutum.*

OBSERVATIONS.

es mutilles tiennent aux fourmis par plusieurs rap-
s ; mais ces rapaces ne forment point de société , n'of-
t que des mâles et des femelles , et la petite portion
leur corps qui attache l'abdomen au corselet n'est ni
ifère , ni squamifère. Ces insectes ont des antennes fili-
nes, quelquefois brisées, vibratiles, de douze ou treize
cles, plus courtes dans les femelles que dans les mâles.
urs mâchoires et leur lèvre inférieure sont très-petites.
font leur nid dans la terre, aux lieux secs et sablon-
ix. Ainsi, par leurs habitudes, ils s'approchent des ra-
es terribles.

M. Latreille divise ces insectes en plusieurs genres, et
forme une famille particulière. Nous allons en citer quel-
es espèces.

ESPÈCES.

Mutille européenne. *Mutilla europæa.*

*M. nigra; thorace rufo; abdomine fasciis duabus albis: pos-
teriore duplicata, interrupta. F.*

Mutilla europæa. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 15. Latr.

Coqueb. ill. ic. dec. 2. tab. 16. f. 8.

Panz. fasc. 76. tab. 20.

Habite le midi de la France, l'Italie, le Levant. Comparez-la
avec la mutille littorale d'Olivier, n.º 16.

1. Mutille maure. *Mutilla maura.*

*M. hirsuta, nigra; thorace rufo; abdomine maculis qua-
tuor albis.*

Mutilla maura: Lin. Fab. Latr. Oliv. n.º 36.

Panz. fasc. 46. tab. 18.

Coqueb. ill. ic. dec. 2. tab. 16. f. 7.

Habite en France, en Allemagne, etc.

3. Mutille rufipède. *Mutilla rufipes*.

M. hirta, *nigra*; *antennis thoraceque rufis*; *abdomine puncto fasciisque duabus approximatis albis*. F.

Mutilla rufipes. Fab. Latr. Oliv. n.º 68.

Panz. fasc. 46. tab. 19.

Habite en Allemagne, en France : commune aux environs de Paris.

4. Mutille couronnée. *Mutilla coronata*.

M. nigra; *thorace rufo*; *abdomine puncto strigisque duabus albis*.

Mutilla coronata. Fab. Lat. Oliv. n.º 29.

Panz. fasc. 55. tab. 24.

Habite le midi de la France, l'Italie, etc.

5. Mutille tête-noire. *Mutilla melanocephala*.

M. hirta, *rufa*; *capite abdominisque apice nigris*. F.

Mutilla melanocephala. Fab. p. 372. Oliv. n.º 65.

Coqueb. ill. ic. dec. 1. tab. 6. f. 11.

Myrmosa melanocephala. Lat. gen. crust. et ins. 4. p. 120 et vol. 1. tab. 13. f. 6 et 8.

Panz. fasc. 85. t. 14.

Habite en France.

6. Mutille formicaire. *Mutilla formicaria*.

M. gracilis, *rubra*; *abdomine nigro*.

Methoca formicaria. Latr. crust. et ins. 4. p. 119, et vol. 2. tab. 13. fig. 7. Confer. cum *methoca ichneumonides ejusd.*

Habite au midi de la France.

7. Mutille myrmécode. *Mutilla myrmecodes*.

M. nigra, *flavo-variegata*; *thorace compresso*.

Tiphia pedestris. Fab. p. 228.

Myrmecodes. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 118.

Habite la Nouvelle-Hollande.

8. Mutille doryle. *Mutilla dorylus*.

M. helvola; abdomine cylindrico, apice pubescente; femoribus compressis.

Mutilla helvola. Lin.

Dorylus helvolus. Latr. hist. des crust. et des ins. 13. p. 260.

Fab. p. 365. Coqueb. ill. ic. dec. 2. t. 16. f. 1.

Habite en Afrique.

Etc.

RAPACES TERRIFORES.

Leurs ailes supérieures ne sont point plissées longitudinalement, et tous les individus de l'espèce sont ailés.

Sous cette troisième division des *rapaces*, je rassemble des hyménoptères à aiguillon qui vivent de proie comme les autres *rapaces*, n'offrent point d'individus aptères, et n'ont point les ailes supérieures plissées longitudinalement. Par leur aspect, les uns tiennent aux guêpes, et les autres aux ichneumonides.

Ces insectes vivent solitairement, et la plupart ont des habitudes très-analogues; car ils font leur nid dans la terre, y placent un œuf, et déposent près de cet œuf quelqu'autre insecte dont ils se sont saisis, et qu'ils ont tué, afin qu'il serve de nourriture à leur petit. Ce sont les mêmes que j'avais nommés d'abord *rapaces hétéromalles*.

Quoique les *rapaces terrifores* tiennent de très-près les uns aux autres par leurs rapports, comme ils sont fort nombreux et diversifiés, il est peu facile de les diviser

ou coupes bien tranchées. M. Latreille les a partagés en huit familles et quarante-deux genres.

Relativement à l'objet de cet ouvrage, dont le but est de simplifier la méthode, afin de faciliter l'étude des animaux qui en font le sujet, je crois qu'il suffit de diviser ces insectes en neuf genres principaux, sauf à y en ajouter quelques autres s'ils sont reconnus indispensables. En voici l'analyse dans le tableau suivant, d'après des caractères empruntés des ouvrages de M. Latreille.

DIVISION DES RAPACES TERRIFORES.

- (1) Premier segment du corselet large et prolongé en dessus jusqu'à l'origine des ailes supérieures.

(a) Pattes courtes ou moyennes.

(+) Antennes des femelles plus courtes que la tête et le tronc.

Tiphie.

Scolie.

(+-) Antennes des deux sexes aussi longues au moins que la tête et le tronc.

Sapyge.

Thynne.

(b) Pattes longues; les postérieures une fois aussi longues que la tête et le tronc réunis.

Pompile.

- (2) Premier segment du corselet étroit, transversal, et distant en dessus de l'origine des ailes supérieures.

(a) Pattes longues: les postérieures une fois au moins aussi longues que la tête et le tronc réunis.

Sphex.

(b) Pattes courtes ou moyennes.

(→) Labre entièrement à découvert, souvent très-grand.

Bembèce.

(↔) Labre entièrement caché ou peu découvert.

* les yeux prolongés jusqu'au bord postérieur de la tête.

Larve.

** Les yeux ne s'étendant pas jusqu'au bord postérieur de la tête.

☞ Antennes insérées près de la bouche.

Crabron.

☞☞ Antennes insérées au milieu de la face ou loin de la bouche.

Philanthe.

TIPHIE. (Tiphia.)

Antennes filiformes, de treize ou quatorze articles, rapprochées à leur insertion, plus courtes que la tête et le tronc dans les femelles. Mandibules fortes, entières, ou dentées. Quatre palpes : les maxillaires allongés.

Tronc convexe en dessus, un peu plus long que large. Abdomen ovale ou oblong, attaché par un pédicule court. Anus des femelles muni d'un aiguillon caché. Pattes un peu courtes, à jambes ciliées ou dentelées.

Antennæ filiformes, tredecim vel quatuordecim articulatæ, ad insertionem approximatæ, capite truncoque breviores in feminis. Mandibulæ validæ, edentulæ. Palpi quatuor : maxillaribus elongatis.

Truncus supernè convexus, paulò longior quàm

latur. Abdomen ovale vel ovato-oblongum, breviter pediculatum. Anus feminarum aculeo tecto instructus. Pedes breviusculi ; tibiis ciliatis vel denticulatis.

OBSERVATIONS.

Les *tiphies* ne sont pas sans rapports avec les mutilles , mais les deux sortes d'individus de l'espèce sont ailées. Ce sont des hyménoptères velus qui ressemblent à des guêpes dont ils diffèrent principalement par leurs ailes supérieures non plissées.

Ces insectes ont le corps allongé , velu , l'abdomen en fuseau , la tête obtuse , les yeux ovales et entiers , les pattes courtes , à cuisses grosses , comprimées , et à jambes ciliées ou dentelées.

ESPÈCES.

1. Tiphie grosses-cuisses. *Tiphia femorata*.

T. nigra ; femoribus quatuor posticis angulatis rufis. F.

Tiphia femorata. Fab. p. 223. Latr.

Tiphia hemiptera. Panz. fasc. 77. tab. 14.

Habite en Europe , en France. Elle fait son nid dans la terre.

2. Tiphie morio. *Tiphia morio*.

T. tota nigra ; alis fuscis ; femoribus posticis cinereo-basisatis.

Tiphia morio. Panz. fasc. 55. tab. 1.

An tiphia morio ? Fab. p. 227.

Habite l'Europe méridionale , l'Autriche.

3. Tiphie velue. *Tiphia villosa. Latr.*

T. atra , subvillosa ; antennis pedibusque concoloribus.

Bethylus villosus. Panz. fasc. 98. tab. 16.

Habite en Allemagne.

Etc.

SCOLIE. (Scolia.)

Antennes filiformes , presque droites, un peu écartées à leur insertion , plus longues dans les mâles que dans les femelles. Mandibules fortes , saillantes , arquées. Quatre palpes : les maxillaires plus courts que les mâchoires. Les yeux échancrés.

Corps oblong. Le premier segment du corselet tronqué postérieurement. Abdomen allongé , subcylindrique. Pattes un peu courtes : les jambes des postérieures ciliées , presque épineuses. Anus des femelles très-piquant.

Antennæ filiformes , rectiusculæ , ad insertionem subdistantes. In masculis paulò longiores quàm in feminis. Mandibulæ validæ , exsertæ , arcuatæ. Palpi quatuor : maxillaribus maxillis brevioribus. Oculi emarginati.

Corpus oblongum. Metathorax posticè truncatus. Abdomen elongatum , subcylindricum (præsertim in masculis). Pedes breviusculi : tibiis posticorum ciliato-spinosis. Anus feminarum aculeo abscondito validoque instructus.

OBSERVATIONS.

Les *scolies* constituent un beau genre d'hyménoptères rapaces , la plupart d'une assez grande taille. Ces insectes ont le corps allongé, peu ou point velu, noir avec des taches jaunes ou rousses. Ils ressemblent à de grandes tiphies , et paraissent avoir des rapports avec les bembécés. Les antennes

des femelles sont très-courtes , tandis que celles des mâle sont plus longues , mais sans excéder de beaucoup la longueur de la tête et du tronc.

Ces insectes sont nombreux en espèces, la plupart étrangers à l'Europe , et ceux qu'on y rencontre ne se trouvent guères que dans ses parties méridionales. Ils fréquentent les fleurs et les lieux sablonneux. Il est vraisemblable que leurs habitudes sont analogues à celles des autres *terrifera*. Citons-en quelques espèces européennes.

ESPÈCES.

1. Scolie hémorrhoidale. *Scolia hæmorrhoidalis*.

S. atra, *hirta* ; abdomine fasciis duabus flavis , thorace antice anoque ferrugineo-hirtis. F.

Scolia hæmorrhoidalis. Fab. p. 230.

Roem. gen. ins. tab. 27. f. 4.

Habite en Allemagne.*

2. Scolie front-jaune. *Scolia flavifrons*.

S. atra ; abdomine fasciis duabus flavis ; alis ferrugineis apice cyaneis. F.

Scolia hortorum. Fab. pag. 232. Mas.

Scolia flavifrons. Fab. p. 229. Femina.

Roem. gen. ins. tab. 27. f. 3.

Habite le midi de la France, l'Espagne.

3. Scolie insubrienne. *Scolia insubrica*. Latr.

S. nigra , cinereo-hirta ; abdomine atro : fasciis sex flavis anticis tribus interruptis.

Scolia interrupta. Fab. p. 236. Panz. fasc. 62. t. 14.

Sphex canescens. Scop. flora et fauna, insub. 2. t. 22. f. 8.

Habite le midi de la France , l'Italie, la Suisse.

4. Scolie quadripunctuée. *Scolia quadripunctata*.

S. atra ; abdomine punctis quatuor albis ; alis ferrugineis apice fuscis. F.

Scolia quadripunctata. Fab. p. 236. Panz. fasc. 3. t. 22. Ma

Scolia violacea. Panz. fasc. 66. t. 18. *Femina*.

Habite en Italie, en France.

3. Scolie marquée. *Scolia signata*.

S. atra; abdomine fasciis duabus flavis, his utrinque puncto atro; ano tridentato; alis apice fuscis. P.

Scolia signata. Panz. fasc. 62. t. 13.

Ros. faun. étr. tab. 8 fig. D. E.

Habite le midi de l'Europe.

4. Scolie cylindrique. *Scolia cylindrica*.

S. atra; abdominis segmentis margine punctoque laterali margine continuo flavis.

Scolia cylindrica. Fab. p. 238. *Elis cylindrica* ejusd.

Sapyga cylindrica. Panz. fasc. 87. t. 19.

Myrmica. Latr.

Habite en Italie, etc. Corps fort allongé. Mandibules bidentées.

Etc.

SAPYGE. (Sapyga.)

Antennes filiformes, un peu longues, s'épaississant souvent vers leur sommet, non plus courtes que le tronc des femelles. Mandibules fortes, trigones, pluridentées. Les yeux échancrés.

Corps allongé, glabre ou pubescent. Corselet tronqué antérieurement. Pattes courtes : à jambes presque nulles.

Antennæ filiformes, longiusculæ, versus apicem apte incrassatæ, in feminis non truncæ breviores. Mandibulæ validæ, trigonæ, pluridentatæ. Oculi marginati.

Corpus elongatum, glabrum aut pubescens. Thorax apice truncatus. Pedes brevès : tibiis sublævibus.

OBSERVATIONS.

Les *sapyges* tiennent de très-près aux scolies par leurs ports et même par leur aspect. Néanmoins leurs antennes sont un peu plus longues dans les deux sexes ; et, quoiqu'elles des femelles soient moins longues que celles des mâles, elles sont au moins aussi longues que la tête et le thorax réunis. Leurs pattes d'ailleurs n'ont point la jambe épinoïde ni fortement ciliée comme celles des scolies. Ces insectes distinguent des tiphies par leurs palpes maxillaires courts que les mâchoires.

Nos *sapyges* sont ceux de M. Latreille, auxquels je joins ses *polochres*. On les rencontre dans les lieux exposés au soleil, autour des murs et des terres où habitent les araignées. M. Latreille soupçonne que ce sont des parasites, c'est-à-dire, qu'ils sont carnassiers et insectivores.

ESPECES.

1. Sapyge ponctué. *Sapyga punctata*.

S. atra ; abdomine punctis quatuor albis.

Sapyga punctata. Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 272. et gen. crust. et ins. vol. 1. tab. 13. f. 9.

Vespa, n.º 13. Geoff. 2. p. 379.

Panz. fasc. 100. t. 17.

Habite en Europe ; aux environs de Paris.

2. Sapyge prisme. *Sapyga prisma*.

S. atra ; abdomine fasciis tribus : antica posticaque interruptis punctoque anali flavis. F.

Apis clavicornis. Lin.

Sapyga prisma. Latr. hist. nat. des crust. , etc.

Masaris crabroniformis. Panz. fasc. 47. t. 22.

Scolia prisma. Fab. p. 236.

Habite en Europe.

THYNNE. (Thynnus.)

Les filiformes, presque sétacées, plus courtes et plus épaisses dans les femelles que dans les mâles. Les étroites, saillantes, arquées, subunidentées, plus longues dans les femelles. Les yeux des femelles en-

tre plus allongé, presque linéaire dans les mâles. Les antennes courtes, comprimées; à jambes des postérieures subépépineuses.

Antennæ filiformes, subsetaceæ, in feminis brevior-rassiores. Mandibulæ angustæ, exsertæ, ar-subunidentatæ, in feminis validiores. Oculi in masculis integri.

Abdomen elongatum, in masculis sublineare. Pedes compressi; tibiis posticorum ciliato-spinosis.

OBSERVATIONS.

Le genre *thynne* a pour type un insecte recueilli à la Nouvelle-Hollande, et probablement il y en existe plusieurs autres. Par leur forme, les thynnes semblent annoncer le genre des pompiles. M. Latreille les range dans sa famille des sapygites.

ESPECE.

Thynne denté. *Thynnus dentatus*. Fab.

Abdomine atro: segmento secundo tertio quatuorque punctis duobus albis. Fab. p. 244.

Thynnus dentatus. Latr. gen. crust. et ins. 1. t. 13. f. 1—2, et vol. 4. p. 111.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

POMPILE. (Pompilus.)

Antennes menues, presque sétacées, à articles oblongs. Mandibules, soit simples, soit subdentées au côté interne. Quatre palpes : les maxillaires souvent plus longs. Les yeux entiers.

Corps oblong ; abdomen ovoïde, subsessile ; les pattes longues : les postérieures étant une fois aussi longues que la tête et le tronc réunis.

Antennæ graciles, subsetaceæ ; articulis oblongis. Mandibulæ simplices, aut latere interno subdentatæ. Palpi quatuor : maxillaribus sæpè longioribus. Oculi integri.

Corpus oblongum ; abdomen obovatum, subsessile. Pedes longi : posticis capite truncaque conjunctis duplo longioribus.

OBSERVATIONS.

Les *pompiles* se distinguent des insectes des quatre genres précédens, au premier aspect, par la longueur de leur pattes postérieures. Ils sont assez nombreux et constituent une famille dans l'ouvrage de M. Latreille. Leurs habitudes et un peu leur port, les rapprochent des *sphex* ; car il paraît que plusieurs font de même leur nid dans la terre, aux lieux sablonneux exposés au soleil. Leur corselet néanmoins les en distingue, son premier segment étant prolongé en dessus, jusqu'à l'origine des ailes supérieures.



ESPECES.

Pompile annelé. *Pompilus annulatus*. Latr.

P. ater; capite, thoracis antico, abdominisque segmentis, basi flavis; alis ferrugineis, apice atris. Jar.

Pompilus annulatus. Panz. fasc. 76. t. 16.

Sphex annulata. Fab. suppl. p. 245.

Habite le midi de la France, l'Italie.

Pompile quadripunctué. *Pompilus quadripunctatus*.

Latr.

P. ater; antennis, thoracis strigâ antica, scutello, punctis quatuor abdominis, alisque ferrugineis.

Sphex quadripunctata. Fab. p. 219.

Pompilus octopunctatus. Panz. fasc. 76. t. 17.

Habite près de Bordeaux, et en Espagne.

Pompile des chemins. *Pompilus viaticus*.

P. pubescens, niger; alis fuscis; abdomine antice ferrugineo; cingulis nigris. F.

Sphex viatica. Lin.

Pompilus viaticus. Fab. suppl. p. 246.

Panz. fasc. 65. tab. 16.

Habite en Europe. Il fait son nid dans la terre, aux lieux sablonneux; y dépose un œuf et des larves.

Pompile brun. *Pompilus fuscus*. Latr.

P. glaber, ater; abdomine basi ferrugineo. F.

Pompilus fuscus. Fab. suppl. p. 246.

Panz. fasc. 65. tab. 15. *Sphex fusca*. Lin.

Ichneumon, n.º 74. Geoff. 2. p. 354.

Habite en Europe.

Pompile rufipède. *Pompilus rufipes*. Latr.

P. ater; abdominis segmentis utrinque puncto albo; alis apice fuscis. F.

Panz. fasc. 65. tab. 17. Fab. suppl. p. 250.

Sphex rufipes. Lin.

Habite en Europe.

6. Pompile baponctué. *Pompilus bipunctatus*. Latr.

P. glaber, ater; abdomine punctis duobus fasciâque postica albis; alis apice fuscis. F.

Pompilus bipunctatus, Fab. suppl. p. 251.

Panz. fasc. 72. tab. 8.

Habite en Europe.

7. Pompile tacheté. *Pompilus maculatus*.

P. glaber, ater; thorace maculato, abdominis segmentis primo punctis duobus, secundo margine albis,

Evania maculata. Fab. p. 193.

Pompilus frontalis. Panz. fasc. 72. tab. 9.

Ceropales maculata. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 63.

Habite en Europe. Commun en France.

Etc.

SPHEX. (Sphex.)

Antennes filiformes, grêles, rapprochées à leur insertion, souvent arquées ou en spirale. Lèvre supérieure très courte. Mandibules, soit simples, soit dentées au côté interne. Quatre palpes grêles. Promusci plus ou moins allongée, trifide, fléchie dans son milieu ou vers son extrémité.

Tête grosse; corps allongé; abdomen pédiculé; pattes postérieures fort longues. Anus des femelles muni d'aiguillon caché.

Antennæ filiformes, graciles, ad insertionem proximatae, sæpè arcuatae aut in spiram contorta. Labrum brevissimum. Mandibulae vel simplices, latere interno dentatae. Palpi quatuor graciles. Promusci plus minusve elongata, trifida, medio aut versus apicem flexa.

Caput magnum; corpus elongatum; abdomine



*iculato. Pedes postici prælongi. Anus feminarum
culeo abscondito instructus.*

OBSERVATIONS.

Les *sphex* ont l'aspect des ichneumonides , et surtout des
pytutes; à cause du pédicule, souvent assez long, qui joint
l'abdomen au corselet; mais les femelles n'ont point
de véritable tarrière; elles n'ont qu'un aiguillon simple et
caché dans le dernier anneau de leur abdomen.

On a confondu les *sphex* avec les pompiles, les uns et
autres ayant les pattes postérieures fort allongées, et
des habitudes analogues. M. Latreille a montré
que ces deux genres étaient bien distingués par le premier
segment du corselet qui, dans les *sphex*, est transversal,
court, et ne se prolonge pas en dessus jusqu'à l'origine des
pattes supérieures.

Nos *sphex* sont partagés en différens genres par M. La-
treille. Il en forme sa famille des *sphégimes*. Ce sont des
insectes carnassiers, parasites. Ils font leur nid dans la
terre, y déposent un œuf, et placent à côté, soit une che-
ville, soit une araignée qu'ils ont tuée avec leur aiguillon.
La larve, qui ne tarde pas à éclore, se nourrit alors de cette
provision.

Dans les uns, la promuscide, qui se compose de la lèvre
inférieure et des mâchoires, est allongée en trompe, et sa
longueur surpasse de beaucoup celle de la tête; dans d'au-
tres, elle est à peine plus longue que la tête. Les *sphex*
de M. Latreille sont dans ce second cas.

ESPÈCES.

[*Mandibules dentées au côté interne.*]

1. *Sphex* des sables. *Sphex sabulosa*. L.

*S. hirta, nigra; abdominis petiolo biarticulato, segmento
secundo tertioque ferrugineis.* L.

Tom. IV.

8

Sphex sabulosus Lin. Fab. p. 198. Panz. fasc. 65. t. 12.

Ammophila sabulosa. Latr.

Ichneumon, n.º 63. Geoff. 2. p. 349.

Habite en Europe.

2. *Sphex* langue-blanche. *Sphex lutaria*. F.

S. nigra, *glabra*; *abdominis petiolati segmento secund*
teritioque rufis; *labio argenteo*. Fab. p. 199.

Panz. fasc. 65. t. 14.

Ammophila. Latr.

Habite en Europe.

3. *Sphex* des chemins. *Sphex arenaria*.

S. nigra, *hirta*; *abdominis petiolo (brevi) uniarticulato*
segmento secundo tertioque rufis; *alis longitudine cor*
poris.

Sphex arenaria. Fab. p. 199. Panz. fasc. 65 et 15.

Sphex viatica. Lin. ex D. Latr.

Ammophila Latr.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux, sur les chemins.

4. *Sphex* ailes jaunâtres. *Sphex flavi pennis*. Latr.

S. atra, *fronte aured*, *abdomino rufo*; *petiolo apic*
atris. F.

Sphex flavi pennis. Fab. p. 201. *Pepsis flavi pennis ejusd.*

Habite l'Italie, la Provence, les environs de Bordeaux.

[*Mandibules sans dents au côté interne.*]

5. *Sphex* spiralier. *Sphex spirifex*.

S. atra, *thorace hirta immaculato*; *petiolo uni articulato*,
flavo, *longitudine abdominis*. L.

Sphex spirifex. Lin. Fab. p. 204.

Panz. fasc. 76. tab. 15.

Pelopæus. Latr.

Habite l'Europe australe, le midi de la France:

Etc.

BE MB È CE. (Bembex.)

Antennes filiformes, grossissant un peu vers leur
sommet, rapprochées à leur insertion. Lèvre supérieur

très-saillante, en triangle allongé, rostriforme. Mandibules pointues, dentées au côté interne. Palpes grêles, courts. Promuscide (mâchoires et lèvre inférieure) allongée, fléchie.

Corps allongé. Segment antérieur du corselet transversal, étroit. Abdomen ovale-conique, presque sessile. Pattes courtes ou moyennes.

Antennæ filiformes, sensim extrorsum crassiores, insertionem approximatae. Labrum penitus exsertum, elongato-trigonum, rostriforme. Mandibulæ dentatæ, latere interno dentatæ. Palpi graciles, breves. Promuscis elongata, inflexa.

Corpus elongatum. Thoracis segmentum anticum transversale, angustum. Abdomen ovato-conicum, thoracis pediculo brevissimo affixum. Pedes breves aut longiusculi mediocres.

OBSERVATIONS.

Les bembèces ont des rapports, par leurs habitudes, avec les sphex et les crabrons. Elles ressemblent un peu aux pompilides par les couleurs et la forme de leur corps, mais leurs antennes supérieures ne sont point plissées, et leur abdomen est presque sessile. Enfin, leurs mâchoires et leur lèvre inférieure forment une promuscide allongée, fléchie presque comme chez les abeilles. Leur lèvre supérieure très-saillante, produisant un bec souvent abaissé, est ce qui les caractérise éminemment.

Les insectes font leur nid dans la terre, et y déposent un œuf. Les insectes font leur nid dans la terre, et y déposent un œuf et des insectes pour nourrir la larve qui doit y éclore.

ESPÈCES.

Bembèce à bec. *Bembex rostrata*.

B. labio superiori conico fisso; abdomine atro; fasciis longitudinalibus glaucis repandis. F.

Sphex sabulosus: Lin. Fab. p. 198. Panz. fasc. 65. t. 12.

Ammophila sabulosa. Latr.

Ichneumon, n.º 63. Geoff. 2. p. 349.

Habite en Europe.

2. *Sphex* langue-blanche. *Sphex lutaria*. F.

S. nigra, glabra; abdominis petiolati segmento secundo tertioque rufis; labio argenteo. Fab. p. 199.

Panz. fasc. 65. t. 14.

Ammophila. Latr.

Habite en Europe.

3. *Sphex* des chemins. *Sphex arenaria*.

S. nigra, hirta; abdominis petiolo (brevi) uniarticulato; segmento secundo tertioque rufis; alis longitudine corporis.

Sphex arenaria. Fab. p. 199. Panz. fasc. 65 et 15.

Sphex viatica. Lin. ex D. Latr.

Ammophila Latr.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux, sur les chemins.

4. *Sphex* ailes jaunâtres. *Sphex flavi pennis*. Latr.

S. atra, fronte auresc., abdomine rufo: petiolo apice atris. F.

Sphex flavi pennis. Fab. p. 201. *Pepsis flavi pennis* ejusd.

Habite l'Italie, la Provence, les environs de Bordeaux.

[Mandibules sans dents au côté interne.]

5. *Sphex* spirulier. *Sphex spirifex*.

S. atra, thorace hirta immaculato; petiolo uni articulato; flavo, longitudine abdominis. L.

Sphex spirifex. Lin. Fab. p. 204.

Panz. fasc. 76. tab. 15.

Pelopæus. Latr.

Habite l'Europe australe, le midi de la France.

Etc.

BEMBÈCE. (Bembex.)

Antennes filiformes, grossissant un peu vers leur sommet, rapprochées à leur insertion. Lèvre supérieure

nte, en triangle allongé, rostriforme. Mandibules, dentées au côté interne. Palpes grêles, promuscide (mâchoires et lèvre inférieure) alléchiée.

allongé. Segment antérieur du corselet très-étroit. Abdomen ovale-conique, presque sessile, court ou moyen.

maxillæ filiformes, sensim extrorsum crassiores, apicem approximatas. Labrum penitus exsertit, angulo-trigonum, rostriforme. Mandibulæ intus dentatæ. Palpi graciles, breves. Tarsus elongatus, inflexus.

Thoracis segmentum anticum breve, angustum. Abdomen ovato-conicum, thoraci brevissimo affixum. Pedes breves aut longiusculi.

OBSERVATIONS.

Les Bembex ont des rapports, par leurs habitudes, avec les crabrons. Elles ressemblent un peu aux Colletes, par les couleurs et la forme de leur corps, mais leurs mandibules ne sont point plissées, et leur abdomen est sessile. Enfin, leurs mâchoires et leur lèvre inférieure sont promuscide allongée, fléchie presque comme les mandibules. Leur lèvre supérieure très-saillante, presque toujours abaissée, est ce qui les caractérise émi-

nent. Elles font leur nid dans la terre, et y déposent un grand nombre d'insectes pour nourrir la larve qui doit y éclore.

ESPECES.

1. à bec. *Bembex rostrata.*

capite nigro; thorace nigro; abdomine atro; fasciis transversis repandis. F.

Apis rostrata. Lin.

Bembex rostrata. Fab. Panz. fasc. 1. tab. 10.

Habite en Europe, sur les collines sablonneuses.

2. Bembèce oculée. *Bembex oculata*. Jur.

B. labro conico, thorace immaculato, abdomine nigro: fasciis flavis, primâ interruptâ, secundâ oculatâ, reliquis repandis. P.

Panz. fasc. 84. tab. 22.

Habite en Suisse, aux lieux montagneux.

Voyez, dans le même fascicule de Panzer, son *bembex integra*, t. 21.

3. Bembèce marquée. *Bembex signata*.

B. labio superiori rotundato integro; corpore nigro flavoque vario. F.

Bembex signata. Fab. p. 247.

Monedula. Latr.

Habite en Amérique.

Etc.

LARRE. (Larra.)

Antennes filiformes ou subsétacées, insérées près de la bouche. Lèvre supérieure petite, cachée ou peu découverte. Mandibules souvent échancrées au côté inférieur près de la base, avec un angle en saillie. Les yeux grands, souvent rapprochés postérieurement.

Tête transverse. Premier segment du corselet transverse, étroit, marginal. Abdomen allongé-conique. Pattes courtes; à jambes postérieures ciliées ou épineuses.

Antennæ filiformes vel subsetaceæ, os versus insertæ. Labrum parvum, absconditum aut parùm detectum. Mandibulæ sæpe latere infero versus basim emarginatæ, cum angulo prominulo. Oculi magni, posticè sæpe convergentes.

Caput transversum. Thoracis segmentum anticum transversale , perangustum , marginale. Abdomen elongato-conicum. Pedes breviusculi ; tibis posticis ciliato-spinosis.

OBSERVATIONS.

Les *larres* sont fort nombreux , paraissent tenir aux crabrons et aux sphex par leurs rapports , et plusieurs même ressemblent aux ichneumonides par l'aspect. M. Latreille , qui en forme sa famille des *larrates* , les a divisés en treize genres. Croyant pouvoir me dispenser d'entrer dans ces détails , je distingue ces insectes des bembèces , par le labre caché ou peu découvert ; des crabrons , par leurs yeux prolongés jusqu'au côté postérieur de la tête ; enfin , des philanthes , par leurs antennes insérées près de la bouche et non loin d'elle.

Les insectes , dont il s'agit , font leur nid dans le sable.

ESPECES.

Mandibules échancrées au côté inférieur , près de la base.

1. Larre ichneumoniforme. *Larra ichneumoniformis.*

F.

L. atra : abdominis primo secundoque segmento rufis. Fab.
p. 221.

Panz. fasc. 76. tab. 18.

Coqueb. ill. ic. det. 2. t. 12. f. 10. *femina.* et f. 11. *mas.*

Habite en Hongrie et dans le midi de la France.

2. Larre tricolor. *Larra tricolor.*

*L. nigra ; abdomine utrinque lunulis argenteo-sericeis ;
basi rufo , apice nigro.*

Pompilus tricolor, Fab. Panz. fasc. 84. t. 19.

Lyrops. Latr.

Habite en Barbarie , etc.

3. Larre pompiliforme. *Larra pompiliformis*. P.

L. nigra; abdomine nigro, basi ferrugineo. Panz. fasc. 89. tab. 13.

Lyrops. Latr.

Habite en Allemagne.

4. Larre peint. *Larra picta*.

L. nigra, lævis; thorace maculato; abdomine ferrugineo: fasciis tribus flavis.

Crabro pictus. Fab. p. 299. Panz. fasc. 17. t. 19. et fasc. 71. t. 10.

Dinetus. Latr.

Habite en Allemagne.

5. Larre flavipède. *Larra flavipes*.

L. nigra; thorace maculato; abdomine flavo: segmentorum marginibus anoque nigris.

Philanthus flavipes. Fab. p. 290. Panz. fasc. 84. t. 24.

Palarus flavipes. Latr. gen. crust. et ins. 1. t. 14. f. 1.

Habite l'Europe australe, l'Italie.

Mundibules non échancrés au côté inférieur.

6. Larre à cinq bandes. *Larra quinquecincta*.

L. nigra; scutello flavo; abdomine fasciis quinque flavis continuis.

Mellinus quinquecinctus. Fab. p. 287. Panz. fasc. 72. t. 14.

Gorytes quinquecinctus. Latr.

Habite en Europe. Voyez Panzer, fasc. 98. t. 17.

7. Larre épineux. *Larra spinosa*.

L. nigra, nitida; abdomine fasciis tribus transversis flavis: primâ interruptâ.

Nisson spinosus. Latr. Panz. fasc. 72. t. 13.

Habite en France, en Allemagne, etc.

Etc.

CRABRON. (Crabro.)

Antennes filiformes, courtes, brisées, le premier article plus long, insérées près de la bouche. Lèvre su-

périeure petite, peu découverte. Mandibules bidentées, ou pluridentées. Les yeux non rapprochés supérieurement.

Corps allongé. Premier segment du corselet transversal, linéaire, marginal. Pattes courtes ou moyennes.

Antennæ filiformes, breves, fractæ, propè os insertæ : articulo primo longiore. Labrum parvum, paululum detectum. Mandibulæ bidentatæ aut pluridentatæ. Oculi subovati, supernè distantes.

Corpus elongatum. Thoracis segmentum transversum, angustum, marginale. Pedes breves aut longitudine mediocres.

OBSERVATIONS.

Les *crabrons* sont des insectes assez communs, que l'on rencontre sur les fleurs, et qui ressemblent presque à des guêpes, leur corps étant en général varié de noir et de jaune. Ils font leur nid dans le sable, dans les vieux bois, dans les fentes des murs; déposent un œuf au fond, et placent auprès, soit des mouches, soit quelqu'autre insecte, pour servir de nourriture à la larve qui y éclora.

Avec nos crabrons et les philanthes qui viennent ensuite, M. Latreille forme sa famille des *crabronites* qu'il divise en un assez grand nombre de genres. Ces insectes sont effectivement nombreux et variés; mais ils se tiennent par de grands rapports, et les deux genres que je présente me paraissent suffire.

Dans nos crabrons, les antennes sont courtes, brisées, ont le premier article plus long, et s'insèrent près de la bouche. Elles sont plus longues que dans les *philanthes*, non brisées, et s'insèrent loin de la bouche. De part et d'autre, les yeux ne sont point rapprochés postérieurement comme dans les *larres*. Plusieurs crabrons ont la lèvre argentée et brillante.

ESPECES.

1. Crabron souterrain. *Crabro subterraneus*.
C. thorace maculato, abdomine utrinque maculis quinque flavis; pedibus ferrugineis.
Crabro subterraneus. Fab. p. 295. Panz. fasc. 3. t. 21.
 Habite en Europe.
2. Crabron à six bandes. *Crabro sexcinctus*.
C. thorace maculato; abdomine fasciis sex flavis: primis interruptis. F.
Crabro sexcinctus. Fab. p. 295. Panz. fasc. 64. t. 13.
 Habite en Europe.
3. Crabron fossoyeur. *Crabro fossorius*.
C. thorace immaculato, abdomine maculis quinque lutescentibus, pedibus nigris. F.
Crabro fossorius. Fab. p. 294. Panz. fasc. 72. t. 11.
Sphex fossoria. Lin.
 Habite en Europe.
4. Crabron porte-crible. *Crabro cribrarius*.
C. niger; thorace maculato; abdomine fasciis flavis: intermediis interruptis; tibiis anticis clypeis concavis. F.
Sphex cribraria. Lin.
Crabro cribrarius. Fab. p. 297. Panz. fasc. 15. t. 18—19.
 Habite en Europe. Le premier article des tarses antérieurs est dilaté en palette.
 Etc.

 PHILANTHE. (Philanthus.)

Antennes beaucoup plus longues que la tête, renflées vers le bout, et insérées loin de la bouche. Lèvre supérieure courte, transverse, fléchie. Mandibules presque sans dents au côté interne. Les yeux écartés en dessus.

Tête grande, plus large que le tronc. Abdomen ovale-conique.

Antennæ capite in plurimis multò longiores, sensim extrorsum crassiores, capitis faciei medio insertæ, ab ore distantes. Labrum breve, transversum inflexum. Mandibulæ latere interno subedentulæ. Oculi supernè distantes.

Caput magnum, trunco latius. Abdomen ovato-conicum.

OBSERVATIONS.

Les *philanthes* tiennent de très-près aux crabrons par leurs rapports et par leurs habitudes. Cependant on peut les en distinguer par la forme et l'insertion de leurs antennes. Ils ont d'ailleurs le chaperon trilobé et souvent les yeux échancrés.

Je rapporte à ce genre les *philanthus* et les *cerceris* de M. Latreille, quoiqu'ils puissent être distingués.

ESPECES.

1. Philanthe couronné. *Philanthus coronatus*.

Ph. niger, thorace maculato; abdominis fasciis quinque flavis: anticis duabus interruptis. F.

Philanthus coronatus. Fab. p. 288. Latr.

Panz. fasc. 84. t. 23.

Habite en Europe. Se trouve aux environs de Paris.

2. Philanthe apivore. *Philanthus apivorus*.

Ph. niger, ore ronteque flavo maculatis; thorace maculato; abdomine fasciis sex flavis: anticis duabus semi-interruptis.

Philanthus apivorus: Latr. hist. des fourm. p. 307. pl. 12. f. 2. femelle.

Philanthus pictus. Fab. Panz. fasc. 47. t. 23. mâle.

Habite en Europe. Il fait son nid dans les terrains exposés au

soleil, et s'empare de l'abeille domestique qu'il tue et place dans son nid, près de son œuf.

3. Philanthe à oreilles. *Philanthus lætus*.

Ph. niger ; thorace maculato ; abdominis primo segmento, punctis duobus, reliquis fascia flavis. F.

Philanthus lætus. Fab. p. 291. Panz. fasc. 63. t. 11.

Cerceris aurita. Latr.

Habite en' Europe. Se trouve aux environs de Paris.

Etc.

SECONDE SECTION.

HYMÉNOPTÈRES A TARRIÈRE,

[*Terebrantes* , Latr.]

Abdomen des femelles muni d'une tarrière qui sert à déposer les œufs.

Les hyménoptères nombreux que comprend cette section sont remarquables en ce que les femelles ont, à l'extrémité de l'abdomen, une tarrière qui leur sert à déposer les œufs. Cette tarrière, qui est rarement piquante, est, le plus souvent, saillante à l'extrémité de l'abdomen. Elle y varie dans sa grandeur, sa composition et sa direction, étant tantôt droite et caudiforme, tantôt recourbée sous l'abdomen ou au-dessus, etc. Et général, elle est composée de plusieurs pièces séparables longitudinalement. (Deux pièces latérales servant de gaine à la vraie tarrière.)

Cette section embrasse six familles distinctes, que j'ai distribuées, divisées et caractérisées de la manière suivante.

DIVISION DES HYMÉNOPTÈRES A TARRIÈRE.

‡ *Tarrière tubulaire conique , non fissile.*

Les tubulifères.

§. *Tarrière plurivalve , fissile.*

(1) Abdomen pédiculé ou subpédiculé. Il tient au corselet par un pédicule ou par un point. Larves apodes:

(a) Les quatre ailes veinées.

(*) Antennes filiformes ou sétacées, de vingt articles et au-delà, le plus souvent vibratiles.

Les ichneumonides.

(**) Antennes de douze à seize articles. Pédicule de l'abdomen s'insérant au-dessus de l'extrémité postérieure du corselet.

Les évaniales.

(b) Les deux ailes inférieures non veinées.

(*) Antennes brisées. Abdomen caréné en dessous. La tarrière jamais roulée en spirale.

Les sinipsaires.

(**) Antennes droites. Abdomen caréné en dessous. La tarrière roulée en spirale, au moins dans sa base, sous l'abdomen.

Les diplolépaïres.

(2) Abdomen tout-à-fait sessile. Il tient au corselet par toute sa largeur. Larves pédifères.

Les érucaïres.

LES TUBULIFÈRES.

La tarrière des femelles , plus ou moins apparente , forme un tube conique pointu , qui ne se divise point en plusieurs valves longitudinales séparables.

Sous cette coupe, je réunis les *chrysidides* et les *proctotrupiens* de M. Latreille , dans l'intention de réduire, le plus possible, le nombre des familles et surtout celui des genres, lorsque les insectes me paraissent se rapprocher assez par leurs rapports.

Ces insectes font, en quelque sorte, une transition des hyménoptères à aiguillon, à ceux qui ont une véritable tarrière.

Dans les *chrysidides*, la tarrière n'existe pas encore par des pièces particulières; elle n'est formée que par les derniers segmens articulés de l'abdomen; enfin, elle est rétractile et porte à son extrémité un petit aiguillon.

Mais dans les *proctotrupiens*, quoique tubulaire et pointue, la tarrière semble souvent formée de deux valves soudées, qui ne se séparent point, et déjà elle est distincte des derniers anneaux de l'abdomen.

Les hyménoptères *tubulifères* ont l'abdomen inséré au corselet par une portion de son diamètre transversal. Leurs ailes inférieures n'ont point de nervures distinctes. Je les divise ainsi.

- (1) Tarrière rétractile formée par les derniers anneaux de l'abdomen; et portant un petit aiguillon. Le corps se contractant en boule lorsqu'on le prend.

- (a) Mandibules allongées et étroites.

Chryside.

- (b) Mandibules courtes, larges, tronquées, dentées.

Clepte.

- (2) Tarrière saillante, pointue, sans aiguillon. Le corps ne se contractant point en boule.

- (a) Corselet entier, non divisé, à segment antérieur toujours court.

Oxyure.

- (b) Corselet divisé en deux parties, ou ayant le segment antérieur allongé.

Dryne.

CHRYSIDE. (Chrysis.)

Antennes filiformes, brisées, vibratiles, un peu plus longues que la tête. Lèvre supérieure très-petite. Mandibules allongées, étroites, pointues. Quatre palpes inégaux.

Tête transverse. Corselet tronqué aux deux bouts. Abdomen concave en dessous. Le corps brillant, orné de couleurs métalliques, se contractant en boule.

Antennæ filiformes, fractæ, vibratiles, capite paulo longiores. Labrum minimum. Mandibulæ elongatæ angustæ, acutæ. Palpi quatuor inæquales.

Caput transversum. Thorax anticè posticèque truncatus. Abdomen subtus fornicatum. Corpus splendendum, coloribus metallicis sæpius ornatum, in globum contractile.

Coqueb. ill. ic. dec. 1. tab. 4. f. 5.

Habite en Italie, aux environs de Paris.

3. Clepte pallipède. *Cleptes pallipes*.

C. capite thoraceque supra auratis ; abdominis segmentis primis supernè ferrugineis.

Cleptes pallipes. Le pelt. ann. du mus. vol. 7. p. 119. f. 1.

Habite aux environs de Paris.

OXYURE. (Oxyurus.)

Antennes filiformes, quelquefois s'épaississant vers leur sommet, plus longues que la tête, insérées au milieu du front ou près de la bouche. Lèvre supérieure petite. Mandibules variées, pointues, avec ou sans dents.

Corselet allongé, continu, non divisé en deux nœuds. Tarrière tubuleuse, rarement cachée.

Antennæ filiformes, interdum extrorsum crassiores, capite longiores, frontis medio aut paulò inferius insertæ. Labrum parvum. Mandibulæ variæ, acutæ, dentatæ aut edentulæ.

Thorax elongatus, continuus, non binodis. Feminarum terebra tubulosa, acuta, rarè occulta.


OBSERVATIONS.

Je rapporte à cette coupe, que je présente comme générique, ceux des *proctotrupiens* de M. Latreille, dont le corselet est continu et non divisé en deux nœuds ; le segment antérieur de ce corselet étant court, transverse et arqué. Les insectes qui sont dans ce cas, constituent nos *oxyures*. Ils ne sont point brillans comme les chrysides et les cleptes, et les femelles ont une véritable tarrière tubuleuse, pointue, non fissile, presque toujours saillante. Les antennes de ces

insectes ont dix à quinze articles, sont un peu longues, quelquefois brisées, et quelquefois aussi vont en s'épaississant vers leur sommet. L'abdomen est un peu pédiculé, caréné en dessous dans les femelles.

ESPECES.

[*Antennes brisées.*]

1. Oxyure frontale. *Oxyurus frontalis*.
O. niger; capite punctato; abdomine depresso subsessili.
Sparasion frontale. Latr.
 Habite en France, dans le Piémont.
2. Oxyure antéon. *Oxyurus anteon*.
O. niger, nitidus; pedibus flavescens. 
Anteon jurianum. Latr.
 Habite en France.
3. Oxyure conique. *Oxyurus conicus*.
O. niger; abdomine conico acutissimo; femoribus clavatis ferrugineis.
Ichneumon conicus. Fab. *Chalcis conica*, ejusd.
Diapria conica. Latr.
 Habite en Europe.
4. Oxyure cornue. *Oxyurus cornutus*.
O. ater, nudus, nitens; vertice cornuto.
Psylus cornutus. Panz. fasc. 83. t. 11.
Diapria cornuta. Latr.
 Habite au midi de la France, etc.

[*Antennes non brisées.*]

5. Oxyure brévipenne. *Oxyurus brevipennis*.
O. niger; thorace posticè granulato; abdomine pedibusque fusco-fulvis.
Proctotrupes brevipennis. Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 13.
 f. 1. et vol. 4. p. 38.
 Habite le midi de la France; sur la terre.

6. Oxyure noire. *Oxyurus niger*.

O. totus ater, nitidus, antennarum articulo primo pedibusque flavis.

Codrus niger. Panz. fasc. 85. tab. 9.

Proctotrupes. Latr.

Habite en Allemagne.

7. Oxyure anomalipède. *Oxyurus anomalipes*.

O. ater, nitidus; pedibus anticis, tibiis tarsisque mediis et posticis testaceis.

Sphex anomalipes. Panz. fasc. 52. t. 23. et fasc. 100. t. 18.

Helorus anomalipes. Latr.

Habite en Allemagne, et aux environs de Paris.

D R Y N E. ● (Drynus.)

Antennes filiformes, insérées près du bord antérieur de la tête. Mandibules dentées, très-pointues. Palpes inégaux; les maxillaires plus longs.

Corps allongé. Corselet, soit formé de deux nœuds, soit continu et ayant le segment antérieur allongé. Abdomen ovale, attaché par un pédicule court.

Antennæ filiformes, os versum propè clypeum insertæ. Mandibulæ dentatæ, acutæ. Palpi inæquales: maxillaribus longioribus.

Corpus elongatum. Thorax vel binodis, vel continuus: segmento antico elongato. Abdomen ovale, thoraci pediculo brevi affixum.

OBSERVATIONS.

Sous le nom de dryne, je réunis le *drynus* et les *bethylus* de M. Latreille. Ce sont encore des proctotrupiens pour cet entomologiste; mais leur corselet est formé de deux nœuds,

ou a son segment antérieur allongé; ce qui n'a point lieu dans nos oxyures.

Dans le *drynus* de M. Latreille, les antennes sont droites, longues, et ont dix articles; celles de ses *bethylus* ont treize articles et sont brisées.

ESPÈCES.

1. Dryne formicaire. *Drynus formicarius*.

D. subruber; thoracis parte posticâ abdomineque nigrescentibus; alis anticis fusco-fasciatis.

Drynus formicarius. Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 12. f. 6.

Hist. nat. des crust. et des ins. vol. 13. p. 228.

Habite le midi de la France.

2. Dryne cénoptère. *Drynus cenopterus*.

D. ater, laevis, nitidus; pedibus fuscis; alis opacis sub-aveniis.

Tiphia cenoptera. Panz. fasc. 81. t. 14.

Bethylus cenopterus. Latr.

Habite en Allemagne et aux environs de Paris.

3. Dryne hémiptère. *Drynus hemipterus*.

D. ater, glaber; alis brevissimis.

Tiphia hemiptera. Fab. suppl. p. 254.

Panz. fasc. 77. t. 14.

Bethylus hemipterus. Latr.

Habite en Allemagne.

Etc.

TARRIÈRE PLURIVALVE, FISSILE.

Elle se divise longitudinalement en plusieurs valves, dont les latérales servent de gâche à la tarrière proprement dite.

Cette coupe embrasse le reste des hyménoptères, et se trouve ici partagée en cinq familles, savoir: les ichnéumonides, les évaniales, les cinipsaires, les diplo-

lépaires ou gallicoles, enfin, les érucaires. On remarque que les trois premières de ces familles sont des insectes carnassiers dans l'état de larve, puisqu'ils dévorent les larves et les chrysalides des autres insectes; tandis que les insectes des deux dernières familles ne sont que des phytophages et ne se nourrissent que de substances végétales. Exposons-les successivement.

LES ICHNEUMONIDES.

Antennes filiformes ou sétacées, de vingt articles et au-delà, le plus souvent vibratiles. Les quatre ailes veinées.

On a donné le nom d'*ichneumonides* aux hyménoptères pupophages qui composent principalement le genre *ichneumon* de Linné; et, comme ces *ichneumonides* sont nombreux en races diverses, on les a divisés en beaucoup de genres.

Les insectes dont il s'agit, sont des hyménoptères à tarrière, remarquables en général par leur corps grêle, allongé, à abdomen pédiculé, ayant des antennes longues, droites ou avancées, multiarticulées et vibratiles. Les femelles de ces insectes ont une tarrière composée de trois filets, dont les deux latéraux, par leur réunion, servent de fourreau à celui du milieu. Les larves des *ichneumonides* sont sans pattes, et vivent toutes dans le corps des autres insectes. Les femelles, en effet, percent avec leur tarrière le corps des autres insectes encore en larves, surtout des chenilles, et y déposent un ou plusieurs de leurs œufs. Là, ces œufs ne tardent pas à éclore, et

les jeunes larves *ichneumonides* se nourrissent aux dépens de la chenille ou de la larve d'hyménoptère ou de diptère qui les contient, et en dévorent le corps grassex sans attaquer les organes essentiels de l'insecte ; ce qui fait qu'il continue de vivre, et parvient souvent à se changer en chrysalide avant de périr. Quant aux larves *ichneumonides*, elles se développent dans la larve qu'elles dévorent, s'y transforment en chrysalide après s'être enveloppées d'une coque de soie, et arrivées à l'état parfait, elles sortent du corps qui les contenait, après en avoir percé la peau.

Le groupe que forment les *ichneumonides* est naturel, assez bien circonscrit par le caractère des antennes de ces insectes, et a pu, avec raison, être considéré comme un genre. Mais ce genre étant extrêmement nombreux en espèces, on a pensé qu'il serait utile de le partager en plusieurs coupes particulières, comme autant de genres séparés, et qu'on ne devait considérer le groupe lui-même que comme une famille.

En conséquence, prenant toujours en considération les caractères qu'indique M. Latreille, je divise les *ichneumonides* de la manière suivante.

DIVISION DES ICHNEUMONIDES.

1. Mandibules non dentées ou en pointe entière à leur extrémité. Tête globuleuse.

Xoride.

2. Mandibules bidentées ou échancrées à leur extrémité : elles sont étroites, allongées, croisées.

(a) Abdomen vu en dessus, offrant au moins cinq anneaux distincts.

(+) Bouche point avancée en bec.

Ichneumon.

Crypture.

(+++) Bouche avancée en bec.

Agathis.

(b) Abdomen vu en dessus, paraissant inarticulé ou formé au plus de trois anneaux distincts.

Sigalphe.

3. Mandibules tridentées à leur extrémité, formant un carré irrégulier, grandes et écartées.

Alysie.

XORIDE. (Xorides.)

Antennes filiformes, droites, un peu longues. Palpes maxillaires très-longs. Mandibules simples ou un peu sinuées sur les côtés : à sommet entier, non échancré, ni denté.

Tête globuleuse. Abdomen oblong, rétréci en pédicule à sa base. Tarrière saillante.

Antennæ filiformes, rectæ, longiusculæ. Palpi maxillares longissimi. Mandibulæ simplices vel ad latera subsinuatae : apice integro, nec dentato, nec emarginato.

Caput globosum. Abdomen oblongum, in pediculum ad basim attenuatum. Terebra exserta.

OBSERVATIONS.

Sauf les *xorides* dont il s'agit ici, les autres ichneumonides, selon M. Latreille, ont le sommet des mandibules, soit échanfré, soit bidenté ou tridenté : c'est donc un genre assez bien circonscrit dans son caractère.

Nos *xorides* embrassent celles de M. Latreille, et ses *stephanes*. Néanmoins il n'y a encore que très-peu d'espèces d'indiquées.

ESPÈCES.

1. Xoride indicatrice. *Xorides indicatorius*.

X. niger, punctatus; thorace immaculato; abdomine rubescente: lateribus inferis albidis-maculatis.

Ichneumon indicatorius. Latr. gen. crust. et ins. 1. t. 12. f. 3.

Habite en France.

2. Xoride prédicateur. *Xorides præcatorius*.

X. ater; scutello flavicante; thorace maculato; abdominis segmentis margine albidis; pedibus rufis.

Ichneumon præcatorius. Fab. p. 159. Latr.

Habite en Allemagne.

3. Xoride couronnée. *Xorides coronatus*.

X. ater; alis fuscis: lunula pallida; abdomine ferrugineo; apice nigro; femoribus posticis serratis.

Ichneumon serrator. Fab. suppl. p. 224. *Bracon serrator* ejusd.

Piez. p. 108.

Stephanus coronatus. Jur. hymen. pl. 7. Panz. fasc. 76. t. 13.

Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 4.

Habite la France, l'Allemagne.

ICHNEUMON. (Ichneumon.)

Antennes filiformes ou sétacées, droites, longues, multiarticulées, vibratiles. Palpes inégaux; les maxillaires

plus longs. Mandibules allongées, bidentées ou échan-
crées à leur extrémité.

Tête transverse. Abdomen subpédiculé. La *tarrière*
bien saillante et caudiforme.

*Antennæ filiformes aut setaceæ, rectæ, longæ, mul-
tiarticulatæ, vibratiles. Palpi inæquales : maxilla-
ribus longioribus. Mandibulæ elongatæ, apice biden-
tatæ vel emarginatæ.*

*Caput transversum. Abdomen subpediculatum. Te-
rebra penitus exserta, caudiformis.*

OBSERVATIONS.

Quoique M. Latreille ait divisé les ichneumonides en huit genres, son genre *ichneumon* est resté d'une étendue énorme par le nombre des espèces qui s'y rapportent. D'après cette considération, j'ai cru qu'il serait utile de profiter de la principale division qu'il y introduit, pour le partager en deux coupes génériques, assez faciles à distinguer. Ainsi c'est avec les ichneumons de sa première division, dont je ne sépare pas ses acœnites, que je forme le genre *ichneumon* dont il s'agit ici. A-peu-près comme tous les autres, ce genre est sans doute artificiel ; mais il embrasse des espèces convenablement liées entre elles par leurs rapports, et qui, toutes, offrent cette particularité, dans les femelles, d'avoir à l'extrémité de leur abdomen, une *tarrière* caudiforme, toujours saillante, quelquefois fort longue. Elle indique les habitudes particulières de ces races ; car elle fait sentir qu'ayant l'habitude de rechercher les nids des autres insectes pour y enfoncer leur *tarrière*, ou de percer les larves qui sont sous les écorces des arbres, elles ont souvent de grands obstacles à vaincre pour pénétrer dans les lieux où elles doivent déposer leurs œufs ; par suite leur *tarrière*

en a obtenu une saillie constante et une longueur plus ou moins grande , appropriées aux habitudes de ces animaux.

Comme les autres ichneumonides, les larves de nos *ichneumons* sont carnassières, et vivent toujours dans le corps des autres insectes. Parvenus à l'état d'insecte parfait, les ichneumons dont il s'agit, ne se distinguent principalement de nos cryptures que parce que les femelles de celles-ci ont la tarière rétractile , entièrement ou presque entièrement cachée dans l'abdomen lorsqu'elle n'est pas employée.

ESPECES.

[*Abdomen presque sessile.*]

1. Ichneumon persuasif. *Ichneumon persuasorius.*

I. scutello albo , thorace maculato , abdomine segmentis omnibus utrinque punctis duobus albis. Fab.

Panz. fasc. 19. tab. 18.

Pimpla persuasoria. Fab. Piez. p. 112.

Habite l'Europe boréale.

2. Ichneumon manifestateur. *Ichneumon manifestator.*

I. ater , immaculatus ; abdomine sessili , cylindrico ; pedibus rufis.

Ichneumon manifestator. Lin. Fab. Latr. Panz. fasc. 19. t. 21.

Pimpla manifestator. Fab. Piez. 113.

Habite en Europe.

3. Ichneumon piéton. *Ichneumon pedator.*

I. luteus ; abdominis segmentis utrinque puncto atro ; antennis aculeoque nigris.

Ichneumon pedator. Fab. p. 157. *Pimpla pedator*, ejusd. Piez.

Habite aux Indes orientales.

4. Ichneumon extenseur. *Ichneumon extensor.*

I. niger ; abdomine subcylindrico ; pedibus rufis ; aculeo corpore longiore.

Ichneumon extensor. Lin. Fab. p. 168.

Pimpla extensor. Fab. Piez. p. 115.

Ichneumon. Geoff. 2. p. 359. n.º 86.

Habite en Europe.

5. *Ichneumon réluctateur. Ichneumon reluctator.*

I. niger; abdomine piceo vel sanguineo; tibiis anticis c
vatis.

Ichneumon reluctator. Panz. fasc. 71. t. 13.

Cryptus reluctator. Fab. Piez. p. 79.

Habite l'Europe boréale.

6. *Ichneumon douteux. Ichneumon dubitator*. F.

I. ater, nitidus; abdominis segmento secundo tertioque
fis, reliquis margine flavo.

Ichneumon dubitator. Panz. fasc. 78. t. 14.

Cryptus dubitator. Fab. Piez. p. 85.

Acænites. Latr. gen. crust. et ins. p. 9.

Habite en Allemagne.

7. *Ichneumon plumuleux. Ichneumon pennator.*

I. niger; abdomine sessili cylindrico; pedibus rufis; ac
longitudine abdominis hirsuto.

Ichneumon pennator. Fab. p. 171.

Pimpla pennator. Fab. Piez. p. 116.

Habite à Kiel.

[*Abdomen pédiculé.*]

8. *Ichneumon élévateur. Ichneumon elevator.*

I. ater, pedibus flavis : posticis apice albis; abdomine
vato.

Panz. fasc. 71. tab. 15.

An ophion clavator? Fab. Piez. p. 134.

Habite en Allemagne.

9. *Ichneumon abbréviateur. Ichneumon abbreviator.*

I. niger; abdomine brevissimo clavato rufo, apice trun
nigro.

Ichneumon abbreviator. Fab. *Ophion abbreviator*, ej
Piez.

Panz. fasc. 71. t. 17.

Habite en Allemagne.

0. Ichneumon jaunissant. *Ichneumon flavator*.*I. ater* ; *alis nigris immaculatis* ; *abdomine flavo*.*Ichneumon flavator*. Fab. p. 161.

Coqueb. illust. ic. dec. 3. tab. 11. f. 9.

Habite en Barbarie. Tarrière de la longueur de l'abdomen.

. Ichneumon incubateur. *Ichneumon incubitor*.*I. niger*, *abdomine ferrugineo*, *apice nigro* : *macula alba* ;
alis hyalinis.*Ichneumon incubitor*. Lin. Fab. *Cryptus*, n.º 53. ejusd.
Piez.

Geoff. 2. p. 341. pl. 16. f. 1.

Habite en Europe.

. Ichneumon pédiculaire. *Ichneumon pedicularius*.*I. apterus*, *rufus* ; *capite thoracis abdominisque postico*
nigris.*Ichneumon pedicularius*. Panz. fasc. 81. t. 13.*Cryptus pedicularius*. Fab. Piez. p. 92.

Habite en Europe.

1. Ichneumon lunulé. *Ichneumon lunator*.*I. nigro flavoq. varius* ; *abdomine clavato* : *utrinque lunu-*
lis flavis.*Ichneumon lunator*. Fab. p. 162.Habite l'Amérique septentrionale. Tarrière plus longue que
le corps.

Etc.

CRYPTURE. (Crypturus.)

Antennes filiformes ou sétacées , multiarticlées , vi-
ratives , plus ou moins longues. Palpes inégaux. Man-
ibules allongées , bidentées ou échancrées à leur extré-
mité.

Tête transverse. Abdomen allongé , pédiculé , quel-
quefois presque sessile. Tarrière aculéiforme , rétractile,
ou saillante ou peu saillante dans l'inaction.

Antennæ filiformes aut setaceæ , multiarticulatæ , vibratiles , longitudine variæ . Palpi inæquales . Mandibulæ elongatæ , apice bidentatæ vel emarginatæ .

Caput transversum . Abdomen elongatum , pediculatum , interdum subsessile . Terebra aculeiformis , retractilis , in abdomine abscondita , vel parum exserta .

OBSERVATIONS.

Nos *cryptures* peuvent être considérées comme un sous genre , c'est-à-dire , comme un démembrement du genre *ichneumon* , que je ne divise que pour faciliter l'étude de nombreuses espèces de ce dernier , et que pour soulager la mémoire à l'aide d'un nom particulier.

Ainsi les *cryptures* , dont il est ici question , embrassent les ichneumons de M. Latreille , dont la tarrière , retirée dans l'inaction , est alors cachée entièrement ou en grande partie , et ne forme point une queue bien remarquable à l'extrémité de l'abdomen des femelles.

La facilité qu'on a de saisir ce caractère semble constituer son seul intérêt. Il en offre cependant un autre car il indique , en quelque sorte , les habitudes particulières de ces ichneumonides. En effet , les *cryptures* n'ont pas autant de difficultés à vaincre pour placer leurs œufs que la plupart des ichneumons , puisqu'il paraît qu'elles ne recherchent , pour déposer leurs œufs , que des corps mous et à découvert , tels que les chenilles et les chrysalides non cachées. Une tarrière courte et fort petite a donc pu leur suffire , et dans l'inaction cette tarrière a pu rentrer entièrement ou en grande partie dans l'abdomen.

Ceux de ces insectes dont l'abdomen est pédiculé , peuvent être pris pour des *sphex* ; car ils en ont l'aspect , leur tarrière étant non ou peu apparente. Quoique les *cryptures*

ient nombreuses en espèces, je n'en citerai ici que quelques-unes pour exemple.

ESPECES.

Crypture meurtrière. *Crypturus sugillatorius*.

Cr. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro: segmento primo secundoque utrinque puncto albo, pedibus rufis, F.

Ichneumon sugillatorius. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 345. n.° 54.

Habite en Europe, dans les bois.

Crypture entrepreneuse. *Crypturus molitorius*.

Cr. scutello albo, thorace immaculato; abdominis apice tibiatarumque basi albis.

Ichneumon molitorius. Lin. Fab.

Panz. fasc. 19. tab. 16.

Habite en Europe.

Crypture étendue. *Crypturus extensorius*.

Cr. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis; ultimis apice albidis.

Ichneumon extensorius. Lin. Fab.

Panz. fasc. 19. t. 17.

Habite en Europe.

Crypture joyeuse. *Crypturus lætatorius*.

Cr. niger; scutello albo, thorace maculato; abdomine rufo apice nigro; tibiis posticis annulo albo.

Ichneumon lætatorius. Fab. Panz. fasc. 19. t. 19.

Habite en Europe.

Crypture cracheuse. *Crypturus sputator*.

Cr. niger; thorace immaculato; abdominis segmento secundo tertioque rufis.

Ichneumon sputator. Fab. Piez. p. 66.

Panz. fasc. 19. t. 20.

Habite en Europe.

6. Crypture vespoïde. *Crypturus vespoïdes*.

Cr. ater ; *scutello bidentato* , *marginis flavo* ; *abdominis segmentis marginis flavis : secundo bipunctato* , *ultimo maculato* .

Ichneumon necatorius . Fab. Piez. p. 62.

Panz. fasc. 47. tab. 19.

Habite l'Allemagne , le midi de la France. Abdomen aile.

7. Crypture bidentée. *Crypturus bidentorius*.

Cr. scutello flavicante ; *thorace submaculato* : *abdominis segmento secundo tertioque basi flavis* ; *pedibus*

Ichneumon bidentorius . Fab. p. 147 et Piez. p. 63.

Panz. fasc. 45. tab. 15.

Habite l'Europe boréale.

Etc. *L'ichneumon deprimator* de Fab. Panz. fasc. 79. t. 1 appartient à ce genre.

AGATHIS. (Agathis.)

Antennes sétacées , multiarticulées , droites ou que convolutées. Bouche avancée en bec droit ou incliné. Mandibules bidentées au sommet. Lèvre inférieure longue , subbifide.


Corps allongé. Abdomen oblong , subpédiculé. Queue saillante.

Antennæ setaceæ , multiarticulatæ , rectæ aut convolutæ. Os in rostrum prominens , rectum inflexum. Mandibulæ apice bidentatæ. Labium gatum , subbifidum.

Corpus elongatum. Abdomen subpediculatum oblongum. Terebra exserta.

OBSERVATIONS.

Sous le nom d'*agathis* , je réunis ceux de M. Latreille avec ses bracons , qu'auparavant il avait nommés vîp



SANS VERTÈBRES.

143

qui m'y autorise, jusqu'à un certain point, c'est que les
es et les autres de ces ichneumonides ont la bouche avan-
en bec. Par cette considération seule, je les distingue de
sichneumons.

ESPECES.

[Museau droit.]

Agathis des malvacées. *Agathis malvacearum*.

A. niger; *pedibus fasciâque propè basim abdominis rubes-*
centibus; *tarsis nigrinis*.

Agathis malvacearum. Latr. hist. nat. des crust. et des ins.
13. p. 175. et gen. crust. et ins. 1. tab. 12. f. 2.

Habite aux environs de Paris. Tarrière de la longueur du
corps.

Agathis jaune. *Agathis purgator*.

A. luteus; *antennis aculeoque nigris*; *alis hyalinis*: *fasciis duabus fuscis*.

Ichneumon purgator. Fab. p. 156. Coqueb. illust. ic. dec. 1.
tab. 4. f. 3.

Agathis. Latr. *Bracon purgator*. Fab. Piez. p. 104.

Habite en France.

[Museau très-incliné.]

Agathis nominateur. *Agathis nominator*.

A. luteus, *nigro-maculatus*; *alis fuscis*: *lunula alba*.

Ichneumon nominator. Fab. p. 155.

Bracon nominator. Fab. Piez. p. 104. Latr.

Vipio. Latr. hist. des crust., etc. 13. p. 176.

Panz. fasc. 79. f. 10.

Habite en France. Tarrière très-longue.

Agathis urinateur. *Agathis urinator*.

A. niger; *thorace anticè rufo*; *abdomine rufo*: *maculis dorsalibus nigris*; *alis fuscis*.

Ichneumon urinator. Fab. Panz. fasc. 76. t. 12.

Bracon urinator. Fab. Piez. p. 109.

Habite en Allemagne; dans les bois.

SIGALPHE. (Sigalphus.)

Antennes sétacées, multiarticulées. Mandibules arquées, bidentées au sommet. Palpes maxillaires à six articles.

Tête transverse. Abdomen ovale, arrondi au sommet, n'offrant que trois segmens dorsaux, ou qu'un seul. Tarrière courte, cachée.

Antennæ setaceæ, multiarticulatæ. Mandibulæ arcuatæ. Palpi maxillares articulis sex.

Caput transversum. Abdomen ovale, apice rotundato, subsessile : segmentis dorsalibus tribus, aut unico. Terebra brevis, abscondita.

OBSERVATIONS.

Les *sigalphes* tiennent à nos cryptures par leur tarrière; mais ils sont très-singuliers en ce que leur abdomen n'offre pas plus de trois segmens dorsaux, et quelquefois n'en montre qu'un seul. Le nombre des articles de leurs palpes maxillaires, sert aussi à les distinguer. Leur abdomen est voûté en dessous.

ESPÈCES.

1. Sigalphe arroseur. *Sigalphus irrorator*. Latr.

S. ater; alis anticis apice nigris; puncto albo; abdomine clavato : apice macula villosa aured.

Cryptus irrorator. Fab. Piez. p. 88.

• Degeer, mém. sur les ins. 1. pl. 36. f. 12—13.

Melneumon. Geoff. 2. p. 837. n.º 36.

Habite l'Europe australe.

2. Sigalphe oculé. *Sigalphus oculator*. Latr.

S. ater; abdominis basi utrinque puncto flavo; thorace postice bidentato.

Ichneumon oculator. Fab. p. 169. Picz. p. 68.

Panz. fasc. 72. t. 3.

Habite en Europe. Commun aux environs de Paris.

ALYSIE. (Alysia.)

Antennes filiformes, submoniliformes, longues, multarticulées. Mandibules grandes, écartées, larges et tridentées à leur extrémité. Palpes maxillaires à six articles.

Tête transverse, large. Abdomen en massue, rétréci au pédicule vers sa base. Tarrière courte, peu saillante.

Antennæ filiformes, submoniliformes, longæ, multarticulatæ. Mandibulæ magnæ, intervallo dissitæ, ad apicem latæ et tridentatæ. Palpi maxillares articularis sex.

Caput transversum, latum. Abdomen clavatum, in pediculum versus basim attenuatum. Terebra brevis, mbrerserta.

OBSERVATIONS.

Il paraît que les *alysies* sont les seules ichneumonides qui aient les mandibules tridentées au sommet. Elles ont les palpes maxillaires à six articles comme les sigalphes. M. Latreille, qui n'en indique qu'une espèce, dit qu'elle dépose ses œufs sur les excréments humains.

ESPECE.

Alysie stercoraire. *Alysia stercoraria*. Latr.

Ichneumon manducator. Panz. fasc. 72 t. 4.

Cryptus manducator. Fab. Picz. p. 87.

Habite aux environs de Paris, et en Allemagne.

LES ÉVANIALES.

Antennes filiformes, de douze à quinze articles domén inséré sur le dos du corselet, ou au-dessus de son extrémité postérieure. Les quatre ailes nées.

Les *évaniales* sont des insectes à larves carnassières pupophages. Ces insectes se rapprochent beaucoup des ichneumonides par leurs habitudes et souvent par leur aspect. Ils en sont distingués par la singulière insertion de l'abdomen sur le dos du corselet, ou au moins au-dessus de son extrémité postérieure, près de l'échancrure. Son pédicule est long, plus ou moins recourbé ; l'abdomen n'est point caréné en dessous. Les *évaniales* d'ailleurs sont distinguées des ichneumonides, parce que leurs antennes ont moins de vingt articles. Ces insectes ont les ailes courtes, et les pattes postérieures longues. Je ne les partage qu'en deux genres : savoir, *évania* et *stenoévania*.

ÉVANIE. (Evania.)

Antennes filiformes, de treize articles, rapprochées à leur base. Quatre palpes inégaux, subsétacés. Mandibules trigones, subdentées.

Tête transverse ; corps court ; abdomen très-comprimé, attaché à un pédicule arqué, qui s'insère sur le dos du corselet. Tarrière courte ; pattes postérieures fort longues.

*tennæ filiformes, tredecim articulatæ, ad insertum approximatæ. Palpi quatuor inæquales, sub-
i. Mandibulæ trigonæ, subdentatæ.*

*ut transversum; corpus breve; abdomen brevis-
i, compressum, pediculo arcuato supra thora-
insertum. Terebra brevissima; pedes postici præ-*

OBSERVATIONS.

Evaniæ sont des insectes très-singuliers à cause de la
se de leur abdomen et de la situation particulière du
de qui le soutient. Elles ont la tête verticale, trans-
le corps court; l'abdomen subtriangulaire ou ovoïde,
imé, très-petit, et comme suspendu à un filet ar-
nséré au-dessus du métathorax. Ces insectes ont les
ourtes. On n'en connaît encore que les espèces sui-

ESPÈCES.

vanie lisse. *Evania lævigata*. Ol.

E. atra; thorace scabro; capite lævi. Oliv. dict. n.º 2.

Sphex appendigaster. Brown. jam. t. 44. f. 6.

Habite en Amérique.

vanie appendigastre. *Evania appendigaster*.

E. atra, thorace capiteque scabris; alis nigro-venosis punctu-
toque marginali nigro. Oliv. dict. n.º 1.

Sphex appendigaster. Lin.

Panz. fasc. 62. t. 12.

Habite l'Italie, la France australe.

vanie naine. *Evania minuta*. Ol.

E. atra; alis albis, basi tantum nigro-venosis. Oliv. dicti-
n.º 4.

Habite aux environs de Paris.

F Œ N E. (Fœnus.)

Antennes filiformes , droites , de treize ou quatorze articles. Quatre palpes filiformes. Mandibules dentées.

Tête, soit sessile, soit élevée sur un cou. Abdomen allongé, à pédicule court, s'insérant au-dessus de l'extrémité postérieure du corselet. Tarrière saillante. Les pattes postérieures fort longues, à jambes renflées en massue.

Antennæ filiformes , rectæ , tredecim aut quatuordecim articulatae. Palpi quatuor filiformes. Mandibulæ dentatae.

Caput vel sessile , vel collo elevatum. Abdomen elongatum ; pediculo brevi supra thoracis extremitatem posticam inserto. Pedes postici longi ; tibiis clavatis.

O B S E R V A T I O N S.

Les *fœnes*, comme les évanes, doivent être séparées des ichneumonides, puisque leurs antennes ont moins de vingt articles. D'ailleurs les unes et les autres ont le pédicule de leur abdomen inséré au-dessus de l'extrémité postérieure du corselet. Dans les *fœnes*, ce pédicule s'insère plus bas que l'écusson, et dans les évanes, il paraît s'insérer plus haut encore. Mais ce qui distingue plus fortement nos *fœnes*, c'est leur abdomen qui est fort allongé, soit linéaire, soit en massue. Ici, nous réunissons le genre *fœne* et le genre *pélécine* de M. Latreille.

E S P È C E S.

1. *Fœne jaculateur. Fœnus jaculator. Latr.*

F. niger ; abdomine falcato , medio rufo ; tibiis posticis clavatis , basi apiceque albis.

Ichneumon jaculator. Lin. Fab. p. 177. Oliv. dict. n.º 149.

Ichneumon. Geoff. 2. p. 328. n.º 16.

Fænus jaculator. Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 13.
pl. 100. f. 4.

Panz. fasc. 96. tab. 16.

Habite en Europe.

2. Fœne polycérateur. *Fænus polycerator*.

F. ater; abdomine lineari-longissimo; tibiis posticis clavatis. F.

Ichneumon polycerator. Fab. p. 162. Oliv. dict. n.º 113.

Pelecinus polycerator. Lat.

Drur. illust. of. ins. exot. 2. pl. 40. f. 4.

Habite en Amérique.

LES CINIPSAIRES.

Antennes brisées, de six à douze articles. L'abdomen caréné en dessous dans les femelles. La tarrière jamais roulée en spirale. Les deux ailes inférieures non veinées.

Les *cinipsaires* tiennent encore aux ichneumonides et aux évaniales, puisque ce sont des hyménoptères carnassiers et pupophages; qui vivent aux dépens des autres larves d'insectes. Elles détruisent un grand nombre de chenilles ou autres larves, ainsi que des chrysalides. Il y en a qui piquent les galles que des diplolèpes ont formées; et de l'œuf qu'elles y déposent, sort une larve qui dévore celle du diplolèpe.

Les antennes des *cinipsaires* sont coudées, et renflées en massue vers le bout. La tarrière des femelles est en général cachée sous l'abdomen, entre les deux lames étroites de sa carène, sans être roulée en spirale. Dans la plupart de ces insectes, les pattes postérieures sont propres à sauter. Voici comment elles se divisent.

(1) Pattes postérieures à jambes très-arquées.

Leucopsis.

Chalcide.

(2) Pattes postérieures à jambes droites.

(a) Segment antérieur du corselet grand, en carré transversal, ou en triangle tronqué à sa pointe,

Cinipa.

(b) Segment antérieur du corselet très-court, transverso-linéaire.

Cinipsile.

LEUCOPSIS. (Leucopsis.)

Antennes courtes, brisées, grossissant vers le bout, de douze à treize articles. Palpes filiformes. Mandibules cornées, bidentées. Lèvre inférieure allongée, échan-crée au sommet.

Tête transverse. Corselet fort élevé. Abdomen comprimé, arrondi à son extrémité, à pédicule très-court. Tarrière des femelles séuiforme, naissant entre deux lames de la base de l'abdomen, ensuite se recourbant sur son dos. Les pattes postérieures à cuisses renflées et à jambes arquées. Les ailes supérieures doublées longitudinalement.

Antennæ breves, fractæ, versùs apicem incre-satæ, duodecim aut tredecim articulatæ. Palpi filiformes. Mandibulæ corneæ, bidentatæ. Labium elongatum, apice emarginatum.

Caput transversum. Thorax valdè gibbus. Abdo-



SANS VERTÈBRES.

151

en compressum, apice rotundatum, quasi sessile : pediculo brevissimo. Feminarum terebra setiformis, : abdominis basi enascens, intra lamellas duas varinata, dein super abdomen recurva. Pedes postici moribus turgidis, tibusque arcuatis. Alæ superæ registrorsium duplicatæ.

OBSERVATIONS.

Les *leucopsis* tiennent aux chalcides par leurs rapports, ressemblent un peu aux guêpes par leurs couleurs et le dessin de leurs ailes. Ils sont très-distingués des chalcides par la longueur et la singulière situation de leur tarse, et ne peuvent se confondre avec les guêpes, leur tarse ou leur aiguillon étant toujours hors de l'abdomen recourbé sur le dos. Les larves de ces insectes sont carnassières. Il paraît que les femelles déposent leurs œufs dans les nids des apiaires.

ESPECES.

Leucopsis géant. *Leucopsis gigas*. F.

L. nigra, thorace punctis duobus dorsalibus, abdomine sessili : fasciis quatuor flavis. Fab. p. 245.

Leucopsis gigas. Coqueb. illust. ic. dec. 1. tab. 6. f. 1.

Panz. fasc. 84. t. 17 et 18.

Habite le midi de la France.

Leucopsis dorsigère. *Leucopsis dorsigera*.

L. abdomine sessili nigro : fasciis duabus punctoque flavis.

Fab. p. 246.

Leucopsis dorsigera. Oliv. dict. n.° 1.

Panz. fasc. 53. t. 15.

Habite le midi de la France, l'Italie. Il s'introduit dans les guépiciers pour y pondre.

3. *Leucopsis* intermédiaire. *Leucopsis intermedia*.

Illig.

L. nigra; *thoracis maculis duabus abdominisque fasciis quatuor inæqualibus flavis.**Leucopsis dorsigera*. Panz. fasc. 15. t. 17.

Habit le midi de la France. Ses rapports le rapprochent de l'espèce n.º 1.

Etc.

CHALCIDE. (Chalcis.)

Antennes courtes, brisées, de onze ou douze articles, à partie supérieure fusiforme. Palpes filiformes. Mandibules courtes, cornées.

Tête transverse, presque sessile. Corselet élevé. Abdomen subglobuleux, acuminé postérieurement, comprimé sur les côtés inférieurs, attaché par un pédicule court. Tarrière des femelles courte, cachée sous l'abdomen entre deux lames. Pattes postérieures à cuisses larges, comprimées, dentées, et à jambes arquées.

Antennæ breves, fractæ, undecim vel duodecim articulatæ; parte superiore fusiformi. Palpi filiformes. Mandibulæ breves, corneæ.

Cuput transversum, subsessile. Thorax elevatus. Abdomen subglobosum, posticè acuminatum, ad latera inferiora compressum, brevi pediculo thoraci affixum. Feminarum terebra brevis, abscondita, sub abdomine intrà lamellas duas vaginata. Pedes postici femoribus latis compressis dentatis; tibiis arcuatis.

OBSERVATIONS.

Les *chalcides* ont beaucoup de rapports avec les cinips; mais elles en sont distinguées par leurs antennes courtes,

riées, et par les jambes arquées de leurs pattes postérieures.

Ces hyménoptères ont le corps petit, souvent orné de couleurs brillantes; l'abdomen ovale ou presque globuleux, aminé en pointe; enfin, les cuisses des pattes postérieures grandes, renflées, comprimées, ce qui donne à ces insectes la faculté de sauter, presque aussi vivement que les puces. Leurs ailes ne sont point doublées longitudinalement comme celles des leucopsis, et leur tarrière est petite, cachée sous le ventre.

ESPÈCES.

Chalcide déginguendée. *Chalcis sispes*. F.

C. nigra; *abdominis petiolo femoribusque posticis incrassatis, flavis*. Fab. p. 194.

Sphex sispes. Lin. *Vespa*. Geoff. 2. p. 380. n.º 16.

Chalcis sispes. Oliv. dict. n.º 2. Panz. fasc. 77. t. 11.

Habite le midi de l'Europe. Rare aux environs de Paris.

Chalcide clavipède. *Chalcis clavipes*. F.

C. atra; *femoribus posticis incrassatis rufis*. Fab. p. 195.

Chalcis clavipes. Latr. Oliv. n.º 3. Panz. fasc. 78. t. 15.

Habite en Allemagne, et aux environs de Paris.

Chalcide naine. *Chalcis minuta*. F.

C. atra; *femoribus posticis incrassatis, apice flavis*. Fab. p. 195.

Vespa. Geoff. 2. p. 380. n.º 15.

Chalcis minuta. Latr. Oliv. n.º 5. Panz. fasc. 32. t. 6. *Ejusdem*.

Chalcis flavipes. Panz. Fasc. 78. t. 16. *Var. paulò major*.

Habite l'Allemagne, la France.

Chalcide annelée. *Chalcis annulata*. F.

C. atra; *femoribus posticis incrassatis dentatis: puncto apicis albo; tibtis albis nigro-annulatis*. Fab. p. 197.

Habite en Amérique. On la trouve dans les nids des polistes (guêpes cartonnières). Sa larve vit aux dépens de celles de ces guépiaires.

Etc.

CINIPS. (Cinips.)

Antennes courtes , brisées , de six à douze articles. Palpes presque en massue. Mandibules cornées , dentées au sommet.

Corps très-petit. Segment antérieur du corselet spacieux , en carré transverse , ou en triangle obtus ou tronqué au sommet. Abdomen subovale , caréné en dessous , attaché par un pédicule court. Tarrière saillante ou cachée entre les lames de la carène. Les jambes des pattes postérieures droites.

Antennæ breves , fractæ ; articulis sex ad duodecim. Palpi subclavati. Mandibulæ corneæ , apice dentatæ.

Corpus perparvum. Thoracis segmentum anticum spatiosum , transversè quadratum aut triangulare : apice obtuso vel truncato. Abdomen subovale , subius carinatum , pediculo brevi affixum. Terebra exserta vel intra lamellas carenæ occulta. Tibiæ pedum posteriorum rectæ.

OBSERVATIONS.

En réduisant les *cinips* aux cinipsaires à jambes postérieures droites , et dont le segment antérieur du corselet n'est pas un rebord étroit et transversal , nous réunissons aux cinips de M. Latreille quelques-uns de ses genres qui , quoique pouvant en être distingués , y tiennent assez par leurs rapports pour autoriser cette association. Ces genres sont ses eurytomes , ses eulophes , ses cléonymes , et ses spalangies.

Tous cinips sont de petits hyménoptères ornés de couleurs très-brillantes, parmi lesquels plusieurs ont la faculté de sauter. Ils ont des rapports avec les chalcides, les périopes et les diplolèpes. Ces petits insectes volent avec agilité, et presque tous vivent aux dépens d'une grande quantité de chenilles, et de chrysalides, que leurs larves carnassières détruisent. Aussi plusieurs de leurs espèces ont été fondues par les auteurs avec les ichneumons.

ESPECES.

Cinips du marceau. *Cinips capreæ*.

C. viridis, nitida; pedibus pallidis. Linn.

Cinips capreæ. Fab. p. 102. Oliv. dict. n.º 31.

Cinips. Geoff. 2. p. 302. n.º 18.

Habite dans toute l'Europe, sur le saule marceau.

Cinips du bédégar. *Cinips bedegaris*.

C. viridis, nitens; abdomine depresso aureo. Linn.

Cinips bedegaris. Latr. Oliv. dict. n.º 2.

Geoff. 2. p. 296. n.º 1.

Ichneumon bedegaris. Fab. p. 185.

Habite en Europe. Sa larve vit dans les galles chevelues du rosier sauvage en y dévorant l'hôte de ces galles.

Cinips pourpré. *Cinips purpurascens*.

C. viridi-æneus, nitidus; abdomine purpurascens: primo segmento æneo. Fab. suppl. p. 231. *Ichneumon*.

Diplolepis purpurascens. Fab. Piez.

Habite les environs de Paris.

Cinips dorsal. *Cinips dorsalis*.

C. pallidus; capitis thoracisque dorso viridi-æneo; alia maculâ transversâ fuscâ. F.

Ichneumon dorsalis. Fab. suppl. p. 231. *Diplolepis ejusd.*

Habite en France.

Cinips de la sarrète. *Cinips serratulæ*.

C. atra, nitida; antennis verticillato-pilosis. Fab. suppl. p. 214.

Eurytoma serratulæ. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 27.
Habite la France, l'Allemagne, etc.

6. *Cinips ramicorne*. *Cinips ramicornis*.

C. viridis; *antennis ramosis*.

Eulophus. Geoff. 2. p. 313. pl. 15. f. 3. Oliv. dict.

Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 28.

Ichneumon ramicornis. Fab. p. 190.

Habite l'Europe. Ce cinips est très-singulier par ses antennes; mais il paraît seul dans ce cas.

7. *Cinips déprimé*. *Cinips depressus*.

C. obscuré aureus; *abdomine depresso cyaneo*; *alīs apice fuscis*: *maculâ fasciâque posticâ albis*.

Ichneumon depressus. Fab. suppl. p. 231.

Cleonymus. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 29.

Habite aux environs de Paris.

Etc.

CINIPSILE. (Cinipsillum.)

Antennes filiformes, en général brisées, souvent épaissies vers leur sommet, de huit à douze articles. Quatre palpes. Mandibules variées.

Corps court. Corselet transverse, à segment antérieur très-court, ne formant qu'un rebord transverso-linéaire. Abdomen très-court, presque en cœur, ou spatuliforme, caréné en dessous. Tarrière courte, le plus souvent cachée entre les lames de la carène.

Antennæ filiformes, in universum fractæ, sæpè versùs apicem crassescentes; articulis octo ad duodecim. Palpi quatuor. Mandibulæ variæ.

Corpus breve. Thorax transversus: segmento antico brevissimo, transverso-lineari. Abdomen subcordatum aut spathuliforme, brevissimum. Terebræ brevis, sæpiùs intrâ lamellas crenæ occulta.

OBSERVATIONS.

ous cette dénomination nouvelle, que j'emploie pour éviter toute confusion, je réunis les périlampes, les ptéro-
es, les encyrtes, les platygastres, les scéliions, et les té-
de M. Latreille, c'est-à-dire, les cinipsaires à jambes
ites, qui ont le corselet plus large que long, et dont le
nent antérieur très-court, n'est qu'un rebord transver-
inéaire. En me bornant à ce cadre, je facilite l'étude,
nuire à la possibilité de rétablir les coupes infé-
ures.

ESPECES.

Cinipsile violet. *Cinipsillum violaceum*.

C. capite thoraceque obscure æneis; abdomine angulato, nitido, violaceo, apice emarginato.

Chalcis violacea. Panz. fasc. 88. t. 15.

Cinips violacea. Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 13, p. 222.

Perilampus. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 30.

Habite en Allemagne.

Cinipsile doré. *Cinipsillum chrysis*.

C. viridi-æneum, nitens; abdomine ovato aureo.

Ichneumon chrysis. Fab. p. 185.

Perilampus. Latr.

Habite la Barbarie, le midi de la France.

Cinipsile des galles. *Cinipsillum gallarum*.

C. fusco-æneum. abdomine nigro; tibiis pallidis.

Diplolepis gallarum. Fab. Piez. p. 141.

Pteromalus. Latr.

Habite...

Cinipsile grand écusson. *Cinipsillum infidum*.

C. nigrum, antennarum basi, fronte, pedibusque rufis; scutello flavo, apice bifurco.

Ichneumon infidus. Rossi. faun. etr. append. p. 111.

Encyrtus. Latr.

Habite l'Italie, la France.

5. *Cinipsile rugosule*. *Cinipsillum rugosulum*.

C. nigrum, *subtilissimè punctulato-rugosulum*; *abdomen* *suprà longistrorsumque striato*.

Scelio rugosulus. Latr. hist. des crust. et des ins. 13. p. 207 et gen. crust. et ins. 4. p. 32.

Habite aux environs de Paris.

6. *Cinipsile clavicorne*. *Cinipsillum clavicorne*.

C. nigrum, *nitidum*, *punctatum*; *abdomine suborbiculato*, *antennis brevibus*, *apice clavatis*.

Scelio. Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 12. f. 9 et 10. *mas*, et 11 et 12. *femina*.

Teleas clavicornis. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 33.

Habite aux environs de Paris.

LES DIPLOLÉPAIRES.

Antennes droites, de onze à seize articles. Abdomen caréné en dessous. La tarrière roulée en spirale sous l'abdomen.

M. Latreille donne le nom de *diplolepaires* à des hyménoptères très-voisins des cinipsaires par leurs rapports, mais qui ont les antennes droites, l'abdomen toujours caréné en dessous, et la tarrière des femelles roulée en spirale, au moins dans sa base, et cachée sous l'abdomen entre deux lames.

Les diplolepaires doivent effectivement être distinguées des cinipsaires; car ce sont des insectes phytiphages, c'est-à-dire, qui ne se nourrissent que de matières végétales. Les larves de la plupart sont *gallicoles*, et habitent dans ces excroissances végétales et singulières,

connues sous le nom de *noix de galle*. En effet, les cellules de ces insectes ayant piqué différentes parties des végétaux pour y introduire leurs œufs, elles ont occasionné dans ces parties une extravasation des sucs de la plante, et par suite ces monstruosité appelées *Galles* dont je viens de parler. Ce sont donc les diptolépaires qui donnent lieu à la formation des *galles*, non les cinips qu'on en voit quelquefois sortir ; ces derniers n'ayant introduit leur œuf dans la galle déjà existante, que pour que la jeune larve carnassière s'y nourrisse aux dépens de celle du diptolèpe.

Comme dans les cinipsaires, les ailes inférieures des diptolépaires sont sans nervures distinctes. Je ne divise cette petite famille qu'en deux genres, de la manière suivante :

- (1) Antennes de onze à douze articles. Abdomen attaché au corselet par un pédicule allongé.

Eucharis.

- (2) Antennes de treize articles au moins. Abdomen attaché au corselet par un pédicule très-court.

Diptolèpe.

E U C H A R I S. (Eucharis.)

Antennes épaisses, moniliformes, droites, à onze ou douze articles. Palpes très-petits. Mandibules allongées, pointues, inermes.

Corselet convexe, se terminant par un écusson simple ou fourchu. Abdomen ovale, subtrigone, attaché au corselet par un pédicule allongé.

Antennae crassae, moniliformes, rectae: articuli undecim vel duodecim. Palpi minimi. Mandibulae elongatae, acutae, inermes.

Thorax convexus, posticè scutello simplici vacuato terminatus. Abdomen breviter ovatum, subrotundum, pedunculo praelongo thoraci affixum.

OBSERVATIONS.

Les *eucharis* diffèrent éminemment des diplolèpes long-pédicule de leur abdomen, et même par leurs antennes qui n'ont que douze articles. Ces insectes semblent ten-
core aux cinipsaires par leurs couleurs brillantes et m-
ques; mais ils ont les antennes droites, non brisées. C-
tennes sont courtes. L'abdomen est court, ovale-tri-
comprimé sur les côtés inférieurs, ce qui le rend caré
dessous.

ESPECES.

1. *Eucharis* relevée. *Eucharis ascendens.*

E. aenea; abdomine petiolato conico ascendente.

Cinips ascendens. Fab panz. fasc. 88. t. 10.

Eucharis ascendens. Latr.

Habite en Allemagne.

2. *Eucharis* fourchue. *Eucharis furcata.* Fab.

E. atra; scutello spinis duabus incurvis porrectis; mine ascendente. Fab.

Ichneumon cyniformis. Ross. faun. étr. mant. 2. t. 6.

Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 21.

Habite... l'Amérique méridionale.

DIPLOLÈPE. (*Diplolepis.*)

Antennes filiformes, droites, de treize à seize arti-



SANS VERTÈBRES.

161

re palpes inégaux. Mandibules courtes, souvent
es.

orselet en général gibbeux, se terminant postérieu-
nt en écusson. Abdomen ovale ou subcordiforme,
u petit, comprimé ad moins sur les côtés inférieurs,
é en dessous et attaché par un pédicule très-court.
ère presque capillaire, roulée en spirale, et ca-
sous l'abdomen entre deux lames.

*tennae filiformes, rectae, tredecim ad sexdecim
latæ. Palpi quatuor inæquales. Mandibulae
s, sæpè denticulatæ.*

*orax in universum gibbosus; posticè in scutel-
terminans. Abdomen ovatum vel subcordiforme,
lum, ad latera infera præsertim compressum,
carinatum, thoraci pediculo brevissimo af-
s. Terebra subcapillaris, in spiram convoluta,
abdomen intra lamellas duas abscondita.*

OBSERVATIONS.

diptolèpes sont en général de très-petits hyméno-
qui ressemblent beaucoup aux cinips et aux chalcides;
eurs antennes ne sont point brisées ou coudées; leur
e, toujours cachée sous le ventre, est inférieurement
en spirale; et d'ailleurs les larves de ces insectes ne
oint carnassières; elles sont souvent victimes de celles
ipsaires qui les dévorent.

ffroy paraît être le premier qui ait distingué les di-
es; Linné et Fabricius en faisaient des cinips. La plu-
onnent lieu aux galles ou noix de galles connues,
u'aux *bedegars*.

vais citer quelques espèces, parmi lesquelles les deux
Tome IV

dernières, la *figite* et surtout l'*ibalie* de M. Latreille, s'éloignent un peu des autres.

ESPÈCES.

1. Diplolèpe de la galle à teinture. *Diplolepis galls tinctoriæ*. Oliv.

D. testaceus, abdomine supra fusco nitido. Oliv. dict. n.º 5.

Voyage dans l'empire ottoman, 1. p. 252. pl. 14 et 15.

Habite dans le Levant, sur un chêne. Il donne lieu aux galls du commerce. Ces galls sont grosses, rondes, tuberculeuses, et se forment sur les jeunes rameaux du chêne, et non sur les feuilles ni sur leur pétiole.

2. Diplolèpe du chêne tauzin. *Diplolepis quercus tojæ*.

D. griseus; abdomine ferrugineo nigido.

Cinips quercus tojæ. Fab. p. 102. Coqueb. illustr. ic. dec. 1. pl. 1. f. 9.

Bosc. journal d'hist. nat. 2. p. 154. pl. 32. f. 1—3.

Habite en France, dans la galle du chêne tauzin.

3. Diplolèpe des feuilles du chêne. *Diplolepis quercus folii*. Oliv.

D. fuscus; alis albis: puncto marginali nigro. Oliv. dict. n.º 3.

Diplolepis. Geoff. 2. p. 309. n.º 1. pl. 15. f. 2.

Cinips quercus folii. Lin. Fab. p. 101. Panz. fasc. 88. t. 11.

Habite en Europe, dans la galle ronde et lisse des feuilles du chêne.

4. Diplolèpe du rosier. *Diplolepis rosæ*. Oliv.

D. niger; abdomine ferrugineo posticè nigro; pedibus ferrugineis.

Diplolepis rosæ. Oliv. dict. n.º 1. Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 207.

Diplolepis. Geoff. 2. p. 310. n.º 2.

Cinips rosæ. Lin. Fab. p. 100.

Habite en Europe, dans le bedegar du rosier sauvage.

Diplolepè du lierre terrestre. *Diplolepis glechomæ*.

D. ater, glaber, nitidus; antennis pedibusque rubellis.

Cinips glechomæ. Lin. Fab. p. 101. Oliv.

Diplolepis glechomæ. Latr. hist. nat. des crust. etc. 13. p. 207.

Cinips. Geoff. 2. p. 303. n.º 20.

Habite en Europe, dans la galle ronde du lierre terrestre.

Diplolepè longicorne. *Diplolepis bedegaris fungosi*.

D. fusco-ferrugineus; oculis nigris; antennis longitudine corporis.

Diplolepis. Geoff. 2. p. 311. n.º 3.

Diplolepis bedegaris. Oliv. dict. n.º 2.

Habite aux environs de Paris. Sa larve vit dans la galle fongueuse et lisse du rosier.

Diplolepè figite. *Diplolepis figites*.

D. ater, nitidus; thoracis dorso lineis longitudinalibus impressis; alis albis; tibiis tarsisque fusco-rufis.

Figites scutellaris. Latr. gen. crust. et ins. vol. 1. t. 12. f. 4—5. et vol. 4. p. 19.

Habite la France, etc.

Diplolepè ibalie. *Diplolepis ibalia*.

D. ater; abdomine compresso culiriforme ferrugineo; pedibus nigris.

Ophion cutellator. Fab. Panz. fasc. 72. t. 6.

Ibalia cutellator. Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 17.

Habite la France méridionale.

LES ÉRUCAIRES.

Abdomen tout-à-fait sessile, tenant au corselet par toute sa largeur. Larves connues pédifères.

Les érucaires constituent pour moi une famille particulière, circonscrite par le caractère que je viens d'énoncer. Ce sont en effet les seuls hyménoptères connus, dont les larves observées soient pédifères. Comme beaucoup de ces larves offrent une sorte de ressemblance

avec les chenilles, ou larves de lépidoptères, j'ai donné le nom d'*érucaires* aux insectes de cette famille. Ces insectes sont phytophages, ont l'abdomen sessile, et la tarrière composée de trois ou quatre pièces, dont la moyenne ou les deux intérieures sont dentelées. Ils sont en quelque sorte des porte-scie.

Dans notre distribution des ordres des insectes, distinguant les suceurs des broyeurs, les hyménoptères commencent nécessairement la division de ces derniers, et viennent après les lépidoptères qui terminent celle des suceurs. D'après l'ordre de cette distribution, j'aurais dû commencer les hyménoptères par la famille des *érucaires* qui semblent offrir une transition des lépidoptères aux autres hyménoptères. Pour cela, il fallait que la section des hyménoptères à tarrière fût la première, et que ceux à aiguillon formassent la seconde. Cette inversion aurait été beaucoup plus conforme à l'ordre de la nature. Voici la distribution des *érucaires* ou fausses-chenilles.

DIVISION DES ÉRUCAIRES.

§. *Tarrière de trois pièces : les deux latérales servant de fourreau à la troisième qui est interne, filiforme, soit saillante avec son fourreau, soit roulée en spirale avec lui, et cachée sous l'abdomen dans une coulisse. — Larves connues n'ayant que six pattes.* [Érucaires urocérates.]

Urocère.

Oryase.

§§. *Tarrière de quatre pièces, dont deux externes servent de fourreau, et deux internes sont dentelées en scie.* [Les érucaires tenthrédines.]

* Labre non saillant. Il est très-petit ou nul. Larves connues n'ayant que six pattes.

(1) Tarrière saillante. Tête portée sur un cou allongé.

Xiphidrie.

(2) Tarrière non saillante. Point de cou allongé portant la tête.

Pamphilie.

** Labre saillant. Larves connues ayant dix-huit à vingt-deux pattes.

(1) Antennes de neuf articles ou davantage.

Tenthrède.

(2) Antennes ayant moins de neuf articles.

(a) Antennes de cinq à sept articles, terminées en bouton ou en massue ovoïde.

Clavellaire.

(b) Antennes de trois articles, dont le dernier est fort long.

Hylotome.

UROCÈRE. (Sirex.)

Antennes filiformes ou sétacées, de treize à vingt-cinq articles. Les palpes labiaux plus longs que les maxillaires, épaissis vers leur sommet. Mandibules cornées, épaisses à leur base, subdentées, à dent terminale plus longue.

Corps cylindrique. Abdomen sessile, allongé, sub-cylindrique, terminé dans les femelles par une pointe

avancée, comme une corne, et qui recouvre la tarrière. Celle-ci sétacée, renfermée entre deux valves.

Antennæ filiformes aut setaceæ ; articulis 13 ad 25. Palpi labiales maxillaribus longiores, versus apicem incrassati, Mandibulæ corneæ, ad basim incrassatæ, subdentatæ : dente terminali longiore.

Corpus cylindricum. Abdomen sessile, elongatum, subcylindricum, in feminis mucrone porrecto corniformi terminatum. Terebra setiformis, valvulis duabus inclusa, exserta, sub abdominis mucrone recepta.

OBSERVATIONS.

Les *urocères* constituent un genre établi par Geoffroy et admis depuis par les entomologistes, quoique plusieurs en aient changé le nom.

Ces insectes sont les plus grands de la famille. Ils ne sont pas sans rapports avec les ichneumons, quoique aucun d'eux ne soit carnassier; mais ils en ont de bien plus grands avec les tenthrèdes, dont ils diffèrent cependant par la composition de leur tarrière, et sa saillie hors de l'abdomen.

La tarrière des *urocères*, quoiqu'en partie cachée sous la gouttière de la corne qui termine l'abdomen de ces insectes, consiste en un aiguillon sétiforme, un peu long, légèrement dentelé, et renfermé entre deux valves filiformes.

Les femelles enfoncent leur tarrière sous l'écorce des arbres, et y déposent leurs œufs. Les larves qui en éclosent n'ont que six pattes, au moins dans la seule espèce où elles furent observées. Elles s'y nourrissent en rongant et perforant le bois.

E S P E C E S.

Urocère géant. *Sirex gigas*.

S. abdomine basi apiceque flavo ; corpore nigro.

Sirex gigas. Lin. Fab. fem. *Urocerus gigas*. Latr. gen., etc.
3. p. 243.

Urocerus. Geoff. 2. p. 265. pl. 14. f. 3.

Panz. fasc. 52. tab. 20.

Sirex mariscus. Fab. Piez. p. 51. mas. ex D. Latr.

Habite en Europe. Commun dans les bois de sapins, etc.

Urocère spectre. *Sirex spectrum*.

S. niger ; macula testacea pone singulos oculos ; pedibus flavescens.

Sirex spectrum. Lin. Fab. Piez. p. 50.

Panz. fasc. 52. tab. 16. *Urocerus spectrum*. Latr.

Habite en Europe.

Urocère bleu. *Sirex juvencus*.

S. caeruleus ; pedibus testaceis ; abdominis maris parte media rubra.

Sirex juvencus. Lin. Fab. *Urocerus juvencus*. Latr.

Sirex. Panz. fasc. 52. t. 17. fem. et t. 21. mas.

Habite la Suède, l'Allemagne, et dans le Jura.

Urocère cornes-brunes. *Sirex fuscicornis*.

S. fuscus , fulvo-maculatus ; abdomine nigro fasciis flavis annulato ; antennis nigris.

Sirex fuscicornis. Fab. Piez. p. 49.

Urocerus fuscicornis. Latr. Tremex ejusd.

Habite l'Allemagne, le midi de la France. Les antennes n'ont que treize à seize articles.

O R Y S S E. (Oryssus.)

Antennes filiformes, de dix ou onze articles, insérées près de la bouche. Quatre palpes inégaux, les maxillaires plus longs. Mandibules cornées, entières. Lèvre inférieure arrondie.

Abdomen sessile , mutique à son extrémité dans les deux sexes. Tarrière longue , filiforme , cachée et roulée en spirale dans l'intérieur de l'abdomen. Ailes couchées.

Antennæ filiformes , decim vel undecim articulatae , propè os insertæ. Palpi quatuor ; maxillaribus longioribus. Mandibulæ corneæ ; integræ. Labium rotundatum.

Abdomen sessile , in utroque sexu muticum. Feminarum terebra longa filiformis in abdomine abscondita , et spiraliter convoluta. Alæ incumbentes.

OBSERVATIONS.

Les *orysses* sont bien distingués des urocères , parce que l'abdomen des femelles n'est point mucroné à son extrémité , et que la tarrière est cachée dans son intérieur , étant trop longue pour s'y renfermer sans courbure. Lorsqu'elle entre en action , elle sort du ventre en dessous , s'élance entre deux valves situées sous le dernier segment de l'abdomen , traverse la coulisse qu'elles forment , et va s'enfoncer dans les fentes ou les crevasses des arbres pour y déposer les œufs.

ESPÈCES.

1. Orysse couronné. *Oryssus coronatus.*

O. niger ; capitis facie antica lineolis duabus albis ; abdomine rufo , basi apiceque infero nigris. Lat.

Oryssus coronatus. Fab. Latr. Encycl. p. 561. Panz. fasc. 52. t. 49.

Coqueb. ill. ic. dec. 1. tab. 5. f. 7.

Habite en Europe , dans les bois.

2. Orysse unicolor. *Oryssus unicolor. Latr.*

O. niger ; capite thorace abdominèque immaculatis. Latr. Encycl. p. 561.

Habite aux environs de Paris.

XIPHIDRIE. (Xiphidria.)

Antennes sétacées, quelquefois grossissant vers le bout, multiarticulées. Mandibules plus ou moins saillantes.

Tête portée sur un cou allongé. Corps allongé, sub-cylindrique ou linéaire. La tarrière des femelles saillante.

Antennæ setaceæ, versùs apicem interdum incrassatæ, multiarticulatæ. Mandibulæ plus minusve exsertæ.

Caput collo elongato elevatum. Corpus elongato-cylindricum aut lineare; feminarum oviductu exserto.

OBSERVATIONS.

Les *xiphidries* semblent avoisiner les urocères, à cause de leur corps allongé, terminé postérieurement par une pointe dans les femelles, leur tarrière étant saillante. En général, un cou allongé supporte leur tête, ce qui les rend remarquables. Peut-être que leurs larves n'ont que six pattes; mais il paraît qu'elles ne sont pas connues.

ESPECES.

1. Xiphidrie chameau. *Xiphidria camelus*. Latr.

X. abdomino atro: lateribus albo-maculatis; thorace lavi.

Sirex camelus. Lin. Fab. Panz. fasc. 52. t. 18.

Xiphidria camelus. Fab. Picz. p. 52.

Habite en Europe.

2. Xiphidrie dromadaire. *Xiphidria dromedarius*.

X. abdomino atro medio rufo: puncto utrinque albo; tibiis basi albis.

Xiphidria dromedarius. Latr. Fab. Piez. p. 53.

Panz. fasc. 85. t. 10. *Urocerus*.

Habite en Europe.

PAMPHILIE. (Pamphilus.)

Antennes sétacées, simples dans les deux sexes, à articles nombreux. Quatre palpes : les maxillaires plus longs, à six articles. Mandibules allongées, étroites, aiguës, arquées, ayant une dent au côté interne. Lèvre inférieure trifide.

Tête grande. Abdomen sessile, déprimé. Tarrière non saillante. Larves à six pattes.

Antennæ setaceæ, in utroque sexu simplices; articulis numerosis. Palpi quatuor: maxillaribus longioribus, sex articulatis. Mandibulæ elongatæ, angustæ, peracutæ, arcuatæ, interno latere unidentatæ. Labium trifidum.

Caput magnum. Abdomen sessile, depressum. Tarrebra non exserta. Larvæ pedibus sex.

OBSERVATIONS.

Les *pamphilies*, que M. Latreille range parmi ses tenthredines, parce qu'apparemment la tarrière des femelles est de quatre pièces, ont leurs larves à six pattes onguiculées, celles membraneuses manquant entièrement. Cette considération montre que le nombre de pattes, dans les larves, ne peut servir à distinguer les urocérates des tenthredines.

On distingue les *pamphilies* des *xiphidries*, particulièrement parce que les premières n'ont point un cou allongé, et que la tarrière de leurs femelles n'est point saillante.

Les pamphilies ressemblent assez aux tenthrèdes ; leur ps néanmoins est un peu plus court et plus large. Leurs ailes sont terminées postérieurement par deux espèces de nervures.

E S P È C E S.

Pamphilie tête-rouge. *Pamphilus erythrocephalus*. Latr.

P. antennis setaceis ; corpore caeruleo , capite rubro.

Tenthredo erythrocephala. Lin. Fab.

Panz. fasc. 7. tab. 9.

Latr. Encycl. n.º 1.

Habite le nord de l'Europe , sur le pin sauvage.

Pamphilie du bouleau. *Pamphilus betulæ*. Latr.

P. ruber ; thorace ano oculisque nigris ; alis posticis fuscis.

Tenthredo betulæ. Lin. Fab.

Cephalcia. Panz. fasc. 87. t. 18.

Lyda betulæ. Fab. Picz. p. 44.

Habite en Europe , sur le bouleau.

Pamphilie des prés. *Pamphilus pratensis*. Latr.

P. capite thoraceque nigro flavoque variis ; abdomine nigro ; margine ferrugineo.

Tenthredo pratensis. Fab. *Lyda pratensis* ejusd. Picz. p. 45.

Pamphilus pratensis. Latr. Encycl.

Habite en Allemagne.

Pamphilie des forêts. *Pamphilus sylvaticus*. Latr.

P. ater ; antennis flavidis ; capitulis maculis , scutello pedibusque flavis.

Tenthredo sylvatica. Lin. Fab. Panz. fasc. 65. t. 10.

Pamphilus sylvaticus. Latr. Encycl. n.º 19.

Habite en Europe , dans les bois.

Etc.

TENTHRÈDE. (Tenthredo.)

Antennes filiformes ou sétacées, quelquefois pectinées, de neuf à quatorze articles. Lèvre supérieure saillante. Palpes inégaux : les maxillaires plus longs. Mandibules cornées, saillantes, pointues, souvent dentées au côté interne. Lèvre inférieure trifide au sommet.

Corps oblong, subcylindrique. Abdomen sessile. Tarrière cachée sous l'abdomen, composée de deux lames dentelées, enfermées entre deux valves. Larve en forme de chenille, ayant six pattes onguiculées, et douze à seize pattes membraneuses.

Antennæ filiformes aut setaceæ, interdum pectinatæ, articulis novem ad quatuordecim. Labrum exsertum. Palpi inæquales : maxillaribus longioribus. Mandibulæ corneæ, exsertæ, acutæ, latere interno sæpè dentatæ. Labium apice trifidum.

Corpus oblongum, in multis cylindraceum. Abdomen sessile. Terebra bilamellata, denticulata, valvulis duabus vaginata, sub abdomine abscondita. Larva erucæformis, multipeda : pedibus 6 unguiculatis, et 12 ad 16 membranaceis.

OBSERVATIONS.

On a donné aux *tenthredes* le nom français de *mouches à scie*, à cause de la forme singulière de la tarrière de ces insectes. Elle est retirée et cachée dans l'inaction ; mais on peut la voir sortir en pressant le ventre de l'animal, et regardant dessous. Avec cette tarrière à lames dentelées, les *tenthredes* font des entailles, soit dans les feuilles ; soit



sur les tiges des plantes, et c'est dans ces entailles qu'elles posent leurs œufs.

Les insectes de ce genre sont nombreux en espèces. Ils sont très légers, et leurs ailes souvent semblent chiffonnées. On a donné à leurs larves le nom de *fausses chenilles*, parce qu'elles leur ressemblent par leurs pattes nombreuses. Elles en ont dix-huit à vingt-deux ; mais les chenilles n'en ont jamais plus de seize. *Panzer* a figuré un grand nombre de ces insectes.

ESPECES.

[*Antennes simples dans les deux sexes.*]

Tenthrede rustique. *Tenthredo rustica*.

T. nigra ; abdomine cingulis tribus flavis : posticis duobus interruptis.

Tenthredo rustica. Lin. Fab. Latr.

Panz. fasc. 64. t. 10.

Habite en Europe.

Tenthrede à trois bandes. *Tenthredo tricincta*.

T. nigra ; abdominis segmento primo, quarto, quinto, anoque flavis.

Tenthredo tricincta. Lat. Fab. Piez. p. 30.

Geoff. 2. p. 276. n.º 11. tab. 14. f. 5.

Habite en Europe. Commune aux environs de Paris.

Tenthrede de la scrophulaire. *Tenthredo scrophulariæ*.

T. abdomine cingulis quinque flavis : primo remoto.

Tenthredo scrophulariæ. Lin. Fab. Latr.

Geoff. 2. p. 277. n.º 13.

Panz. fasc. 100. t. 10. mas.

Habite en Europe, sur la scrophulaire.

Tenthrede parée. *Tenthredo togata*.

T. nigra ; abdomine cylindrico : segmento primo macula, quintoque toto rufis.

Tenthredo togata. Fab. Piez. p. 32.

Ces insectes ont le corps gros, volent lourdement et ressemblent à de grosses abeilles. Ce sont les frélons de Geoffroy.

Les larves des clavellaires ont vingt-deux pattes : six écailleuses, et seize membraneuses. Ces larves ont sur les côtés quelques ouvertures particulières par lesquelles elles seringuent une liqueur lorsqu'on les touche.

ESPÈCES.

1. Clavellaire fémorale. *Cimbex femorata*.

C. nigra ; *antennis luteis* ; *femoribus posticis maximis*.

Tenthredo femorata Lin. Fab.

Cimbex femorata. Latr. Oliv. dict. n.º 1. Fab. Piez. p. 15.

Crabro. Geoff. 2. p. 263. n.º 3. pl. 14. f. 4.

Habite en Europe, sur les saules.

2. Clavellaire jaune. *Cimbex lutea*.

C. antennis luteis ; *abdominis segmentis plerisque flavis*.

Tenthredo lutea. Lin.

Cimbex lutea. Latr. Oliv. n.º 3. Fab. Piez. p. 16.

Habite en Europe, sur le saule, l'aune, etc.

3. Clavellaire à épaulettes. *Cimbex axillaris*.

C. pubescens ; *antennis luteis* ; *thorace nigro* , *ad latera flavo-maculato* ; *abdominis segmentis flavis* , *intermediis nigris*.

Tenthredo axillaris. Panz. fasc. 84. t. 11.

Cimbex axillaris. Latr. *Crabro*. Geoff. 2. p. 262. n.º 1.

Habite en Europe.

4. Clavellaire marginée. *Cimbex marginata*.

C. antennis apice lutescentibus ; *corpore nigro* ; *abdominis segmentis posticis margine albis*.

Tenthredo marginata. Lin. Panz. fasc. 17. t. 14.

Cimbex marginata. Lat. Fab. Piez. p. 17.

Habite en Europe.

5. Clavellaire luisante. *Cimbex sericea*.

C. thorace atro , *abdomine viridi-caneo nitente*.

Tenthredo sericea. Panz. fasc. 17. t. 16—17.

Cimbex sericea. Lat. Fab. Piez. p. 18.

Habite en Europe, sur le bouleau.

Etc.

HYLOTOME. (*Hylotoma*.)

Antennes filiformes, s'épaississant un peu vers leur sommet; à trois articles, dont le dernier est fort long, quelquefois fourchu. Lèvre supérieure saillante, échancrée. Mandibules non dentées.

Port des tenthrèdes. Larve ayant 18—20 pattes.

Antennæ filiformes, versùs apicem subincrassatæ, articulatæ : articulo ultimo longissimo, interdum bifido. Labrum exsertum, emarginatum. Mandibulæ edentulæ.

Habitus tenthrædinum. Larva pedibus 18 ad 20.

OBSERVATIONS.

Ces *hylotomes* se confondraient aisément avec les tenthrèdes, si l'on négligeait la singulière particularité de ces antennes, savoir : de n'offrir que trois articles distincts, dont les deux premiers sont très-courts, et le troisième fort long. Dans les mâles, ces antennes sont ciliées, quelquefois fourchues.

ESPÈCES.

Hylotome du rosier. *Hylotoma rosæ*.

H. nigra; abdomine flavo; alarum anticarum costâ nigra.

Tenthredo rosæ. Lin. Fab. Geoff. 2. p. 274. n.º 4.

Panz. fasc. 49. tab. 15.

Hylotoma rosæ. Latr. Fab. Piez. p. 25.

Habite en Europe, sur les rosiers.

2. Hylotome sans nœuds. *Hylotoma enodis*.*H. atro-cærulescens* ; *alis apice vix coloratis*.*Tenthredo enodis*. Lin. Fab.

Panz. fasc. 49. tab. 13.

Hylotoma enodis. Latr. Fab. Piez. p. 23.

Habite en Europe, sur le saule.

3. Hylotome brûlé. *Hylotoma ustulata*.*H. corpore nigro* ; *abdomine cærulescente* ; *tibis pallidis*.*Tenthredo ustulata*. Lin. Fab.

Panz. fasc. 49. t. 12.

Hylotoma ustulata. Latr. Fab. Piez.

Habite en Europe.

4. Hylotome fourchu. *Hylotoma furcata*.*H. nigra* ; *abdomine rufo* ; *antennis masculorum furcatis*.*Tenthredo furcata*. Lin. Fab.

Coqueb. ill. ic. dec. 1. tab. 3. f. 4. Panz. fasc. 46. t. 1.

Hylotoma furcata. Latr. Fab. Piez. p. 22.

Habite en France.

Etc.

ORDRE SIXIÈME.

NÉVROPTÈRES.

Boûche munie de mandibules, de mâchoires et de lèvres. Quatre ailes nues, membraneuses, réticulées. Abdomen allongé, dépourvu d'aiguillon et de tarière. Larve hexapode.

Nous avons vu, dans les *hyménoptères*, des insectes partie rongeurs et en partie suceurs, c'est-à-dire munis de mandibules, et cependant possédant encore une espèce de suçoir composé de plusieurs lames allongées, subtubuleuses, sur le point de se changer, par raccourcissement, en véritables mâchoires et en lèvres inférieures. Maintenant nous allons voir, dans les *névroptères*, des insectes tous dépourvus de suçoir, dans l'état parfait, mais ayant des mâchoires et des mandibules plus ou moins fortes, plus ou moins apparentes, suivant les familles, et dont toutes les espèces sont carnassières et dévorent les petits insectes.

Les *névroptères* ont quatre ailes nues, membraneuses, transparentes, souvent colorées ou marquées de taches colorées, plus ou moins opaques, et chargées de nervures qui forment une espèce de réseau. Ces ailes sont étendues, et plus ou moins égales en grandeur, selon les genres et les espèces.

La bouche de ces insectes est armée de deux fortes mandibules et de deux mâchoires très-aiguës dans les cellules qui font la guerre aux autres insectes; mais ces

parties sont très-petites et presque imperceptibles dans les éphémères qui ne prennent aucune nourriture, et qui ne passent à leur dernier état que pour s'accoupler, se reproduire, et périr bientôt après. Ainsi, partout où nous observons que des organes sont peu employés nous les voyons sans développemens, ou n'en ayant toujours que de proportionnels à leur usage.

Grandes ou petites, selon leur emploi, les parties de la bouche, dans les névroptères, n'offrent plus de secours, mais des organes propres à broyer ou déchirer en sorte que ceux de ces insectes qui, dans l'état parfait, prennent encore des alimens, ne sont plus bornés à des liquides, mais rongent, déchirent et broient des matières solides.

La tête des névroptères est pourvue de deux antennes diversement conformées selon les genres : elles sont très-courtes et subulées dans les libellules et les éphémères, assez longues et sétacées dans les friganes, filiformes et terminées en massue ou par un bouton dans l'ascalaphe, etc.

Outre les deux grands yeux à facettes, on voit encore sur le vertex trois petits yeux lisses disposés en triangle.

L'abdomen des névroptères est allongé, quelquefois même d'une longueur extraordinaire, comme dans les libellules : il est composé de huit ou neuf anneaux distincts. Il n'est armé, ni d'un aiguillon, ni d'une tarière propre à déposer les œufs, comme dans les hyménoptères ; mais il est terminé par deux ou trois soies en forme de queue dans les éphémères, et par des espèces de crochets dans les mâles des libellules et des myrméléons.

Enfin, ici aucune larve n'est apode ; toutes ont six pattes dans leur partie antérieure, et dorénavant, c'est-à-dire, dans les orthoptères et les coléoptères, ce sera la même chose.

La métamorphose offre des diversités remarquables dans les névroptères : elle prouve ici, comme nous l'avons déjà vu ailleurs, que la considération qu'elle fournit ne peut être prise que généralement, comme pour limiter la classe, mais qu'on ne saurait l'employer pour instituer et caractériser les ordres ; car elle forcerait de dilacérer les plus naturels.

Ce sont les considérations générales de la bouche qui doivent, avant tout autre caractère, être employées à cet usage, puisque, dans aucun ordre, le caractère qu'elles fournissent ne souffre d'exception. Qu'importe qu'à raison de son usage, la langue des lépidoptères soit tantôt longue, tantôt courte ; c'est toujours une langue de deux pièces, roulée en spirale dans l'inaction. Il en est de même dans tous les ordres ; les diversités que présentent les parties de la bouche dans les familles et les genres d'un même ordre, ne contrarient jamais le caractère général que fournit la bouche dans la détermination de cet ordre.

Si quelque entomologiste voulait contester la prééminence que j'attache au caractère de la bouche sur celui de la métamorphose, qu'il explique pourquoi, dans un ordre aussi naturel que celui des névroptères, la nymphe de la libellule marche et mange, tandis que celle des myrméléons, dont l'insecte parfait ressemble tant à une libellule, se trouve enfermée dans une coque, et y reste immobile, sans manger ? pourquoi, dans la famille même des hémérobins, l'on voit des nymphes ac-

lives, d'autres qui ne le sont nullement ? pourquoi, dans les diptères, la nymphe des cousins est différente de la chrysalide des mouches ? etc.

Je le répète, quoique des différences dans la métamorphose puissent nous offrir des caractères utiles dans la détermination des genres, et quelquefois dans celle des familles, leur considération est d'une valeur très-inférieure à celle de la forme générale de la bouche.

Si, pour caractériser les ordres des insectes, l'on voulait donner aux organes du mouvement une prééminence sur les parties de la bouche, on rencontrerait les mêmes inconvéniens que ceux qui naissent des caractères de la métamorphose, et l'on s'exposerait aussi à dilacérer des ordres très-naturels.

En effet, dans les insectes, où les organes du mouvement sont les pattes et les ailes, on sait que dans une grande partie des hyménoptères les larves sont apodes, tandis que dans une autre partie elles sont pédifères : il faudrait donc rejeter dans un autre ordre les *tenthredines* et les *urocérates*.

Relativement aux ailes, on en attribue aux hémiptères deux cachées sous des élytres qui en sont distinctes. Si le caractère des hémiptères ne consistait que dans celui que je viens de citer, comment rapporter à cet ordre la plupart des cigales ; comment surtout y rapporter les *aphidiens* qui ont quatre ailes tout-à-fait membraneuses, transparentes et servant au vol ; bien plus encore, comment placer dans ce même ordre les *gallinsectes*, dont les femelles sont constamment aptères, et dont les mâles n'ont que deux ailes ? C'est donc le caractère de la bouche qui, partout, décide l'ordre, puisqu'il est toujours le même.

Les organes du mouvement sont si sujets à varier dans les insectes du même ordre, comme les pattes dans les millepieds, et les ailes dans différens ordres [puisqu'il n'est aucun qui n'offre des insectes ailés et des aptères stans], que la considération de ces organes ne peut être utile dans la détermination de l'ordre, que comme caractère auxiliaire, surtout lorsque deux ordres présentent, dans la bouche des insectes qu'ils comprennent, un peu de dissemblance. Ainsi, le caractère des ailes devient utile pour aider à distinguer les coléoptères des orthoptères. Mais la nature des parties de la bouche varie jamais dans aucun des ordres.

Geoffroy confondait les névroptères avec les hyménoptères, et formait, avec ces insectes, un ordre qu'il voulait *tétraptères à ailes nues* : voilà l'inconvénient de considérer qu'un caractère particulier. La bouche des hyménoptères est très-différente ; et leur abdomen, dans les femelles, soit d'une tarière, soit d'un aiguillon, les distingue essentiellement. Linné est le premier qui ait formé l'ordre des névroptères ; mais il ne l'a caractérisé qu'obscurément, parce qu'il ne donnait aucune attention au caractère de la bouche, et que n'en trouvant point de suffisant dans les ailes, il ne l'a séparé des hyménoptères que comme manquant de l'aiguillon. Il a-t-il placé cet ordre entre les hyménoptères et les diptères, quoique les rapports naturels ne puissent permettre un pareil rapprochement ; les lépidoptères ressemblant aux névroptères, ni par les parties de la bouche, ni par la métamorphose.

Fabricius, dans son ordre intitulé *synistrata* [vol. 3. p. 13], associe les névroptères avec la forbicine et la po-

dure, c'est-à-dire, avec des animaux qui ne se métamorphosent point, et qui conséquemment ne sont point des insectes.

La plupart des névroptères vivent dans l'eau et n'en sortent que dans l'état d'insecte parfait. Les autres vivent dans les champs et dans les bois, habitant sur les arbres pour faire la guerre aux pucerons, ou se cachant dans le sable pour tendre des pièges aux fourmis ou autres petits animaux incapables d'y échapper. Enfin, il y en a qui vivent à couvert dans des galeries qu'ils se sont creusées, soit dans la terre, soit dans l'intérieur des bois. Le plus grand nombre vit de proie; néanmoins il s'en trouve qui ne se nourrissent que de matières végétales.

Ceux qui vivent dans l'eau ont des organes qui ressemblent à des branchies externes, mais qui ne sont que des trachées saillantes.

Quoique les névroptères soient bien moins nombreux que les hyménoptères, les caractères des diverses races sont si variés, si irréguliers, et enjambent tellement les uns sur les autres, qu'il est assez difficile de démêler en quelque sorte, leurs familles particulières, et de les circonscrire en groupes détachés par des caractères bien éminens.

Effectivement, dans l'insecte parfait, aucun caractère extérieur ne distingue les névroptères dont les larves vivent dans l'eau, de ceux dont les larves habitent hors des eaux. On en trouve dans l'un et l'autre cas qui appartiennent à la même famille, et il en est ainsi à l'égard des névroptères dont les nymphes sont inactives et de ceux qui ont des nymphes agissantes.

Néanmoins, en donnant beaucoup d'attention aux rapports les mieux constatés, nous avons, en général, suivi M. Latreille, et partagé cet ordre de la manière suivante.

DIVISION DES NÉVROPTÈRES.

I.^{re} SECTION. — *Antennes beaucoup plus longues que la tête, de seize articles ou davantage.*

- (1) Ailes inférieures plissées ou doublées longitudinalement.

Les friganides.

- (2) Ailes inférieures non plissées ni doublées longitudinalement.

* Tête non prolongée antérieurement en un museau rostriforme.

- (a) Antennes filiformes, non épaissies vers le sommet, ni terminées en bouton.

- (+) Deux ou trois articles aux tarses.

Les termitines.

- (→→) Quatre ou cinq articles aux tarses.

Les hémérobins.

- (b) Antennes s'épaississant en massue vers le sommet, ou terminées en bouton. Six palpes.

Les myrméléonides.

** Tête prolongée antérieurement en museau rostriforme.

Les panorpates.

II.^e SECTION. — *Antennes de la longueur de la tête au plus, de trois à sept articles.*

- (1) Deux ou trois filets terminant l'abdomen; tarses à quatre articles; les mandibules non apparentes.

Les éphémères.

(2) Point de filets terminant l'abdomen ; larves à trois articles ; mandibules grandes et fortes .

Les libellulines.

LES FRIGANIDES.

Les antennes longues et sétacées. Les ailes inférieures plissées longitudinalement.

Les *friganides* dont il s'agit ici , embrassent les perliaires et les friganites de M. Latreille. Elles offrent des névroptères dont les larves sont aquatiques et vivent dans des fourreaux déplaçables.

Les insectes parfaits de cette famille ressemblent presque à des phalènes à ailes allongées. Leurs antennes sont longues, sétacées, à articles nombreux, ce qui force de les écarter des éphémères qui, sous d'autres rapports, semblent réellement s'en rapprocher. Néanmoins leurs ailes couchées, soit horizontalement, soit en toit, ont cela de particulier que les inférieures, plus larges que les supérieures, sont doublées ou plissées longitudinalement.

Les larves de ces insectes se construisent des fourreaux cylindriques et de toutes pièces, à la manière des teignes, et les transportent avec elles dans leurs déplacements.

Je partage les *friganides* en trois genres que je divise de la manière suivante.

[1] Mandibules nulles ou imperceptibles. Cinq articles aux tarses.

Frigane.

[2] Mandibules très-apparentes, Trois articles aux tarsi.

Némoure.

Perle.

FRIGANE. (Phryganea.)

Antennes longues, sétacées, multiarticulées. Mandibules nulles ou imperceptibles. Mâchoires soudées à la labiale inférieure. Quatre palpes : les maxillaires fort longs. Les labiales grandes, velues, en toit : les inférieures plissées. Abdomen nu. Larves aquatiques, vivant dans des fourreaux. Nymphes inactives. [Cinq articles aux tarsi.]

Antennæ longæ, setaceæ, multiarticulatæ. Mandibulæ nullæ aut inconspicuæ. Palpi quatuor : maxillares prælongis.

Labellæ magnæ, villosæ-hispidæ, deflexæ : inferis labiis plicatis. Abdomen nudum [ecaudatum]. Larvæ aquaticæ, in vaginis cylindricis habitantes. Pupæ scissæ. [Tarsi articulis quinque.]

OBSERVATIONS.

Les *friganes* sont intéressantes à connaître, surtout leur état de larve, parce qu'elles habitent alors des fourreaux à la manière des teignes ; ce qui les a fait nommer *teignes aquatiques* par Réaumur. Ces fourreaux sont faits de différentes matières, telles que des débris végétaux, de petites coquilles, de grains de sable que les larves qui les habitent, lient et agglutinent ensemble, sous la forme d'un petit cylindre irrégulier et

raboteux à l'extérieur ; et elles les traînent partout avec elles sans difficulté.

Les larves des friganes mangent les feuilles des plantes aquatiques , et quelquefois aussi elles dévorent les larves des libellules et des tipules.

La tête des friganes est petite , munie de deux gros yeux saillans , et d'antennes longues , sétacées.

Leurs ailes sont longues , couchées , inclinées en toit , ayant l'extrémité postérieure un peu relevée. Elles sont plus ou moins chargées de poils fins , très-courts ; ce qui a fait donner à ces insectes , par Réaumur , le nom de *mouches papilionacées*.

Toutes les friganes vivent dans l'eau , tant qu'elles sont sous la forme de larve. On les trouve dans les ruisseaux , les étangs , les marais. Lorsqu'elles sont parvenues à l'état d'insecte parfait , elles ne volent guères que le soir , après le coucher du soleil. On les prend alors facilement pour des phalènes. Les petites espèces volent le soir , par troupes nombreuses , au-dessus des eaux.

E S P E C E S.

1. Frigane réticulée. *Phryganea reticulata*.

Ph. nigra ; *alis subferrugineis atro-reticulatis*.

Phryganea reticulata. Lin. Fab. p. 75.

Panz. fasc. 71. f. 5.

Habite en Europe , aux lieux aquatiques.

2. Frigane grande. *Phryganea grandis*.

Ph. alis fusco-testaceis , cinereo-maculatis. Lin.

Phryganea grandis. Lin. Fab. p. 76. Oliv. dict. n.º 10.

Panz. fasc. 94. f. 18.

Habite en Europe. Commune.

3. Frigane striée. *Phryganea striata*.

Ph. alis testaceis , nervoso-striatis. Lin.

Phryganea striata. Lin. Fab. p. 75. Oliv. dict. n. 3.

Phryganea. Geoff. 2. p. 246. pl. 13. f. 5:

Habite en Europe, aux lieux aquatiques.

4. Frigane rhombifère. *Phryganea rhombica*.

Ph. alis griseis : macula laterali rhombica albâ.

Phryganea rhombica. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 14.

Phryganea. Geoff. 2. p. 246. n.º 2.

Roes. ins. 2. cl. 2. tab. 16. f. 1—7.

Etc.

NÉMOURE. (Nemoura.)

Antennes sétacées, un peu plus longues que le corps. Lèvre supérieure presque demi-circulaire, très-apparente. Mandibules cornées, larges, dentées. Palpes filiformes.

Tête un peu épaisse, subverticale. Point de soies articulées et caudiformes à l'anus. Tarses à trois articles.

Antennæ setaceæ, corpore paulò longiores. Labrum subsemi-circulare, valdè conspicuum. Mandibulæ corneæ, latæ, dentatæ. Palpi filiformes.

Caput crassiusculum, subverticale. Anus setis caudalibus articulatis nullis. Tarsi articulis tribus.

OBSERVATIONS.

Les *némoures* forment un genre établi par M. Latreille. Elles ne tiennent aux friganes que par le défaut de soies caudales à l'extrémité de l'abdomen. Geoffroy les a confondues parmi ses perles, et Fabricius parmi ses *semblis*; mais leur labre très-apparent et l'absence de filets à la queue, les en distinguent éminemment. Olivier en cite cinq espèces dans l'Encyclopédie.

LES TERMITINES.

Deux ou trois articles aux tarsi. Les ailes inférieures non plissées. Les antennes filiformes ou submoniliformes, à environ dix-huit articles.

Les *termitines* paraissent tenir un peu aux fourmis par l'aspect et même par les habitudes. Ce sont néanmoins de véritables névroptères qui se rapprochent des hémérobins par leurs rapports, et qui constituent une petite famille particulière.

Ils n'ont que deux ou trois articles aux tarsi, et parmi eux on ne trouve ni larves, ni nymphes aquatiques.

Tous les insectes de cette famille sont destructeurs, et causent des dégâts plus ou moins considérables, selon leurs espèces. Les uns vivent en société, et les autres solitairement. On n'y rapporte que les deux genres qui suivent.

TERMITE. (Termes.)

Antennes filiformes, submoniliformes, un peu courtes, insérées devant les yeux. Lèvre supérieure saillante, avancée au-dessus des mandibules, un peu voûtée. Mandibules cornées, dentées, saillantes. Quatre palpes filiformes. Lèvre inférieure quadrifide au sommet.

Tête courte, arrondie postérieurement. Corselet orbiculaire ou presque carré. Ailes fort longues, horizontales, caduques. Abdomen un peu court, sans soies caudales au bout. Tarsi à trois articles.

Insectes vivant en société, composée de trois sortes d'individus.



SANS VERTÈBRES.

193

næ filiformes, submoniliformes, breviusculæ, los insertæ. Labrum exsertum, suprâ manductum, subforficatum. Mandibulæ corneæ, exsertæ. Palpi quatuor filiformes. Lalice quadrifidum.

: breve, posticè rotundatum. Thorax orbiculatus. Alæ prælongæ, horizontales. Abdomen breviusculum : setis caudalibus arsi articulis tribus.

la societates ineuntia ; individuum tribus gene-

OBSERVATIONS.

ermite ont été placés parmi les insectes aptères, parce que la plupart se montrent presque toujours sans ailes. En effet, dans les espèces et les individus doivent en avoir, les ailes tombent facilement, qu'à l'approche de quelque danger, l'insecte s'achève à fuir par la course, soit lorsque l'insecte fait lui-même tomber ses ailes avec ses pattes pour en être moins remarqué. Ce genre néanmoins doit être rapporté à l'ordre des évroptères, dans lequel, en effet, plusieurs entomologistes l'ont placé, et ce qui est confirmé par ses analogies avec les psocs.

Les insectes, et surtout leurs larves, sont voraces, et destructeurs des bois, des meubles, des vêtements, des livres, et des collections d'histoire naturelle. Dans les pays étrangers, ces espèces font en peu de temps de si grands ravages qu'elles occasionnent des pertes énormes. On les y connaît sous le nom de *fourmis blanches*.

Presque toujours à couvert que les *termite* travaillent à construire leur habitation, les uns dans les bois, les autres dans les troncs des arbres même les plus vivants. *IV.*

élevés ou dans les vieux bois, les autres encore dans des nids monstrueux qu'ils élèvent sur la terre, à cinq ou six pieds de hauteur.

L'espèce la plus remarquable de ce genre est celle qui fait ces nids monstrueux ; c'est le *termes fatale* de Linné, espèce des Indes et de l'Afrique, dont M. *Smeathman*, voyageur anglais, nous a donné l'histoire et la description.

ESPECES.

1. Termite des Indes. *Termes fatale*.

T. supra fuscum ; thorace segmentis tribus ; alis pallidis : costâ testaceâ. Fab.

Termes fatale. Lin. Fab. p. 87.

Termes destructor. Degeer, ins. 7. p. 50. tab. 37. f. 1-3.

Termes arda. Forsk. descript. anim. p. 96. tab. 25. fig. A.

Habite les Indes orientales, l'Afrique, l'Amérique. Il est une calamité pour ceux qui sont voisins de son habitation.

2. Termite destructeur. *Termes destructor*.

T. supra testaceum ; capite atro ; antennis flavis. F.

Termes destructor. Fab. p. 89.

Termes arboreum. Acta anglie. 71. 1. 145. tab. 10. f. 7-9.

Habite dans les îles de l'Amérique méridionale. Nichant dans les arbres.

3. Termite lucifuge. *Termes lucifugum*. Latr.

T. nigrum , nitidum , pubescens ; alis fusciscenti-hyalinis ; tibiis tarsisque fusco-flavescentibus.

Termes lucifugum. Lat. hist. nat. des crust. et des ins. 13. p. 69. et gen. crust. et ins. 3. p. 206.

Ross faun. étr. mant. 2. tab. 5. fig. K.

Habite en Italie, à Bordeaux, dans des troncs d'arbres.

4. Termite morio. *Termes morio*. F.

T. atrum ; ore pedibusque testaceis ; alis nigris. F.

Termes morio. Fab. p. 90. Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 69.

Habite à Cayenne.

5. Termite du Cap. *Termes Capensis*. Latr.

T. supra fuscum, infra rufescens; alis subcinereis, pallidis, semi-hyalinis.

Termes capensis. Latr. hist. nat. des crust. etc. 13. p. 68.

Degeer, ins. 7. pl. 38. f. 1—2.

Habite au Cap de Bonne-Espérance, au Sénégal.

6. Termite flavicolle. *Termes flavicolle*. F.

T. obscurè piceum; thorace pedibusque flavis.

Termes flavicolle. Fab p. 91. Latr. hist. nat. p. 70.

Habite en Barbarie, en Provence.

Etc.

P S O C. (Psocus.)

Antennes sétacées, allongées, insérées devant les yeux. Lèvre supérieure membraneuse, presque carrée. Mandibules cornées, larges, échancrées, bidentées. Deux palpes maxillaires, quadriarticulés. Mâchoires comme doubles; l'une interne, cornée, linéaire, crénelée au sommet, le plus souvent saillante; l'autre externe, membraneuse, engainant l'intérieure. Lèvre inférieure membraneuse, large, ayant une écaille double de chaque côté.

Corps court, ovale-gibbeux. Tête grande, inclinée. Corselet bossu. Ailes grandes, transparentes, nerveuses, en toit. Deux articles aux tarses dans la plupart.

Antennæ setaceæ, elongatæ, antè oculos insertæ. Labrum membranaceum, subquadratum. Mandibulæ corneæ, latæ, emarginatæ - bidentatæ. Palpi duo maxillares, quadriarticulati. Maxillæ subgemellæ: alia interna, cornea, linearis, apice crenata, sæpius exserta; altera externa, membranacea, internam vaginans. Labium membranaceum, latum, lateribus squamâ duplici utrinque suffultum.

Corpus breve, ovato-gibbum. Caput magnum flexum. Thorax gibbus. Alæ magnæ, hyalinæ, vosæ, deflexæ. Tarsi articulis duobus, in p mis.

OBSERVATIONS.

Les *psocs*, parfaitement caractérisés par les observations de M. Latreille, et dont M. Coquebert a donné d'excellentes figures avec de bons détails, composent un genre qui a beaucoup de rapports avec les termites, et comprend des espèces que l'on plaçait parmi les hémerobes. Mais la nymphe des *psocs* est agissante; tandis que celle des hémerobes est inactive et enfermée dans une coque.

Ces insectes ont le corps court, la tête grosse, les yeux saillans, et leurs petits yeux lisses sont disposés en triangle. Leur corselet est partagé en deux segmens, dont le second est grand et bombé. Ils ont l'abdomen ovale-oblong. Les ailes fort grandes, particulièrement les supérieures.

La pièce extérieure des mâchoires me paraît devoir être considérée comme une *galette* qui fait l'office de gaine.

Les *psocs* courent et sautent; ils dévorent, comme les termites, les productions animales et végétales conservées dans les herbiers, les livres, etc. On les trouve sur les bords, les murs et dans les maisons. On en connaît plusieurs espèces aux environs de Paris.

ESPECES.

1. Psocé baponctué. *Psocus bipunctatus*.

P. flavo fuscoque variegatus; alis punctis duobus nigris. F. Hemerobius bipunctatus. Lin.

Psocus bipunctatus. Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 208.

Fab. suppl. p. 204. Coqueb. illust. ic. dec. 1. tab. 2. f. 3.

Peyl. n° 7. Geoff. 1. p. 488.

Psocus bipunctatus. Panz. fasc. 94. f. 21.

Habite en Europe, sur les arbres, les murs, etc.

Psoc à quatre points. *Psocus quadripunctatus.*

P. alis albis : basi punctis quatuor atris , apice fusco-radiatis. F.

Psocus quadripunctatus. Fab. suppl. p. 204.

Panz. fasc. 94. f. 22. Coqueb. ill. ic. dec. 1. pl. 2. f. 9.

Habite en Europe.

Psoc longicorne. *Psocus longicornis.*

P. niger ; ore pedibusque pallidis ; antennis longioribus fuscis. F.

Psocus longicornis. Fab. suppl. p. 203. Panz. fasc. 94. f. 19.

Habite en Allemagne.

Psoc à bandes. *Psocus fasciatus.*

P. alis albis : fasciis tribus atomisque numerosis nigris. F.

Psocus fasciatus. Fab. suppl. p. 203. Panz. fasc. 94. f. 20.

Habite en Allemagne.

Psoc pédiculaire. *Psocus pedicularius.* Latr.

P. fuscus ; abdomine pallido ; alis anticis subimmaculatis. Latr.

Psocus pedicularius. Latr. Coqueb. ill. ic. dec. 1. pl. 2. f. 1.

An psocus abdominalis ? Fab. n.º 9. p. 204 ?

Habite en Europe , dans les maisons.

Psoc pulsateur. *Psocus pulsatorius.*

P. apterus ; ore rubro ; oculis luteis. F.

Psocus pulsatorius. Fab. p. 204. Coqueb. ill. ic. dec. 1. t. 2. f. 14.

Terminus pulsatorium. Lin.

Le pou du bois. Geoff. 2. p. 602.

Habite en Europe. Commun dans les maisons , parmi les papiers , les herbiers , etc. Il ressemble à une mitte qui court avec célérité. Ses tarses ont trois articles.

Etc.

LES HÉMÉROBINS.

Quatre ou cinq articles aux tarses. Les antennes filiformes ou sétacées. Métamorphose variable.

Sous le nom d'hémérobins , je forme une coupe ou

même une famille que je crois assez naturelle, d'après les rapports qui se montrent entre les races qu'elle comprend, quoique ces races offrent, dans leurs habitudes et dans leurs métamorphoses, d'assez grandes diversités; et je réunis les hémérobins, les mégaloptères, et les raphidines de M. Latreille.

Parmi mes hémérobins, les uns, en effet, vivent hors de l'eau, tandis que les autres ont leurs larves et leurs nymphes aquatiques; et parmi eux encore, l'on trouve des nymphes inactives, et des nymphes agissantes.

Cependant, si l'on en excepte la mantispe et la raphidie, presque tous ces insectes ont été rapportés au genre de l'*hémerobe* par la plupart des entomologistes. Quoiqu'ils y tiennent par différens rapports, ils sont néanmoins très-distincts des hémerobes, et M. Latreille a eu raison de les en séparer.

Au reste, cette famille, plus nombreuse en genres qu'en espèces connues, me paraît devoir être divisée de la manière suivante.

DIVISION DES HÉMÉROBINS.

* *Segment antérieur du corselet très grand, formant sa principale partie.*

(1) Quatre articles aux tarses.

Raphidie.

(2) Cinq articles aux tarses.

(a) Pattes antérieures avancées, chélicères et ravisceuses.

Mantispe.

(b) Pattes semblables, les antérieures non ravisseuses.

(→) Ailes en toit.

Sialis.

(←→) Ailes horizontales.

■ Antennes simples.

Corydale.

■ Antennes pectinées.

Chauliode.

**** Segment antérieur du corselet très-court, ne formant qu'un rebord transverse.**

(a) Trois petits yeux lisses distincts.

Osmyle.

(b) Point de petits yeux lisses distincts.

Hémerobe.

R A P H I D I E. (Raphidia.)

Antennes filiformes, distantes, insérées entre les yeux, de la longueur du corselet. Lèvre supérieure saillante. Mandibules cornées, étroites, un peu saillantes, à pointe arquée. Palpes filiformes. Mâchoires courtes.

Corps allongé. Tête ovale, inclinée. Corselet cylindrique, à segment antérieur allongé en forme de cou. Ailes égales, réticulées, disposées en toit. Anus des mâles muni de deux crochets forts; celui des femelles terminé par une soie longue, un peu arquée. Quatre articles aux tarses. Nymphe active.

Antennæ filiformes, distantes, inter oculos insertæ, thoracis longitudine. Labrum exsertum. Mandi-

bulæ cornææ, angustæ, exsertiusculæ, acumine arcuato. Palpi filiformes. Maxillæ breves.

Corpus elongatum. Caput ovale, inflexum. Thorax cylindricus : segmento antico elongato colliformi. Alæ æquales, reticulatæ, deflexæ. Anus in masculis valide biunguiculatus ; in feminis setâ longâ subarcuatâ terminatus. Tarsi articulis quatuor. Pupa currens.

OBSERVATIONS.

Les *raphidies* sont les seuls insectes de cette famille qui aient quatre articles aux tarses. La partie antérieure de leur corselet, étant allongée comme un cou, les rend d'ailleurs assez remarquables. Elles ont trois petits yeux lisses ; et leurs ailes diaphanes, réticulées, sont disposées en toit. La larve de ces insectes ressemble à un petit serpent. On ne connaît encore que l'espèce suivante ; on la croit carnassière.

ESPECE.

1. *Raphidie serpentine. Raphidia ophiopsis.*

Raphidia ophiopsis. Linn. Fab. p. 99.

Degeer, ins. 2. p. 742. pl. 25. f. 4. Geoff. ins. 2. p. 233.

Panz. fasc. 50. f. 11.

Habite en Europe, sur les arbres.

MANTISPE. (Mantispa.)

Antennes filiformes, grenues, à peine plus longues que la tête. Les yeux saillans.

Partie antérieure du corselet allongée, cylindrique, en massue, portant antérieurement les pattes de devant.

ici avancées, ravisseuses, chélifères. Ailes en toit, ées. Nymphe active.

ennæ filiformes, submoniliformes, capite vix res. Oculi prominuli.

racis pars anterior elongata, cylindrico-clapedes anticos extremitate fulsiens. Hi porrecti, raptatorii. Alæ reticulatæ, deflexæ. Pupa

OBSERVATIONS.

insectes de ce genre sont très-singuliers par leurs antérieures avancées, et qui se terminent chacune en pince à deux ongles inégaux, dont le plus grand est sur l'autre. La première espèce que l'on connut d'abord prise pour une raphidie, à cause de l'allongement singulier de son corselet; mais ensuite on en fit une Elle en a effectivement l'aspect, malgré sa petite

on connaît maintenant plusieurs espèces : ce sont des névroptères qui avoisinent les raphidies par leurs rapports; leurs ailes ne sont point plissées comme les orthoptères.

ESPÈCES.

antispe villageoise. *Mantispa pagana*. Latr.

rufescenti-flavescens; thorace scabriusculo; alis costâ flavescente.

raphidia mantispa. Lin. Scop. carn. n.º 712.

antis pagana. Fab. Panz. fasc. 50. f. 9.

habite en France, en Allemagne, etc.

antispe verdâtre. *Mantispa minuta*.

r. thorace elongato teretiusculo; alis hyalinis: costâ virrescente.

Mantis minuta. Fab p. 24. Act. soc. Linn. 6. p. 32.

Stoll. mant. tab. 2. f. 7.

Habite l'Amérique méridionale.

3. Mantispe frêle. *Mantispa pusilla*.

M. thorace teretiusculo lævi; alis hyalinis : anticis costâ flavidulâ.

Mantis pusilla. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 1. f. 9.

Stoll. mant. t. 1. f. 3. Fab. p. 25. Act. soc. Linn. n.º 41.

Habite le Cap de Bonne-Espérance.

4. Mantispe naine. *Mantispa nana*.

M. thorace teretiusculo elongato; alis hyalinis fusco-venosis abdomine longioribus.

Mantis nana. Act. soc. Linn. n.º 42.

Stoll. mant. t. 4. f. 15.

Habite la côte de Coromandel.

SIALIS. (Sialis.)

Antennes sétacées, simples, à articles cylindrique
Mandibules petites, cornées. Palpes filiformes : les maxillaires plus longs. Petits yeux lisses nuls.

Ailes en toit. Le pénultième article des tarses bilobé
Larve aquatique. Nymphe inactive, dans une coque.

Antennæ setaceæ, simplices; articulis cylindricis
Mandibulæ parvæ, corneæ. Palpi filiformes : maxillaribus longioribus. Ocelli nulli.

Alæ deflexæ. Tarsi articulo penultimo bilobo. Larva aquatica. Pupa quiescens, folliculata.

OBSERVATIONS.

Par ses habitudes et sa métamorphose, le *sialis* semble étranger aux héminérobins; cependant il tient tellement à

hémérobes mêmes, par ses rapports, qu'avant M. Latreille, on ne l'en avait pas distingué. Mais c'est un insecte aquatique, et le segment antérieur de son corselet est plus grand que le second.

ESPECE.

1. *Sialis* noir. *Sialis niger*.

Latr. hist. nat. des crust., etc. t. 3. p. 44.

Hemerotus lutarius. Linn. *Smilis lutaria*. Fab. p. 74.

Hémérobe aquatique. Geoff. 2. p. 255.

Habite en Europe, aux lieux aquatiques.

CORYDALE. (*Corydalis*.)

Antennes sétacées, simples, à articles cylindriques très-courts. Mandibules très-grandes, avancées, ressemblant à des cornes.

Tête plus large que le corselet. Ailes couchées horizontalement.

Antennæ setaceæ, simplices; articulis cylindricis brevissimis. Mandibulæ maximæ, porrectæ, cornua referentes.

Caput thorace multò latius. Alæ horizontales.

OBSERVATIONS.

La *corydale* semble avoir des rapports avec la raphidie, quoique ses tarses soient à cinq articles, et Linné l'a effectivement rapportée à ce genre. Depuis, cependant, presque tous les entomologistes en firent une hémérobe.

ESPECE.

1. Corydale cornue. *Corydalis cornuta*. Lat.*Raphidia cornuta*. Lin.*Hemerobius cornutus*. Lin. Fab. p. 81. Oliv. Encyclop. n.° 1.

Degeer. Ins. 3. p. 559. pl. 27. f. 1.

Habite la Pensylvanie, la Caroline. Sa taille est un peu grande.

CHAULIODE. (Chauliodes.)

Antennes pectinées, un peu plus longues que le corselet. Mandibules courtes, dentées en leur partie interne. Les palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux.

Tête de la largeur du corselet. Ailes couchées horizontalement.

Antennæ pectinatæ, thorace paulò longiores. Mandibulæ breves, intus dentatæ. Palpi maxillares labialibus paulò longioribus.

Caput thoracis latitudine. Alæ horizontaliter incumbentes.

OBSERVATIONS.

La *chauliode* n'a point les mandibules avancées et très-saillantes, comme la *corydale*, et elle diffère des autres hémérobins par ses antennes pectinées. Cet insecte exotique fut encore confondu parmi les hémérobies. Il a trois petits yeux lisses sur la tête.

ESPECE.

1. Chauliode pectinicornie. *Chauliodes pectinicornis*.

Latr.

Hemerobius pectinicornis. Lin. Oliv. Encycl. n.° 2.



Hemerobius. Degeer , ins. 3. p. 562. pl. 27. f. 3.

Semblis pectinicornis. Fab p. 72.

Habite l'Amérique septentrionale. Elle est un peu moins grande que la corydale.

OSMYLE. (*Osmylus*.)

Antennes moniliformes, un peu plus courtes que le thorax. Lèvre supérieure saillante. Mandibules cornées, fortes. Lèvre inférieure transverse, un peu échancrée au milieu. Trois petits yeux lisses, frontaux, disposés en triangle.

Segment antérieur du corselet plus étroit et plus court que le postérieur.

Antennes moniliformes, corpore paulò breviores. Mandibulæ cornæ, fornicatæ. Labrum transversum, medio subemarginatum. Ocelli tres, frontales, in triangulum dispositi.

Thorax segmento antico postico angustiore et bre-

OBSERVATIONS.

L'osmyle étant un insecte aquatique, muni de petits yeux lisses, et à antennes grenues, méritait d'être séparé des hémerobes, comme l'a fait M. Latreille.

ESPECE.

Osmyle tacheté. *Osmylus maculatus*. Latr.

Hemerobius maculatus. Fab. p. 83. Oliv. Encycl. n.º 9.

Roer. ins. 3. tab. 21. f. 3.

Habite en France, en Allemagne, aux lieux aquatiques. Il a les ailes blanches, tachetées de noir, surtout les supérieures.

HÉMÉROBE. (Hemerobius.)

Antennes sétacées , un peu longues , à articles très nombreux , peu distincts. Lèvre supérieure un peu saillante. Mandibules cornées , arquées , petites. Quatre palpes inégaux. Petits yeux lisses nuls ou indistincts.

Tête inclinée. Les yeux saillans. Le corps allongé. L'abdomen arqué , nu. Ailes grandes , réticulées , toît. Larve bicornée. Nymphe inactive , dans une coque.

Antennæ setaceæ , longiusculæ ; articulis numerosissimis , parum distinctis. Labrum subexsertum. Mandibulæ corneæ , arcuatæ , parvulæ. Palpi quatuor inæquales. Ocelli nulli distincti.

Caput inflexum : oculis prominulis. Corpus oblongum ; abdomine arcuato nudo. Alæ magnæ , reticulatæ , deflexæ. Larva bicornis. Pupa folliculata quiescens.

OBSERVATIONS.

Les *hémérobés* ont des rapports évidens avec les *timidines* et les *myrméléonides*. Elles ont les ailes grandes , proportionnellement à leur corps , nues , et chargées de nervures qui forment un joli réseau. Ces ailes , surtout dans l'espèce , sont transparentes , minces et très-déliques.

Les larves des *hémérobés* intéressent par leurs habitudes. Elles ont le corps ovale , allongé , muni de six pattes : tête petite , armée en devant de deux mandibules en forme de cornes ou de pince , qui se joignent et se croisent. Elles paraissent creusées , percées au bout , et servent à l'insecte pour saisir et sucer sa proie. Ces larves dévorent les

ns et en détruisent une si considérable quantité que
 umur les a nommées *lions des pucerons*. Elles ont ,
 une les araignées , leur filière placée près de l'anus.
 es œufs des hémerobes , sont singuliers : ils sont blancs ,
 tenus chacun par un fil long , mince comme un che-
 . On les rencontre , ainsi disposés et ramassés , sur di-
 ses plantes.

es hémerobes ne sont point des insectes aquatiques ; on
 rencontre fréquemment dans les jardins ; elles volent
 rément et sont faciles à saisir. Quelques espèces répand-
 it une mauvaise odeur lorsqu'on les prend.

ESPECES.

Hémerobe perle. *Hemerobius perla*.

H. luteo-viridis ; *alis hyalinis* : *vasis viridibus*. L.

Hemerobius perla. Lin. Fab. p. 82. Oliv. dict. n.º 5.

Panz. fasc. 87. f. 13.

Geoff. 2. p. 253. n.º 1. pl. 13. f. 6. Lion des pucerons.

Habite en Europe , dans les jardins , les bois. Ses yeux sont
 dorés et brillans.

Hémerobe œil-d'or. *Hemerobius chrysops*.

H. viridi nigroque varius ; *alis hyalinis* : *venis viridibus* ,
lineolis nigris reticulatis. Lin.

Hemerobius chrysops. Lin. Fab. p. 82. Geoff. n.º 2.

Deger. ins. 2 p. 708. pl. 22. f. 1.

Habite en Europe , dans les bois.

Hémerobe blanche. *Hemerobius albus*.

H. albus ; *alis hyalinis* ; *oculis æneis*. L.

Hemerobius albus. Lin. Fab. p. 82.

Panz. fasc. 87. f. 14.

Habite en Europe.

Hémerobe phalénoïde. *Hemerobius phalaenoides*.

H. testaceus ; *alis basi mucronatis* , *posticè excisis*.

Hemerobius phalaenoides. Lin. Fab. p. 83.

Panz. fasc. 87. f. 15.

Habite en Europe , dans les bois.

Etc.

LES MYRMÉLÉONIDES.

Antennes s'épaississant en massue vers leur sommet ou terminées en bouton. Six palpes.

Les *myrméléonides* ou fourmilions étant les seuls vropptères qui aient six palpes , et les antennes en massue ou terminées en bouton , sont très-faciles à distinguer des autres. Ces insectes ne sont nullement aquatiques ; leurs larves mêmes n'habitent que les lieux secs et en général sablonneux. Ils ont leur nymphe inactive et dans une coque , au moins quant à ceux dont la nymphe est connue.

Dans l'état parfait , les myrméléonides sont d'assez beaux insectes ; les uns , à ailes grandes et fort longues ressemblent à des libellules ; et les autres , par leurs antennes terminées en bouton et leur corps veloutés , ont , en quelque sorte , l'aspect des papillons. Les premiers intéressent fort dans l'état de larve , à cause des habitudes particulières de cette dernière. Mais les larves des seconds ne paraissent pas encore être connues.

Les myrméléonides constituent une belle famille bien tranchée par ses caractères , et dans laquelle il paraît qu'il y a aussi beaucoup de particularités curieuses à découvrir relativement aux espèces et à leurs habitudes. Les ailes de ces insectes , quoique transparentes , sont souvent ornées de petites taches colorées remarquables. On ne distingue encore que deux genres dans cette famille.

MYRMÉLÉON. (Myrmeleon.)

Antennes grossissant insensiblement vers leur sommet, arquées, à peine plus longues que le corselet. Six palpes inégaux; les labiaux plus longs.

Abdomen très-long, linéaire, terminé par deux crochets dans les mâles. Ailes grandes, allongées, inégales, à nervures réticulées. Larve bicornue. Nymphe inactive dans une coque.

Antennæ gradatim versus apicem crassiores, arcuatae, thorace vix longiores. Palpi sex inæquales; labialibus longioribus.

Abdomen lineare, longissimum, in masculis apice biappendiculatum. Alæ maximæ, elongatæ, inæquales, hyalinæ, nervis reticulatæ. Larva bicornis. Pupa quiescens, folliculata.

OBSERVATIONS.

Les myrméléons ressemblent aux libellules par leur aspect, et tiennent aux hémerobes par leurs rapports. Mais leurs six palpes et leurs antennes courtes, presque en massue, les distinguent éminemment des hémerobes. Les caractères de leurs antennes, de leurs palpes, de leur larve, et de leur métamorphose, ne permettent pas de les confondre avec les libellulines.

Ces insectes ne sont point agiles, volent peu ou ne volent qu'à de médiocres distances. Leurs larves connues ne marchent que lentement et à reculons. Elles sont carnassières, munies de six pattes, ont le ventre gros et la tête petite; mais cette tête est armée de deux cornes mandibul-

lares, disposées en pince, qui servent à saisir la proie et à la sucer.

On connaît ces jolis entonnoirs de sable que forment ces larves, et au fond desquels elles se tiennent, pour attirer les insectes qui s'y laissent tomber. Ce sont, le plus souvent, des fourmis qu'elles saisissent, ce qui leur a fait donner le nom de *fourmilions*.

ESPÈCES.

1. Myrméléon fourmilion. *Myrmeleon formicarium*.

M. alis fusco-nubiosis : maculâ posticâ marginali albâ
Linn.

Myrmeleon formicarium. Lin. Fab. p. 93. Oliv. dict. n.º 11.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 30. pl. 98. f. 3.

Le fourmilion. Geoff. 2. p. 258. pl. 14. f. 1.

Panz. fasc. 95 f. 11.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux, abrités.

2. Myrméléon de Pise. *Myrmeleon pisanum*.

M. villosum ; alis griseis immaculatis : nervis nigro-punctatis ; thorace rubro cinereo , lined nigra duplici.

Myrmeleon pisanum. Rossi, Faun. etr. 2. p. 14. t. 9. f. 8.

Panz. fasc. 59. f. 4. Latr. gen. crust., etc. 3. p. 192.

Myrmeleon occitanicum. Oliv. dict. n.º 5.

Habite au midi de la France, en Italie, en Barbarie.

3. Myrméléon libelluloïde. *Myrmeleon libelluloides*.

M. alis griseis , fusco-maculatis ; corpore nigro flavoque maculato. L.

Myrmeleon libelluloides. Lin. Fab. p. 92. Oliv. dict. n.º 1.

Latr. gen. crust., etc. 3. p. 191.

Degeer, ins. 3. p. 565. pl. 27. f. 9.

Habite le Cap de Bonne-Espérance, l'Italie, le midi de la France, etc.

Etc.

ASCALAPHE. (*Ascalaphus*.)

Antennes longues, droites, filiformes, brusquement terminées par un bouton un peu comprimé. Six palpes courts, un peu inégaux, filiformes.

La tête et le corps velus. Abdomen oblong, terminé par deux crochets dans les mâles. Ailes nues, transparentes, réticulées.

Antennæ longæ, rectæ, filiformes, capitulo subcompresso abruptè terminatæ. Palpi sex breves, subinæquales, filiformes.

Caput corpusque hirsuta. Abdomen oblongum, in masculis apice biappendiculatum. Alæ nudæ, hyalinæ, nervis reticulatæ.

OBSERVATIONS.

Très-voisins des myrméléons par leurs rapports, les *ascalaphes* en sont bien distingués par leur aspect, leurs longues antennes, leur corps velu, ovale-oblong. Comme ils volent avec facilité, et que la plupart ont des taches colorées sur leurs ailes, ils ont une sorte de ressemblance avec les papillons. Ces insectes fréquentent les lieux secs et sablonneux. On n'a observé, ni leur larve, ni leur nymphe.

ESPÈCES.

1. Ascalaphe de Barbarie. *Ascalaphus Barbarus*.

A. alis reticulatis, flavescence-hyalinis : maculis duabus fuscis. F.

Myrmeleon barbarum. Lin.

Ascalaphus barbarus. Fab. p. 95.

Latr. gen. crust. ; etc. 3. p. 194.

Habite la Barbarie, l'Italie, le midi de la France.

2. Ascalaphe longicorne. *Ascalaphus longicornis*.

A. niger, flavo-maculatus; alis aureo-flavis.

Myrmeleon longicorne. Lin.

Ascalaphus italicus. Oliv. dict. n.º 2.

Ascalaphus longicornis. Latr. hist. nat. des crust. , etc. 3. p. 28.

Ascalaphus c. nigrum. Lat. gen. etc. 3. p. 194.

Habite le midi de la France.

3. Ascalaphe italique. *Ascalaphus italicus*.

A. alis anticis hyalinis : maculâ duplici baseos flavâ ; posticis flavis , basi atris.

Ascalaphus italicus. Fab. p. 95. Panz. fasc. 3. f. 23.

Latr. hist. nat. des crust. , etc. 13. p. 27. pl. 97. bis. f. 3.

Habite l'Europe australe.

Etc.

LES PANORPATES. Latr.

Tête prolongée antérieurement en un museau rostriforme.

Les *panorpates* constituent une petite famille de névroptères carnassiers et terrestres , qui semblent avoisiner les myrméléonides, par leurs rapports, comme l'indiquent les némoptères, et qui sont remarquables par leur tête prolongée antérieurement en un museau rostriforme , au bout duquel ou sous l'extrémité duquel la bouche est située. Leurs ailes sont à-peu-près horizontales.

Ces insectes ont des antennes sétacées , multiarticulées , insérées entre les yeux. Leurs tarses sont à cinq articles. Celles de leurs nymphes que l'on connaît , sont agissantes. Je les divise ainsi.

[1] Six palpes. Ailes très-inégales.

Némoptère.

[2] Quatre palpes. Ailes égales , ou à-peu-près.

Panorpe.

Bittaque.

N É M O P T È R E. (Nemoptera.)

Antennes filiformes ou sétacées, non plus longues que le corps, à articles nombreux, très-courts. Prolongement rostriforme de la tête conique, non plus long qu'elle, soutenant les parties de la bouche. Six palpes : les maxillaires plus courts que les labiaux. Petits yeux lisses non distincts.

Abdomen allongé, subcylindrique. Ailes étendues, très-inégales : les supérieures presque ovales, réticulées, ayant une côte sublatérale ; les inférieures extrêmement longues, fort étroites, plus rétrécies encore vers leur base.

Antennæ filiformes vel setaceæ , corpore non longiores ; articulis numerosis , brevissimis. Capitis processus rostriformis conicus , non illo longior , oris partes fulciens. Palpi sex : maxillares labialibus breviores. Ocelli nulli distincti.

Abdomen elongatum , subcylindricum. Alæ extensæ , valdè inæquales : superæ subovatæ , reticulatæ , costâ sublaterali ; inferæ longissimæ , perangustæ , versus basim paulò magis angustiores.

OBSERVATIONS.

Quoique de la famille des panorpates, les *némoptères* tiennent encore aux myrméléonides, puisqu'elles ont pareillement six palpes. Elles en sont néanmoins très-distinguées par le museau conique de la partie antérieure de leur tête.

Les *némoptères* diffèrent singulièrement des autres panorpates, non-seulement par leurs palpes, et leur défaut de petits yeux lisses, mais en outre par l'extrême intégrité de leurs ailes. Ce sont, en effet, des insectes fort singuliers, ayant les ailes inférieures extrêmement longues, linéaires, presque filiformes, et qui ne paraissent guères servir au vol. M. Latreille, qui a établi leur genre, a donc été très-autorisé à les distinguer des panorpes. Il les a appelés *némoptères*, pour exprimer qu'ils ont des ailes filiformes.

Ces beaux insectes ont cinq articles aux tarses, et se trouvent dans l'Europe australe et dans le Levant. Ils volent assez mal, ne se transportent que lentement et à de petites distances, en agitant péniblement leurs ailes. Outre l'espèce qui était déjà connue, *Olivier* en a rapporté, de son voyage au Levant, de nouvelles fort curieuses.

ESPECES.

1. *Némoptère* de Cos. *Nemoptera Coa.* Latr.

N. alis flavescens : punctis numerosis maculisque plurimis nigris. Oliv.

Panorpa coa. Linn. Fab. p. 98. Coqueb. illustr. ic. dec. 1. tab. 3. f. 3.

Nemoptera Coa. Lat. hist. nat. des crust. 13. p. 20. pl. 97. bis. f. 2.

Nemoptera Coa. Oliv. dict. n.º 1.

Habite les îles de l'Archipel, la Morée, l'Espagne.

2. *Némoptère sinuée.* *Nemoptera sinuata.* Oliv.

N. alis flavis : punctis fasciisque quatuor sinuatis nigris. Oliv.

Nemoptera sinuata. Oliv. dict. n.º 2.

Habite la Troade, dans la plaine où fut située l'ancienne ville de Troie.

3. Némoptère à balancier. *Nemoptera halterata*. Oliv.

N. alis hyalinis; lined costali flavescence. Oliv.

Panorpa halterata. Forsk. descr. anim. p. 97. tab. 25. fig. E.

Nemoptera halterata. Oliv. dict. n.º 3.

Habite l'Egypte, aux environs d'Alexandrie.

4. Némoptère étendue. *Nemoptera extensa*. Oliv.

N. alis hyalinis, immaculatis; posticis biextensis, apice nigris. Oliv.

Panorpa halterata. Fab. suppl. p. 208.

Nemoptera extensa. Oliv. dict. n.º 4.

Habite près de Bagdad, dans le Levant.

5. Némoptère pâle. *Nemoptera pallida*. Oliv.

N. pallide flava; alis hyalinis, immaculatis; posticis linearibus albis: fasciâ fuscâ. Oliv.

Nemoptera pallida. Oliv. n.º 5.

Habite le désert, au nord-ouest de Bagdad.

6. Némoptère blanche. *Nemoptera alba*. Oliv.

N. alba, immaculata; alis posticis setaceis. Oliv.

Nemoptera alba. Oliv. dict. n.º 6.

Habite à Bagdad. On la trouve le soir dans les maisons; elle est fort petite.

P A N O R P E. (Panorpa.)

Antennes filiformes-sétacées, à peine de la longueur du corps. Palpes filiformes, presque égaux. Museau prolongé en bec au-dessus du labre. Mandibules bidentées au sommet. Mâchoires fourchues. Trois petits yeux lisses.

Abdomen terminé, dans les mâles, en queue articulée, à extrémité plus grosse et en pince. Ailes égales, couchées horizontalement.

Antennæ filiformi-setaceæ , corporis longitudinem vix æquantes. Palpi filiformes , subæquales. Processus rostriformis supra labrum productus. Mandibulæ apice bidentatæ. Maxillæ furcatæ. Ocelli tres.

Abdomen masculorum in caudam articulatam apice capituliformi chelatam terminatum. Alæ æquales, horizontaliter incumbentes.

OBSERVATIONS.

Les *panorpes* sont remarquables en ce que l'abdomen des mâles a ses trois derniers segmens imitant une queue articulée , presque semblable à celle d'un scorpion. Leurs ailes sont allongées , veinées en réseau , horizontales , à-peu-près égales , et plus longues que le corps. Leurs pattes sont peu allongées , et les tarses , qui ont cinq articles , sont terminés par deux crochets. On rencontre ces insectes dans les prairies , les lieux ombragés. Leurs larves sont inconnues,

ESPECES.

1. *Panorpe commune. Panorpa communis.*

P. alis hyalinis : venis maculisque transversis nigris. Oliv.

Panorpa communis. Lin. F. p. 97. Oliv. dict. n.º 1.

Panz. fasc. 50. f. 10. mas.

La mouche scorpion. Geoff. 2. p. 260. pl. 14. f. 2.

Habite en Europe , dans les haies , les bois.

2. *Panorpe fasciée. Panorpa fasciata.*

P. fusco-rufescens ; alis hyalinis : punctis fasciisque fascis. Oliv.

Panorpa fasciata. Fab. p. 98. Oliv. dict. n.º 3.

Habite la Caroline.

BITTAQUE. (Bittacus.)

Antennes capillaires, longues : à articles allongés, très-menus. Mandibules étroites, très-longues, pointues, non dentées. Trois petits yeux lisses.

Abdomen subcylindrique, à-peu-près semblable dans les deux sexes, non terminé dans le mâle par une queue articulée et recourbée. Ailes couchées horizontalement. Pattes très-longues. Un seul crochet aux tarses.

Antennæ capillares, longæ : articulis elongatis tenuissimis. Mandibulæ angustæ, longissimæ, acutæ ; dentibus nullis. Ocelli tres.

Abdomen cylindræum, in utroque sexu subsimile, in mare, caudæ articulatæ recurvæ, non terminatum. Alæ horizontaliter incumbentes. Pedes prælongi. Tarsi ungue unico.

OBSERVATIONS.

Les *bittagues* sont sans doute très-voisins des *panorpes* par leurs rapports ; mais, outre que leur bouche offre plusieurs particularités distinctives, les mâles n'ont point l'abdomen terminé en queue de scorpion, et les tarses sont terminés par un seul crochet.

ESPEC E.

1. Bittaque tipulaire. *Bittacus tipularius*. Latr.

B. alis immaculatis ; abdomine falcato ; pedibus longissimis.

Panorpa tipularia. Fab. p. 98.

Bittacus tipularius. Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 20.

Vill. entom. 3. tab. 7. f. 41.

Habite le midi de la France.

Nota. M. Latreille regarde le *panorpa scorio* de Fabricius, comme une autre espèce de ce genre, malgré l'observation du célèbre entomologiste de Kiel, sur la queue du mâle.

DEUXIÈME SECTION.

Antennes de trois à sept articles. — Larves aquatiques; nymphes agissantes.

On rapporte à cette section, les névroptères dont les antennes sont courtes, subulées, et n'ont que trois à sept articles. Ce sont des insectes aquatiques, dont les larves, en général, ont, sur les côtés de l'abdomen, des houppes de filets tubuleux et respiratoires, qui ressemblent à des branchies. Ces larves sont carnassières.

[1] Deux ou trois filets à l'abdomen. Point de mandibules apparentes.

Les éphémères.

[2] Point de filets à l'abdomen. Mandibules grandes et très-apparentes.

Les libellulines.

ÉPHÉMÈRE. (Ephemera.)

Antennes menues, plus courtes que la tête, triarticulées. Bouche fort petite, membraneuse, à parties peu

stinctes. Point de mandibules apparentes. Quatre palps très-courts. Trois petits yeux lisses.

Corps allongé, très-mou. Ailes horizontales ou droites, transparentes, réticulées : les inférieures plus petites, quelquefois presque nulles. Abdomen terminé par deux ou trois soies très-longues. Quatre articles aux antennes.

Antennæ tenues, capite breviores, triarticulatæ. Palpi perparvum, membranaceum : partibus mollitiei vix discernendis. Mandibulæ nullæ conspicuæ. Palpi quatuor brevissimi. Ocelli tres.

Corpus elongatum, mollissimum. Alæ horizontales et erectæ, hyalinæ, reticulatæ : inferioribus minoribus, quandoque subnullis. Abdomen setis duabus tribusve longissimis terminatum. Tarsi articulis quatuor.

OBSERVATIONS.

Sous le rapport de l'habitation, et sous celui des mandibules nulles ou non apparentes, les *éphémères* semblent se rapprocher des friganes ; mais leurs antennes sont fort différentes, et plusieurs autres particularités remarquables distinguent ces insectes des friganides.

Les *éphémères* doivent leur nom à la courte durée de leur vie, lorsqu'elles sont parvenues à l'état d'insecte parfait. Il y en a qui meurent le jour même où elles se sont transformées ; il s'en trouve qui ne voient jamais le soleil, car elles éclosent après son coucher, et meurent avant l'aurore ; enfin la vie de quelques-unes, dans leur dernier état n'est que de deux ou trois heures. Cependant quelques espèces vivent encore trois ou quatre jours. Il est aisé de sentir que si les parties de la bouche des *éphémères* sont petites, sans

développement et peu distinctes, cela tient évidemment à ce que ces insectes, parvenus à l'état parfait, ne prennent plus de nourriture, ne s'occupent alors que de leur régénération, et périssent bientôt après.

Swammerdam et Blanckaert parlent d'une grande espèce d'éphémère qui sort des rivières de la Hollande, en été, pendant trois ou quatre jours, dans une abondance surprenante, et qui ne vit que quelques heures. Réaumur a donné l'histoire d'éphémères plus petites, qui vivent dans les rivières de la Seine et de la Marne, et qui, pendant quelques jours d'été, s'élèvent en l'air par milliards vers le coucher du soleil, et meurent deux ou trois heures après.

Les éphémères, avant d'être parvenues à l'état d'insecte ailé, ont vécu long-temps dans l'eau, sous celui de larve et de nymphe, et c'est sous ces deux formes qu'elles prennent tout leur accroissement. Elles vivent alors, les unes une année entière, et les autres pendant deux ou même trois années. Ces larves respirent par des houppes en forme de branchies, placées sur les côtés de l'abdomen. Quant aux nymphes, elles sont agissantes et ressemblent beaucoup aux larves dont elles ne diffèrent que parce qu'elles ont les étuis qui renferment en raccourci leurs ailes.

Après leur métamorphose, ayant obtenu l'état d'insecte ailé, ayant même déjà fait usage de leurs ailes, les éphémères ont encore à se défaire d'une dépouille complète, en un mot, subissent une dernière mue; particularité qui est extraordinaire.

Ces insectes, dans leur état parfait, ont les deux pattes antérieures presque insérées sous la tête, un peu avancées, mais distantes et longues.

ESPÈCES.

1] *Quatre ailes distinctes. Queue à deux soies.*

Ephémère de Swammerdam. *Ephemera Swammerdiana*. Latr.

E. grandis, *flavo-rufescens*; abdomine supernè obscuro;
alis albidis : *neris eminentibus luteolis*.

Swammerd. bibl. nat. 2. tab. 13. f. 6—8.

Schoeff. ic. tab. 204. f. 3. Lat. hist. nat. des crust., etc. 13.
p. 98.

Habite en Hollande.

Ephémère longicaude. *Ephemera longicauda*. Oliv.

E. lutea; *capite nigro*; *alis fuscis*; *caudâ bisetâ corpore triplo longiori*.

Oliv. dict. n.º 6.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 98. n.º 8.

Habite les bords de la Meuse.

Ephémère bioculée, *Ephemera bioculata*.

E. caudâ bisetâ; *alis albis reticulatis*; *capite tuberculis duobus luteis*. L.

Ephemera bioculata. Lin. Fab. p. 70. Panz. fasc. 94. f. 17.

Geoff. 2. p. 239. n.º 5. pl. 13. f. 4.

Habite en Europe, sur le bord des eaux.

[2] *Quatre ailes distinctes. Queue à trois soies.*

Ephémère commune. *Ephemera vulgata*.

E. caudâ trisetâ; *alis fusco-reticulatis maculatisque*; *corpore fusco*. Fab.

Ephemera vulgata. Lin. Fab. p. 68. Oliv. dict. n.º 1.

Panz. fasc. 94. f. 16. Degeer. ins. 2. p. 621. pl. 9. f. 13.

Habite en Europe.

[3] *Deux ailes seulement, apparentes.*

Ephémère diptère. *Ephemera diptera*.

E. caudâ bisetâ; *alis duabus* : *costâ marginali fusca*, *cine-reo-maculatâ*. Lin.

(b) Point de vésicule près du derrière de la tête. Les petits yeux lisses sur une ligne transverse.

Œshne.

(2) Tête transverse. Les yeux saillans, écartés à leur bord supérieur. Petits yeux lisses en triangle. Ailes relevées presque verticalement dans le repos.

Agrion.

LIBELLULE. (Libellula.)

Antennes courtes, filiformes-sétacées. Bouche presque masquée : les mandibules, les mâchoires et les palpes en partie recouverts par la lèvre inférieure voûtée qui les embrasse. Celle-ci à lame intermédiaire entière et petite.

Tête hémisphérique, ayant postérieurement un vésicule qui porte trois petits yeux lisses en triangle. Ailes horizontales. Abdomen le plus souvent déprimé, lancéolé, quelquefois en massue.

Antennæ breves, filiformi-subulatæ. Os veluti larvatum : mandibulis maxillis palpisque labio fornicato subopertis : id lamellâ intermediâ integrâ, parvâ.

Caput hemisphæricum ; vesiculâ posticâ ocellos in triangulum dispositos gerente. Alæ horizontales. Abdomen sæpiùs depressum, lanceolatum, quandoque subclavatum.

OBSERVATIONS.

Les libellules et les œshnes embrassent les plus fortes libellulines, celles qui sont les plus voisines-entr'elles par

eurs rapports. Les unes et les autres ont les ailes horizontales, et de grands yeux à réseau, presque contigus par leur bord supérieur ou postérieur. Mais les libellules ont, près du derrière de la tête, une vésicule portant les petits yeux lisses, qui peut servir à les distinguer des œshnes. Dans les cas embarrassans, on aura recours à l'examen de la lèvre inférieure, sa lame intermédiaire, dans les libellules, étant entière et plus petite que les latérales.

L'abdomen des libellules est grand, presque toujours déprimé, lancéolé, plus rarement en massue. Comme les espèces de ce genre sont nombreuses, nous n'en citerons ici que quelques-unes.

E S P E C E S.

1. Libellule quadrimaculée. *Libellula quadrimaculata*:

L. alis posterioribus basi omnibusque medio antico macula nigricante; abdomine depresso tomentoso. Fab.

Libellula quadrimaculata. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 1.

Panz. fasc. 88. f. 19.

Libellula. Geoff. 2. p. 224. n.º 6. La Française.

Habite en Europe.

2. Libellule bronzée. *Libellula ænea*.

L. alis hyalinis; thorace viridi æneo. Lin.

Libellula ænea. Lin. Fab. p. 381. Oliv. dict. n.º 15.

Panz. fasc. 88. f. 20.

Libellula. Geoff. 2. p. 226. n.º 10. L'Aminthe.

Habite en Europe.

3. Libellule déprimée. *Libellula depressa*.

L. alis omnibus basi nigricantibus; abdomine depresso lateribus flavicante. Fab.

Libellula depressa. Lin. Fab. p. 373. Oliv. dict. n.º 10.

Panz. fasc. 89. f. 22.

Libellula. Geoff. 2. p. 225. n.º 7. pl. 13. f. 1. L'Eléonore.

Habite en Europe. J'adopte l'opinion de M. Latreille relativement au synonyme de Geoffroy, quoique la figure citée de Panzer, présente, pour l'abdomen, des différences en coloration et en forme.

4. Libellule jaunâtre. *Libellula flaveola*.*L. alis basi luteis*. Lin.*Libellula flaveola*. Lin. Fab. p. 375.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 14.

Schœff. icon. tab. 4. f. 1.

Habite en Europe. Commune aux environs de Paris.

Etc.

O E S H N E. (O Eshna.)

Antennes courtes, filiformes-subulées. Bouche en partie masquée par la lèvre inférieure, comme dans les libellules. Lamme intermédiaire de la lèvre inférieure écharcée et aussi large que les latérales.

Tête grosse, hémisphérique : point de vessie distincte à son sommet postérieur. Petits yeux lisses en ligne transverse. Abdomen long, subcylindrique. Ailes horizontales.

Antennæ breves, filiformi-subulatæ. Os sublarvatum labio, ut in libellulis. Labii lamellâ intermediâ emarginatâ, latitudine laterales æquante.

Caput magnum, hemisphaericum : vesiculâ posticâ nullâ conspicuâ. Ocelli in lineam transversam dispositi. Abdomen elongato-cylindraceum. Alæ horizontales.

OBSERVATIONS.

Les *æshnæ* sont, en général, les plus grandes et surtout les plus fortes libellulines. On les distingue des libellules, parce qu'elles manquent de vésicule près du derrière de la tête; que leurs petits yeux lisses sont en ligne transverse, quoique un peu irrégulière, et parce que la lamme intermédiaire de



SANS VERTÈBRES.

227

La lèvre inférieure est échancrée, et au moins aussi large que les latérales. Celles-ci sont comme tronquées, dentées, etc. Leur abdomen, qui est fort long, est subcylindrique, et n'est point déprimé en dessus, ni lancéolé.

Les œshnes sont nombreuses en espèces; nous allons en citer trois seulement.

E S P È C E S.

œshne à tenailles. *œshna forcipata*.

œ. thorace nigro: characteribus variis flavescens; cauda unguiculatâ.

Libellula forcipata. Lin. Oliv. dict. n.º 37.

œshna forcipata. Fab. p. 383. Lat. hist. nat., etc. 13. pl. 97. bis. f. 1.

Panz. fasc. 88. f. 21.

Libellula. Geoff. 2. p. 228. n.º 13. La Caroline.

Habite en Europe. Commune.

œshne annelée. *œshna annulata*. Latr.

œ nigra; thoracis lateribus flavo-trifasciatis.

Lat. hist. nat. des crust., etc. 13. p. 6.

Harris, insect. angl. tab. 23. f. 3.

Habite le midi de la France et en Angleterre.

œshne grande. *œshna grandis*.

œ. thorace lineis quatuor flavis; corpore variegato. Fab.

Libellula grandis. Lin. Oliv. dict. n.º 38.

œshna grandis. Fab. p. 384. Lat. n.º 9.

Libellula. Geoff. 2. p. 227, n.º 12. Harris, ins. angl. t. 12.

Schoeff. icon. tab. 2. f. 4.

Habite en Europe.

Etc.

A G R I O N. (Agrion.)

Antennes très-courtes, subulées. Bouche masquée par la lèvre inférieure, dont la lame intermédiaire est profondément bifide.

Tête transverse, sans vésicule à son sommet. Les yeux écartés; les petits yeux lisses en triangle. Abdomen très-grêle, cylindrico-linéaire. Les ailes relevées presque verticalement dans le repos.

Antennæ brevissimæ, subulatæ. Os larvatum, labio suboccultatum; labii lamina intermedia profunde bifida.

Caput transversum, supernè non vesiculosum. Oculi remoti. Ocelli in triangulum dispositi. Abdomen gracillimum, cylindrico-lineare. Alæ in quiete erectæ.

OBSERVATIONS.

Les *agrions* présentent une coupe assez remarquable et bien distincte, parmi les libellulines. Leurs ailes allongées, subspatulées, ne sont point horizontales dans le repos, mais sont toujours plus ou moins relevées verticalement. Leur tête est transverse, subtrigone, beaucoup plus large que le corselet, et porte des yeux écartés, semi-globuleux. Enfin, leur abdomen est très-grêle et fort long. Ces insectes sont en général plus frêles, plus délicats que les autres libellulines.

ESPÈCES.

1. Agrion vierge, *Agrion virgo*.

A. alis erectis coloratis. Fab.

Libellula virgo. Lin. Oliv. *Agrion virgo.* Fab. p. 336.

Panz. fasc. 79. f. 17—18.

Libellula. Geoff. 2. p. 221. n.º 1. La Louise, et n.º 2. L'Ulrique.

Habite en Europe, et se trouve aux environs de Paris, ainsi que sa variété.

2. Agrion fillette. *Agrion puella*.*A. alis erectis hyalinis*. Fab.*Libellula puella* Lin. *Agrion puella*. Fab. Lat.(a) *Corpore cinereo cœruleoque alterno; alis puncto nigro*.*Libellula*, n.º 3. Geoff. L'Amélie.(b) *Corpore infra cœruleo-viridi, supra fuseo; thorace fasciis fuscis cœrulescentibusque alternis*. Geoff. n.º 4. La Dorothée.(c) *Corpore viridi pallide incarnato; thorace fasciis tribus longitudinalibus nigris*. Geoff. n.º 5. La Sophie.

Etc.

Habite en Europe; aux lieux aquatiques, et offre diverses variétés.

3. Agrion linéaire. *Agrion linearis*. Fab.*A. alis reticulatis; abdomine longissimo*. Fab. p. 388.*Libellula Lucretia*. Drury, Ins. 2. t. 48. f. 1.

Oliv. dict. n.º 44. Seba mus. 4. tab. 68. f. 1—2.

Habite dans les Indes. Cette espèce est dans la collection du Muséum. Son abdomen grêle et extrêmement long; la rend très-remarquable.

Etc.

ORDRE SEPTIÈME.

LES ORTHOPTÈRES.

Bouche munie de mandibules, de mâchoires, de levres et d'une galette recouvrant plus ou moins chaque mâchoire.

Deux élytres molles, presque membraneuses, à épiderme réticulaire, recouvrant deux ailes droites, plissées longitudinalement. Point d'écusson.

Larves conformées comme l'insecte parfait, mais n'ayant ni ailes, ni élytres. Nymphe active.

OBSERVATIONS.

Sous le rapport important des caractères de la bouche, les *orthoptères* tiennent presque également aux *névroptères* et aux *coléoptères*; car les parties de la bouche, dans les insectes de ces trois ordres, sont à très-peu-près les mêmes, sauf quelques particularités, et la diversité des développemens de ces parties, selon les races;

Mais, d'une part, les *orthoptères* se rapprochent plus des *coléoptères* que des *névroptères* par leurs ailes, puisqu'ils ont des élytres très-distinctes; et de l'autre part, ils tiennent de plus près aux *névroptères* qu'aux *coléoptères* par la métamorphose, puisque leur nymphe est active, marche et mange comme celle de beaucoup de *névroptères*, tandis que celle des *coléoptères* n'a aucune activité, ne marche et ne mange point. Les *orthoptères* doivent donc être placés entre les deux ordres d'insectes broyeureurs que je viens de citer.

Les entomologistes qui attachèrent beaucoup d'importance aux particularités de la métamorphose, trouvèrent de grands rapports entre les *orthoptères* et les *hémiptères*. Ils les virent dans la nymphe active des uns et des autres, et même dans les élytres demi-coriaces de ces insectes. Ils rapprochèrent donc ces deux ordres, et par-là, ils mêlèrent, dans leur distribution, les insectes uniquement broyeureurs avec ceux qui sont tout-à-fait suceurs; c'est-à-dire, les insectes dont les parties utiles de la bouche sont extrêmement différentes, et dont les habitudes le sont pareillement.

Or, j'ai montré, par la citation de faits bien connus, que la métamorphose variait dans les ordres les plus naturels, parce qu'elle dépend des habitudes principales de l'insecte; tandis que la nature des parties de la bouche ne varie nullement dans l'étendue de chaque ordre, et

qu'il n'y a d'autres variations dans ces parties, que celles qui tiennent au plus ou moins de développement de ces mêmes parties, selon leur plus ou moins d'emploi.

D'après ces considérations, la prééminence de valeur doit appartenir à la nature des parties de la bouche, et l'emporter sur la métamorphose; car celle-ci, qui n'a pu être employée que dans sa généralité pour caractériser la classe, ne saurait, dans ses particularités de détail, servir à la détermination des ordres. Si on l'employait, il faudrait dilacérer les plus naturels; il faudrait même rompre ou mutiler de véritables familles.

Dans une distribution des animaux où l'on procède du plus simple vers le plus composé, du plus imparfait vers le plus parfait, ayant prouvé la nécessité de commencer la classe des *insectes* par ceux qui ne sont que des suceurs, afin qu'ils avoisinassent les vers pareillement suceurs, et de terminer cette classe par les insectes uniquement *broyeurs*; il est évident que les *névroptères*, les *orthoptères* et les *coléoptères*, étant uniquement *broyeurs*, doivent constituer les trois derniers ordres de la classe.

La convenance de ces rangs assignés est d'autant plus grande que, dans une pareille distribution des animaux, l'on est forcé, par les caractères zootomiques, de placer les *arachnides* et les *crustacés* après les *insectes*; et l'on sait que dans, les animaux de ces deux classes, l'on trouve aussi des mandibules et des mâchoires qui agissent par des mouvemens latéraux et transverses, tout-à-fait analogues aux mouvemens des mandibules et des mâchoires des *insectes broyeurs*.

Certes, ce ne sont pas là des déterminations arbitraires; et je crois qu'il sera difficile de contester solidement ces principes.

Les *orthoptères* ont de si grands rapports avec les *coléoptères*, que Geoffroy ne les en a point séparés. Il en

fit une division de ses coléoptères , en les distinguant par leurs élytres molles et presque membraneuses.

Si Geoffroy eut tort de réunir les orthoptères aux coléoptères , puisqu'ils en sont essentiellement distincts , quoique voisins par leurs rapports , celui de Linné fut bien plus grand , en les confondant dans un même ordre avec les hémiptères. On voit les inconvéniens graves d'un défaut de coordination dans les caractères dont on peut faire usage pour juger des rapports.

Les ailes des coléoptères sont pliées transversalement , c'est-à-dire , repliées sur elles-mêmes ; tandis que , sauf la farficule , celles des orthoptères sont droites et simplement plissées dans leur longueur , à-peu-près comme un éventail. Ainsi , de part et d'autre , ce sont des ailes pliées ou plissées , cachées sous de véritables élytres ; et ces rapports des orthoptères avec les coléoptères sont encore à ajouter à ceux de la bouche.

L'aile des orthoptères est souvent entièrement cachée sous l'élytre ; mais lorsqu'elle la dépasse , elle prend presque toujours à son bord , la consistance de l'élytre même.

Ce fait prouve évidemment que des différences de circonstance , en ont opéré dans la consistance et l'emploi des ailes supérieures : en sorte qu'on peut dire que depuis les diptères , tous les insectes ont réellement quatre ailes ; les supérieures servant plus ou moins au vol , et étant plus ou moins altérées dans leur transparence et dans leur consistance , par les agens extérieurs qui ont plus d'action sur elles que sur les inférieures.

Ainsi , les orthoptères , que Degeer avait déjà distingués , furent , avec raison , considérés par *Olivier* , comme constituant un ordre particulier très-distinct , puisque ces insectes diffèrent des coléoptères par leurs ailes et leur larve agissante , et des névroptères par leurs élytres. *Olivier* leur assigna le nom d'*orthoptères* , mot composé qui signi-

es droites, par opposition avec les ailes des coléoptères qui sont pliées transversalement sur elles-mêmes dans l'inflexion.

Les insectes de cet ordre ont des antennes sétacées ou filiformes, quelquefois ensiformes, plus ou moins longues; grands yeux à réseau; deux ou trois petits yeux lisses la plupart.

La bouche offre une lèvre supérieure recouvrant les parties supérieures; deux mandibules fortes, dentées au côté interne; deux mâchoires aussi dentées, ne portant sur le dos un palpe à cinq articles, et une lèvre inférieure qui la recouvre plus ou moins; une proéminence labiale qui s'avance en forme de langue; enfin, une lèvre inférieure qui ferme la bouche inférieurement, et tient les deux palpes postérieurs ou labiaux qui n'ont que deux articles.

Le corselet de ces insectes est assez grand, quelquefois très étendu, et n'offre point d'écusson postérieur.

Les pattes, en général, sont épineuses, et, dans un grand nombre de ces insectes, les postérieures sont renflées, et servent à exécuter des sauts considérables. Là, ailleurs, on trouve des races ou des individus en lesquelles les ailes avortent constamment.

En général, les orthoptères sont phytophages, c'est-à-dire se nourrissent de végétaux. Quelques-uns néanmoins sont omnivores, mangent et gâtent nos provisions de toute nature qu'elles soient.

On n'admet que quatre familles parmi les orthoptères; et on les divise de la manière suivante :

DIVISION DES ORTHOPTÈRES.

(1) Ailes inclinées en toit.

Les locustaires.

(2) Ailes horizontales.

- (a) Abdomen simple, n'ayant point à son extrémité, dans les deux sexes, deux filets ou deux appendices particuliers.

Les mantides.

- (b) Abdomen ayant à son extrémité, dans les deux sexes, deux filets ou deux appendices particuliers.

* Corselet non aplati, arrondi sur les côtés, n'ayant point ses bords tranchans et débordans.

Les grillonides.

** Corselet aplati, à bords tranchans, débordant, soit seulement sur les côtés, soit même au-dessus de la tête.

Les coureurs.

PREMIÈRE SECTION.

Ailes en toit incliné.

LES LOCUSTAIRES.

Toutes les *locustaires* ont, dans le repos, les ailes couchées sur le corps, et disposées en toit incliné. Ce sont les seuls orthoptères connus qui soient dans ce cas;

ont les seuls qu'embrasse la première section d'ordre.

Ces insectes ne composent évidemment qu'une seule famille, car, quoique les sauterelles puissent être distinctes des autres locustaires, une conformation générale et à-peu-près semblable, dans tous ces individus, indique clairement leur parenté commune. Cette parenté même sentie de tout temps ; en sorte que les uns ont ainsi que les autres genres avoisinans, furent confondus avec les sauterelles par le vulgaire ; que l'observation des entomologistes vint apporter d'autres particularités distinctives, que les uns ont quatre articles aux tarsi, tandis que les autres locustaires n'en ont que trois.

Les locustaires sont herbivores, et, dans la plupart, les pattes postérieures sont fort longues et propres

à sauter. Cette famille comprend six genres ; parmi lesquels, les sauterelles et les criquets sont les plus nombreux en

Sauterelle.

Pneumore.

Criquet.

Xiphicère.

Truxale.

Achet.

SECTION DES LOCUSTAIRES.

Les sauterelles ont quatre articles aux tarsi. Les antennes sétacées, les pattes postérieures longues.

Sauterelle.

**** Trois articles aux tarsi. Les antennes filiformes ou ensiformes, courtes ou de longueur moyenne.**

(1) Antennes de seize articles ou davantage. Partie antérieure du sternum non crenée pour recevoir la bouche.

(a) Antennes filiformes, quelquefois terminées en boutons.

(+) Pattes postérieures plus courtes que le corps, non propres à sauter. L'abdomen vésiculeux.

Pneumore.

(+→) Pattes postérieures plus longues que le corps, et propres à sauter.

Criquet.

(b) Antennes aplaties ou comprimées, lancéolées, ensiformes.

(+) Tête courte, non prolongée supérieurement en pyramide.

Xiphicère.

(+→) Tête prolongée supérieurement en pyramide.

Truxale.

(2) Antennes de treize ou quatorze articles. Partie antérieure du sternum ayant une cavité qui reçoit la bouche.

Achet.

SAUTERELLE. (Locusta.)

[*Gryllus*. L.]

Antennes sétacées, très-longues, à articles nombreux, très-petits. Lèvre supérieure entière : l'inférieure subquadridriforme, ayant ses divisions intermédiaires très-petites.

Ailes en toit. Abdomen des femelles terminé par une

tarrière ensiforme. Pattes postérieures propres à sauter.

Antennæ setaceæ, longissimæ; articulis numerosis, minimis. Labrum integrum. Labium subquadrifidum : lacinis intermediis minimis.

Alæ flexæ. Feminarum abdomen terebræ ensiformi terminatum. Pedes postici magni, saltatorii.

OBSERVATIONS.

Les sauterelles ont beaucoup de rapports avec les criquets; mais elles ont quatre articles aux tarses, et leurs antennes sétacées très-longues, et la tarrière des femelles les en distinguent facilement.

Ces insectes sautent comme les criquets, à l'aide de leurs pattes postérieures, qui sont fortes et longues. Ils marchent lentement, et voient assez bien.

Les femelles déposent leurs œufs dans la terre, par le moyen de la tarrière qu'elles portent à l'extrémité de leur abdomen, tarrière qui ressemble à un sabre et qui est composée de deux lames.

Les sauterelles pondent un assez grand nombre d'œufs à-la-fois, et ces œufs sont réunis dans une membrane mince.

Les larves et les nymphes ressemblent à l'insecte parfait, sauf les parties dont elles manquent. Les premières n'ont ni ailes, ni étuis pour les contenir en raccourci; les deuxièmes ont quatre paquets ou espèces de boutons dans lesquels sont contenues les ailes non développées. Ces parties ne se développent que lorsque l'insecte a pris tout son accroissement.

Les sauterelles se trouvent fréquemment dans les prairies; elles sont voraces et mangent les herbes.

ESPECES.

1. Sauterelle à coutelas. *Locusta viridissima*.

L. viridis ; *elytris abdomine longioribus* ; *terebra ensiformi recta*.

Gryllus viridissimus. Linn. *Locusta viridissima*. Fab.
p. 41.

Panz. fasc. 89. tab. 18—19.

Locusta, n.º 2. Geoff. 1. p. 308. pl. 8. f. 3.

Habite en Europe. Très-commune.

2. Sauterelle à sabre. *Locusta verrucivora*.

L. viridis ; *elytris abdominis longioribus*, *fusco-maculatis* ;
terebra ensiformi curva.

Gryllus verrucivorus. Lin. *Locusta verrucivora*. Fab.

Panz. fasc. 89. tab. 20—21.

Locusta, n.º 1. Geoff. 1. p. 397.

Habite en Europe.

3. Sauterelle feuille-de-lis. *Locusta lilifolia*. F.

L. thorace tetragono laevi : lineis duabus flavis ; *elytris viridibus ad brevioribus*. Fab.

Locusta lilifolia. Fab. p. 36. Latr. hist. nat. des crust., etc.
12. p. 131.

Habite en France, en Italie. Tarrière courbée.

4. Sauterelle mélangée. *Locusta varia*.

L. antennis flavescentibus ; *fronte acuminata* ; *elytris viridibus*, *immaculatis*, *abdomine vix longioribus*.

Locusta varia. Fab. p. 42. Latr. hist. nat., etc. 12. p. 131.

Panz. fasc. 33. pl. 1.

Habite aux environs de Paris, en Allemagne. Taille petite.

Etc.

PNEUMORE. (Pneumora.)

Antennes filiformes, de seize à vingt articles. Petits yeux lisses rapprochés, et placés à des distances égales.

Abdomen vésiculeux, comme vide. Toutes les pattes plus courtes que le corps.

antennæ filiformes : articulis a sexdecim ad viginti. Gli approximati , inter se subæquè dissiti. Abdomen vesiculosum , ut vacuum , inflatum. Pedes breves corpore breviores.

OBSERVATIONS.

Les *pneumores* sont des locustaires assez voisines des criques par leurs rapports ; mais à corps oblong , gros , vésiculeux et comme vide , au moins dans la plupart. Leurs antennes sont menues , plus courtes que le corps , et probablement ces insectes ne sauraient sauter.

Le genre , établi par M. *Thunberg* , comprend quelques espèces qui viennent du Cap de Bonne-Espérance.

ESPÈCES.

Pneumore à six taches. *Pneumora sex-guttata*. T.

P. viridis ; elytris maculis duabus albis ; abdomine vesiculoso : maculis utrinque tribus , albis.

Gryllus inanis, Fab. p. 49. *Pneumora sex-guttata*. Thunb.
Habite le Cap de Bonne-Espérance.

Pneumore sans taches. *Pneumora immaculata*. T.

P. viridis ; elytris immaculatis ; scutello carinato utrinque dentato ; abdomine variegato.

Gryllus papillosus. Fab. *Pneumora immaculata*. Thunb.
Habite le Cap de Bonne-Espérance.

Pneumore tachetée. *Pneumora maculata*. T.

P. viridis calloso-punctata ; abdomine vesiculoso , albo variegato.

Gryllus variolosus. Fab. *Pneumora maculata*. Thunb.
Habite le Cap de Bonne-Espérance.

CRIQUET. (*Acrydium*.)

Antennes filiformes, quelquefois un peu comprimées, subensiformes, dans quelques-uns terminées presque en bouton, et ayant vingt à vingt-cinq articles. Mandibules multidentées. Petits yeux lisses inégalement espacés entre eux.

Pattes postérieures fortes, propres à sauter. Les ailes larges, bien plissées, colorées.

Antennæ filiformes, interdum compressiusculæ, subensiformes, in non nullis subcapitatæ : articulis a viginti ad viginti quinque. Mandibulæ multidentatæ. Ocelli inæqualiter inter se dissiti.

Pedes postici validi, saltatorii. Alæ latæ, exquisitè plicatæ, coloratæ.

OBSERVATIONS.

Les *criquets* ont tant de ressemblance avec les sauterelles que *Linné* ne les en a pas distingués. Néanmoins ils en diffèrent généralement, 1.^o parce qu'ils n'ont que trois articles aux tarses; 2.^o parce que leurs antennes ne sont pas très-longues et sétacées comme celles des sauterelles; 3.^o parce qu'ici les femelles ne portent pas, comme celles des sauterelles, une tarière saillante et comprimée, à l'extrémité de l'abdomen.

Ces insectes sont extrêmement remarquables lorsqu'ils volent; ils déploient alors deux ailes grandes et fort larges qu'on ne leur soupçonnait pas en les voyant dans l'état de repos; et, comme dans la plupart des espèces ces ailes sont ornées de couleurs vives et brillantes, on les prendrait presque pour de beaux papillons lorsqu'ils volent.

riquets sautent aussi bien que les sauterelles, et plus facilement encore; en sorte que leur vol est 3-temps soutenu. Aussi l'on croit que c'est parmi se trouvent les espèces qui ont l'habitude d'émigrer transporter à de grandes distances, d'une région, formant alors des essaims nombreux et redoutar les dévastations qu'ils causent dans les pays où tent.

sectes de ce genre ont souvent le corselet caréné à sa postérieure, et les jambes épineuses. Ils sont herbivores-très-voraces. Les espèces exotiques, comme celles des Indes, de l'Amérique méridionale et de l'Australie, sont remarquables par leur grandeur et la beauté de leurs ailes. On connaît maintenant beaucoup d'espèces de ce genre; je n'en citerai que quelques-unes.

ESPÈCES.

[Corselet caréné en crête.]

met en scie. *Acrydium serratum*.

l. thorace cymbiformi carinato serrato; posticè producta acuta.

Gryllus serratus. Lin. Fab. p. 48.

Des. ins. 2. tab. 16. f. 2.

Acrydium serratum. Oliv. dict. n.º 9.

habite le Cap de Bonne-Espérance. Fab. L'Amérique méridionale. Oliv.

met en crête. *Acrydium cristatum*. Oliv.

l. thorace cristato: carinè quadrifidà; alis cœruleis apice nigris.

Gryllus cristatus. Lin. Fab. p. 46. Ejusd. *Gryllus* dux ex Dr. Latr.

Holl. gryll. tab. 1. b. fig. 1. Drur. t. 2. tab. 44.

Acrydium cristatum. Oliv. dict. n.º 3.

habite l'Amérique méridionale.

3. Criquet caréné. *Acrydium carinatum*. Oliv.

A. thorace cristato : carina trifida ; alis virescentibus : fasciâ nigra.

Gryllus carinatus. Fab. p. 47.

Acrydium carinatum. Oliv. dict. n.º 5.

Habite en Orient.

4. Criquet stridule. *Acrydium stridulum*.

A. thorace carinato ; alis rubris extimq nigris.

Gryllus stridulus. Lin. Fab. p. 56.

Acrydium stridulum. Oliv. dict. n.º 35. *Ejusd. acr. fuliginosum*, n.º 36.

Geoff. 1. p. 393. n.º 3. Panz. fasc. 87. n.º 12.

Habite en Europe , dans les lieux arides.

Corselet peu ou point caréné en crête.

. Criquet bleuâtre. *Acrydium cœrulescens*.

A. thorace subcarinato ; alis virescenti-cœruleis : fasciâ nigra.

Gryllus cœrulescens. Lin. Fab. p. 58. Panz. fasc. 87. f. 11.

Acrydium. Geoff. 1. p. 392. n.º 2. Oliv. dict. n.º 49.

Habite en Europe.

6. Criquet germanique. *Acrydium germanicum*.

A. testaceum ; alis sanguineis apice hyalinis ; femoribus posticis nigro-punctatis.

Gryllus germanicus. Fab. p. 57. Roes. ins. 2. t. 21. f. 7.

Acrydium germanicum. Oliv. dict. n.º 41.

Habité en Allemagne. Ici M. Latreille rapporte l'*Acrydium* n.º 3 de Geoffroy.

7. Criquet émigrant. *Acrydium migratorium*.

A. thorace subcarinato : segmento unico ; mandibulis cœruleis.

Gryllus migratorius. Lin. Fab. p. 53.

Roes. ins. 2. Gryll. tab. 24.

Acrydium migratorium. Oliv. dict. n.º 24.

Habite l'Orient , la Tartarie , etc. Est-ce bien là l'espèce qui forme ces essaims émigrants , si redoutables ? Au reste , il

paraît qu'il y a plusieurs espèces de ce genre qui ont l'habitude d'émigrer.

Etc.

XIPHICÈRE. (Xiphicera.)

Antennes courtes, aplaties, lancéolées ou ensiformes. Tête courte, à front incliné verticalement.

Corselet caréné. Ailes longues, en toit. Les jambes très-épineuses.

Antennæ breves, compressæ, lanceolatae vel ensiformes. Caput breve, fronte ad perpendiculum inclinat.

Thorax carinatus. Alæ longæ, deflexæ. Pedes tibiis spinosissimis.

OBSERVATIONS.

Les *xiphicères* ont les antennes des truxales, la tête et autres parties des criquets. Elles ne sont donc complètement ni criquets, ni truxales, et doivent être distinguées comme constituant un genre particulier. Il y en a au Muséum plusieurs espèces non déterminées; je crois qu'on peut y rapporter les suivantes, d'après M. Latreille.

ESPECES.

Xiphicère gallinée. *Xiphicera gallinacea.*

X. thorace cymbiformi, maximo, utrinque producte; elytris fuscis immaculatis; femoribus posticis, compressis, serratis.

Gryllus gallinaceus. Fab. p. 48.

Habite les Indes orientales.

2. Xiphicère serripède. *Xiphicera serripes*:

*X. thorace cymbiformi , posticè producto ; elytris fuscis
femoribus posticis serratis.*

Gryllus serripes. Fab. p. 48. *Angryllus carinatus*? Linn.

Habite dans les Indes.

TRUXALE. (Truxalis.)

- Antennes courtes , comprimées , ensiformes , à articles peu distincts. Bouche à la base du prolongement de la tête.

Tête prolongée supérieurement en pyramide qui porte à son sommet les antennes et les yeux. Elytres en toit
Pattes postérieures plus longues que le corps , propre à sauter.

Antennæ breves , compressæ , ensiformes ; articulis vix distinctis. Os ad basim processûs capitis.

Caput supernè in pyramidam apice antenniferam et oculiferam productum. Elytra deflexa. Pedes postici corpore longiores, saltatorii.

OBSERVATIONS.

Les *truxales* ont, comme les criquets, l'abdomen des femelles sans tarière saillante , et les pattes postérieures longues et propres à sauter ; mais qui sont plus grêles. Ces insectes sont bien distingués des autres *locustaires* , par leur tête prolongée supérieurement en cône ou en forme de pyramide dont le sommet porte les antennes et les yeux. Ils le sont aussi par leurs antennes courtes , aplaties et ensiformes. Leurs yeux sont ovales-allongés. On n'en connaît que peu d'espèces.

ESPÈCES.

1. Truxale grand-nez. *Truxalis nasutus*.

T. viridulus ; *alis hyalinis basi viridi-flavidulis*.

Truxalis nasutus. Fab. p. 26. *Gryllus nasutus*. Lin.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 12. p. 147. pl. 94. f. 5.

Habite le midi de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique.

2. Truxale ailes-rouges. *Truxalis erythropterus*.

T. alis basi rubellis.

Sulz. hist. ins. tab. 8. f. 5. Drury. ins. 2. t. 40. f. 1.

Truxalis erythropterus. Latr. hist. nat., etc. p. 148.

Habite en Afrique.

3. Truxale grylloïde. *Truxalis grylloides*. Latr.

T. corpore cinereo; elytris abdomine brevioribus: lineæ alba.

Acrydium contum. Oliv. dict. n.º 64.

Truxalis grylloides. Latr. hist. nat., etc. p. 148. n.º 3.

Habite le midi de la France.

Etc.

ACHET. (Acheta.)

Antennes filiformes, de treize ou quatorze articles, de moitié plus courtes que le corps. La bouche reçue dans une cavité du sternum antérieur.

Corselet prolongé postérieurement comme un grand écusson qui égale ou dépasse l'abdomen. Pattes postérieures propres à sauter. Point de pelottes entre les crochets des tarses.

Antennæ filiformes, corpore dimidio breviores; articulis tredecim vel quatuordecim. Os in cavitate sterni antici receptum.

Thorax posticè in scutellum magnum productus, abdomen supertegen^s, adæquans aut superans. Pedes postici saltatorii. Tarsorum articulus ultimus appendice terminali nullus.

OBSERVATIONS.

Les *achets* dont il s'agit, sont de petites locustaires que j'ai depuis long-temps distinguées des criquets, d'abord à cause du prolongement postérieur de leur corselet; ensuite parce que leur bouche est reçue dans une cavité de la partie antérieure du sternum. Ce ne sont point les *acheta* de Fabricius, mais les *tetrix* de M. Latreille. On les trouve dans les lieux secs et pierreux. Leurs élytres avortent presque entièrement.

ESPÈCES.

1. Achet à deux points. *Acheta bipunctata*.

A. thorace ad longitudinem abdominis posticè producto, bipunctato.

Gryllus bipunctatus. Lin. *Acrydium bipunctatum*. Fab. p. 26.

Panz. fasc. 5. f. 18. Geoff. 1. p. 394. n.º 5.

Tetrix subulata. Var. B. Latr.

Habite en Europe, dans les lieux secs. Il est très-petit.

2. Achet subulé. *Acheta subulata*.

A. thorace posticè producto subulato, abdomine longiore.

Gryllus subulatus. Lin. *Acrydium subulatum*. Fab.

Schoeff. icon. ins. tab. 154. f. 9—10.

Tetrix subulata. Latr. Criquet, n.º 6. Geoff. 1. p. 395.

Habite en Europe.

LES MANTIDES.

Corps allongé, étroit. Ailes horizontales. Extrémité de l'abdomen, dans les deux sexes, n'ayant point deux filets ou deux appendices particuliers. Tarses à cinq articles.

Les *Mantides* sont, en général, des orthoptères de

de taille , et qui ont des formes singulières. Elles ont , ni sauteuses , ni véritablement coureuses ; elles ne ressemblent évidemment aux locustaires.

Leurs ailes , néanmoins , ne sont point inclinées en toit comme celles des locustaires , et leurs pattes postérieures ne sont point propres à sauter. Elles ont la tête découverte ; le corselet étroit , souvent fort allongé. Il n'y a point de tarière saillante dans les femelles , et , dans le mâle , on ne voit point à l'extrémité de l'abdomen deux filets ou deux appendices saillans , comme dans les locustaires et dans les blattaires.

La plupart des mantides sont des insectes exotiques , et vivent dans les climats chauds ; on n'en trouve que quelques espèces dans le midi de l'Europe ; elles ont , en général , des mouvemens lents.

Ces mantides comprennent quelques genres , dont les uns paraissent réunir des insectes carnassiers , puisqu'ils ont des pattes ravisseuses ; tandis que les autres n'embrassent que des espèces phytophages.

Les femelles , en pondant , laissent échapper une humeur visqueuse , qui enveloppe les œufs et qui prend de la consistance à l'air , à mesure qu'elle se dessèche. Il en résulte , sur les tiges des plantes où ces femelles ont pondu , des masses subglobuleuses ou ovoïdes , de la grosseur d'une noix. Si l'on ouvre ces espèces de nids , on trouve l'intérieur régulièrement divisé en une multitude de loges alvéolaires qui contiennent les œufs.

Probablement , le desséchement et le retrait de la matière visqueuse qui enveloppait les œufs , ont donné lieu à la singulière conformation de ces corps.

Quatre genres , bien distincts , composent la famille des mantides ; on la divise de la manière suivante.

(a) Pattes antérieures ravisseuses. Hanches longues.

(+) Antennes simples dans les deux sexes. Les genoux sans scuillets.

Mante.

(++) Antennes pectinées dans les mâles. Les genoux des quatre pattes postérieures garnis d'un scuillet.

Empuse.

(b) Point de pattes ravisseuses. Hanches courtes.

(+) Corps oblong, déprimé; l'abdomen large et fort aplati sur les côtés.

Phasme,

(++) Corps linéaire, subfiliforme, non aplati.

Spectre.

M A N T E. (Mantis.)

Antennes sétacées, simples dans les deux sexes, plus courtes que le corps. Lèvre inférieure à quatre divisions.

Tête inclinée. Corselet allongé, étroit. Pattes antérieures avancées, un peu courtes, ravisseuses, armées, vers leur extrémité, de piquans en dents de peigne, avec un ongle terminal et mobile.

Antennæ setaceæ, corpore breviores, in utroque sexu simplices. Labium quadrifidum.

Caput inflexum. Thorax angustus, elongatus. Pedes antici porrecti, breviusculi, raptatorii, versus extremitatem dentibus semi-pectinati, et ungue mobili terminati.

OBSERVATIONS.

Les *mantes* sont des insectes fort remarquables par leur organisation particulière, et qui ont le corselet étroit, fort allongé antérieurement, presque linéaire, cette partie étant d'une seule pièce.

Leurs pattes sont fort longues, surtout les postérieures; ainsi, avec leur corps étroit et allongé, donne à ces insectes un aspect très-singulier. Les deux pattes antérieures sont les moins longues; mais elles sont, en général, plus fortes que les autres, et armées, vers leur extrémité, de pinnules rangées d'un côté en dents de peigne, avec un ongle allongé, terminal, et susceptible de se replier sur les pinnules pour saisir la proie.

La tête est assez petite, deltoïde, inclinée, munie de deux gros yeux, entre lesquels sont situées les antennes.

Les élytres sont couchées horizontalement, et en paroisées l'une sur l'autre; elles forment néanmoins un arc un peu convexe.

Les *mantes* saisissent avec leurs pattes antérieures les insectes qu'elles peuvent attraper, et les dévorent; elles mangent quelquefois les unes les autres.

Les œufs des *mantes* sont allongés.

ESPÈCES.

Mante prêcheuse. Mantis oratoria.

M. viridis; elytris abdomine brevioribus, viridibus; alis maculâ cœruleo-nigrâ, anterieus rufescentibus.

Mantis oratoria. Lin. Fab. p. 20. Oliv. dict. n.º 11.

Habite le midi de la France.

Mante religieuse. Mantis religiosa.

M. viridis; elytris abdominis longitudine, viridibus, immaculatis; alis hyalinis.

Mantis religiosa. Lin. Panz. fasc. 50. f. 8.

Mantis. Geoff 1. p. 399. pl. 8. f. 4.

Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 92.

Habite le midi de la France, et aux environs de Fontainebleau.

3. Mante suppliante. *Mantis præcaria*.

M. thorace subciliato ; elytris virascentibus ; ocello ferrugineo. Lin.

Mantis præcaria. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 13.

Mérian. Surin. tab. 66. Seba mus. 4. t. 67. f. 3—6.

Habite l'Amérique méridionale, l'Afrique.

4. Mante tricolore. *Mantis tricolor*.

M. thorace lateribus expanso lobato ; capite cornuto ; pedibus anticis latissimis. Linn.

Mantis tricolor. Lin. Fab. p. 18. Oliv. dict. n.º 36.

Habite dans l'Inde.

5. Mante scrophuleuse. *Mantis strumaria*.

M. thorace utrinque membranaceo, dilatato, obcordato. Lin.

Mantis strumaria. Lin. Fab. p. 18. Oliv. n.º 38.

Mérian. Surin. tab. 27.

Habite dans les Indes.

Etc.

EMPUSE. (Empusa.)

Antennes pectinées dans les mâles.

Partie supérieure de la tête prolongée en corne. Corselet allongé. Pattes antérieures ravisseuses : les quatre postérieures munies d'un appendice membraneux aux articulations.

Antennæ in masculis pectinatæ.

Caput supernè in cornu productum. Thorax elongatus. Pedes antici raptatorii : posticis quatuor ad goniculâ lobo seu appendice membranaceo instructis.

OBSERVATIONS.

Les *empuses* sont des mantides des plus singulières par forme. Elles tiennent néanmoins de très-près aux mantis et n'en sont distinguées que par les antennes des mâles, la partie cornue de leur tête, et les appendices foliacés qui s'observent aux géciculations des quatre pattes postérieures, dans la plupart.

ESPÈCES.

Empuse gongyloïde. *Empusa gongyloides.*

E. flavescens; thorace lineari subciliato; femoribus anterioribus spinâ terminatis; reliquis lobo.

Mantis gongyloides. Lin. Fab. p. 17. Oliv. dict. n.º 7.

Seba mus. 4. tab. 68. f. 9. Stoll. spect. p. 47. pl. 16. f. 58. A.

Habite à Surinam. Oliv. Je la crois plutôt d'Asie. Peut-être que la *mantis pennicornis*, Oliv. dict. n.º 50, n'en diffère pas.

Empuse appauvrie. *Empusa pauperata.*

E. albida; thorace lineari-spinuloso; femoribus anticis spinâ terminatis; reliquis lobo.

Mantis pauperata. Fab. p. 17. Oliv. dict. n.º 8.

Herbst. archiv. ins. tab. 51. f. 1. Stoll. pl. 10. f. 40.

Habite le midi de la France, l'Espagne, etc.

Empuse flabellicorne. *Empusa flabellicornis.*

E. thorace dilatato membranaceo; femoribus anticis spinâ terminatis; reliquis lobo.

Mantis flabellicornis. Fab. p. 16.

Habite à Tranquebar.

Empuse pectinicornie. *Empusa pectinicornis.*

E. thorace lævi, vertice subulato, antennis pectinatis.

Mantis pectinicornis. Lin. Fab. p. 18. Oliv. dict. n.º 32.

Herbst. archiv. ins. tab. 50. f. 2.

Habite la Jamaïque.

Empuse mendiante. *Empusa mendica.*

E. thorace marginato dentato; clytris albo viridique variis: margine albo punctato.

Mantis mendica. Fab. p. 17. Oliv. dict. n.º 9.

Stoll. mant. tab. 12. f. 47.

Habite à Alexandrie. Forsk.

Etc.

PHASME. (Phasma.)

Antennes filiformes ou sétacées, courtes dans les femelles, plus longues dans les mâles. Palpes comprimés. Lèvre inférieure quadrifide : à découpures externes plus longues.

Tête allongée-ovale, dirigée en avant. Corselet aplati, court, étranglé ou rétréci vers le milieu. Abdomen aplati. Toutes les pattes ayant les cuisses comprimées et comme ailées. Les élytres en forme de feuilles.

Antennæ filiformes vel. setaceæ, in feminis breves, in masculis longiores. Palpi compressi. Labium quadrifidum : laciniis externis longioribus.

Caput elongato-ovatum, anticè porrectum. Thorax brevis, depressus, medio angustatus. Pedes omnes femoribus compressis, subalatis. Elytra foliiformia.

OBSERVATIONS.

Les *phasmes* sont des insectes très-singuliers en ce qu'ils ressemblent presque entièrement à des feuilles, surtout leurs élytres. Leur corps, rétréci en devant, est comprimé dans presque toutes ses parties. Ils ont le corselet court, aplati, étranglé au milieu, à seconde pièce fort courte, ce qui est très-différent dans les spectres, qui ont la seconde pièce du corselet fort allongée. Les élytres sont grandes, larges, veinées, ressemblant à des feuilles sèches. Dans les mâles, les antennes sont sétacées et beaucoup plus longues que dans les femelles.

ESPECE.

x. Phasme feuille-sèche. *Phasma siccifolia*.

Ph. thorace denticulato; femoribus ovatis membranaceis; abdomine ovali, depresso.

Mantis siccifolia. Fab. p. 18. Oliv. dict. n.º 6. *Phyllium*. Latr.

Donovan. nat. hist. ins. ind. fasc. 8. tab. 3.

Habite les Indes orientales. La femelle est aptère, le mâle est ailé, plus petit. J'en ai vu une variété de l'Isle-de-France, à élytres d'un rouge-brun ou feuille-morte, et dont on voit une mauvaise figure dans *Seba*, vol. 4. pl. 75. f. 11.

SPECTRE. (Spectrum.)

Antennes sétacées, à articles souvent très-nombreux. Palpes subcylindriques. Lèvre inférieure à quatre divisions : les deux externes plus longues.

Tête ovale, un peu oblique. Corps très-long, cylindrique, effilé : le corselet cylindrique, à second segment fort allongé. Elytres très-courtes, souvent nulles. Pattes longues, grêles et distantes.

Antennæ setaceæ; articulis sæpè numerosissimis. Palpi subcylindrici. Labium quadrifidum : laciniis externis longioribus.

Caput ovatum, subobliquum. Corpus longissimum, cylindricum aut filiforme. Thorax cylindricus; segmento secundo antico longiore. Elytra brevissima, sæpè nulla. Pedes longi, graciles, distantes.

OBSERVATIONS.

Les *spectres* ont une forme particulière, extraordinaire même, et qui les distingue non-seulement des phasmes et

des mantes, mais même de tous les autres insectes. Leur corps, des plus grands que l'on connaisse, parmi les insectes, est allongé comme un bâton, cylindrique, tout d'une venue, sans appendices latéraux. Il est quelquefois très-grêle, filiforme, et ne ressemble point à un corps animal. Beaucoup d'espèces sont aptères. Les autres ont des élytres très-courtes, et leurs ailes, qui sont un peu plus grandes, ont leur bord interne plus coriace ou moins transparent que le reste. Les pattes sont grêles, longues, par paires écartées. Comme les phasmes et les mantes, ils ont cinq articles aux tarses.

ESPECES.

[Corps allé.]

1. Spectre soldat. *Spectrum gigas*.

S. thorace teretiusculo, scabro; elytris brevissimis; pedibus spinosis.

Stoll. spect. tab. 2. f. 5.

Phasma gigas. Fab. suppl. *Mantis gigas*. Linn.

Seba mus. 4. tab. 77. f. 1—2.

Habite les Indes orientales.

2. Spectre nécydaloïde. *Spectrum necydaloïdes*.

S. thorace scabro; elytris ovatis, angulatis, brevissimis; alis oblongis. F.

Phasma necydaloïdes. Fab. suppl. p. 188.

Mantis necydaloïdes. Linn.

Stoll. spectr. tab. 3. f. 8. tab. 4. f. 11.

Habite les Indes orientales.

3. Spectre atrophique. *Spectrum atrophicum*.

S. thorace quadrispinoso; elytris brevissimis; basi aristato-mucronatis. Fab.

Mantis atrophica. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 12. tab. 1. f. 7.

Phasma atrophica. Fab. suppl. p. 188.

Habite l'île de Java.

Et autres à corps allé.

[Corps aptère.] •

Spectre filiforme. *Spectrum filiforme*.

S. corpore filiformi, aptero, fusco; pedibus longissimis, tenuissimis, inermibus.

Phasma filiformis, Fab. suppl. p. 186.

Mantis, Brown, jam. t. 42. f. 5.

Herbst, arch., tab. 51. f. 2.

Habite l'Amérique méridionale.

Spectre fêrûle. *Spectrum ferula*.

S. corpore filiformi, aptero, viridi; pedibus longitudine corporis; femoribus posticis apice spinosis.

Phasma ferula, Fab. suppl. p. 187.

Habite la Guadeloupe.

Spectre plume. *Spectrum calamus*.

S. corpore filiformi aptero virescente; femoribus striatis.

Phasma calamus, Fab. suppl. p. 187.

Habite l'Isle de Sainte-Croix d'Amérique.

Spectre bâton. *Spectrum baculus*.

S. corpore cinerascens tuberculato aptero; pedibus angulatis.

Phasma baculus, Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 12. p. 104. pl. 94. f. 2.

Habite les Antilles. *Mauger*. Il a les antennes courtes : serait-ce une femelle ?

Spectre d'Italie. *Spectrum Rossii*.

S. corpore filiformi aptero virescente; femoribus dentatis.

Phasma Rossia, Fab. suppl. p. 187.

Mantis Rossia, Ross. Fann. étr. 1. tab. 8. f. 1.

Habite l'Italie, le midi de la France. Il a les antennes courtes.

 LES GRILLONIDES.

corselet non aplati, arrondi sur les côtés, sans bords tranchans. Deux filets ou deux appendices au bout de l'abdomen dans les deux sexes.

Les grillonides ont trois articles aux tarses, et leurs

ailes , dans le repos , paraissent mucronées. Ces insectes courent avec célérité , ce qui montre , ainsi que les appendices de leur abdomen , leurs rapports avec les coureurs ; mais la plupart ont , en outre , la faculté de sauter. Ils constituent une petite famille qui n'embrasse encore que trois genres et que je divise de la manière suivante.

- (1) Point de pattes propres à sauter : les pattes antérieures palmées.

Courtillière.

- (2) Pattes postérieures propres à sauter : les antérieures non palmées.

- (a) Antennes submoniliformes. Point de tarrière dans les femelles.

Tridactyle.

- (b) Antennes sétacées. Une tarrière dans les femelles.

Grillon.

COURTILIÈRE. (Gryllo-talpa.)

Antennes sétacées , multiarticulées , de la longueur du corselet. Lèvre supérieure arrondie , entière. Mandibules multidentées.

Corps oblong. Corselet ovoïde , arrondi latéralement. Pattes antérieures fouisseuses , palmées et dentées au sommet ; les postérieures non propres à sauter. Abdomen terminé par deux filets : celui des femelles sans tarrière saillante.

Antennæ setaceæ , thoracis longitudine , multiarticulatæ. Labrum rotundatum , integrum. Mandibulæ multidentatæ.

Corpus elongatum. Thorax obovatus, ad latera rotundatus. Pedes antici fossorü, apice palmati dentati; sticis non saltatoriis. Abdomen filamentis duobus terminatum; oviductu non exserto in feminis.

OBSERVATIONS.

Les courtilières ou taupes-grillons ont effectivement beaucoup de rapports avec les grillons; mais on les en distingue facilement par leurs pattes antérieures, qui sont élargies à leur extrémité, dentées, palmées, et presque analogues à celles des taupes. Elles leur servent de même à creuser la terre dans laquelle ces insectes se pratiquent des galeries et des retraites.

Les courtilières ne sont que trop connues par les dégâts qu'elles font dans les jardins, en coupant les racines des plantes qui se trouvent dans leur passage. Elles n'ont que trois articles aux tarses.

ESPECES.

1. Courtilière commune. *Gryllotalpa vulgaris*.

G. alis caudatis elytris longioribus; pedibus anticis palmatis quadridentatis.

Gryllus gryllotalpa. Lin. *Acheta gryllotalpa*. Fab. p. 28.

Gryllus. Geoff. 1. p. 387, pl. 8. f. 1.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 12. p. 122. pl. 94. f. 4.

Habite en Europe, dans les jardins.

2. Courtilière didactyle. *Gryllotalpa didactyla*. Latr.

G. tibiis anticis bidentatis. Latr.

Latr. hist. nat. des crust., etc. 12. p. 122.

Habite à Cayenne.

TRIDACTYLE. (Tridactylus.)

Antennes submoniliformes, courtes, à dix articles, Pattes antérieures non palmées, mais à jambes épineuses

au sommet. Pattes postérieures à jambes grêles, allongées, munies de trois appendices digitiformes à la place du tarse.

Antennæ submoniliformes , breves , decem-articulatæ. Pedes antici non palmati : tibiis apice spinosis; postici tibiis elongatis , gracilibus : illis , tarsorum loco , appendicibus tribus digitiformibus.

OBSERVATIONS.

Les *tridactyles* sont des insectes très-voisins des courtilières par leurs rapports ; mais ils s'en distinguent singulièrement par leurs pattes et leurs antennes.

ESPECES.

1. Tridactyle paradoxé. *Tridactylus paradoxus*. Latr.

T. luteo pallidus , thorace dilutè fusco ; elytris alis brevioribus.

Tridactylus paradoxus. Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 97.

Acheta digitata. Coqueb. illustr. ic. dec. 3. tab. 21. f. 3.

Habite la Guinée.

2. Tridactyle mélangé. *Tridactylus variegatus*.

T. niger , punctis albo-luteis variegatus.

Tridactyle mélangé. Cuv. regn. anim. ins. p. 378.

Habite le midi de la France. Espèce petite.

GRILLON. (Gryllus.)

Antennes sétacées , plus longues que le corselet. Deux mandibules. Quatre palpes un peu longs. Lèvre inférieure quadrifide.

Tête et corselet transverses. Corps oblong. Deux appendices sétacés à l'extrémité de l'abdomen. Celui des



SANS VENTRÈRES.

259

Femelles muni d'une tarière. Pattes postérieures propres à sauter.

Antennæ setaceæ ; thorace longiores. Mandibulæ duæ robustæ. Palpi quatuor longiusculi. Labium quadrifidum.

Caput thoraxque transversa. Corpus oblongum. Appendices duo setaceæ ad apicem abdominis. Feminarum abdomen oviductu longo terminatum. Pedes postici saltatorii.

OBSERVATIONS.

Les grillons sautent presque aussi bien que les saute-relles, et ne sont pas sans rapports avec elles; néanmoins ils en ont de plus grands avec la courtilière et le tri-dactyle, mais leurs pattes antérieures ne sont pas fouisseuses. On les nomme *cri-cri* en quelques endroits, à cause du bruit singulier qu'ils font entendre presque continuellement, surtout dans les temps chauds.

Leur bouche est formée d'une lèvre supérieure arrondie; de deux mandibules fortes, dentées; de deux mâchoires pointues; de quatre palpes et deux galettes; enfin d'une lèvre inférieure quadrifide. Leurs élytres sont ordinairement plus courtes que l'abdomen. Leurs tarses sont à trois articles. Leurs petits yeux lisses sont peu distincts.

ESPECES.

1. Grillon des champs. *Gryllus campestris*.

G. alis elytris brevioribus: corpore nigro; stylo lineari.
Oliv.

Gryllus acheta campestris. Linn.

Acheta campestris. Fab. papa. fasc. 88. f. 8 et 9.

Habite en Europe. Il est plus gros et plus brun que le suivant.

2. Grillon domestique. *Gryllus domesticus*.

G. alis caudatis elytris longioribus, abdominis stylis duobus apice fissis. Oliv.

Gryllus acheta domesticus. Lin.

Habite en Europe, dans les maisons. Attiré par la chaleur, il se tient dans des trous près des fours, des cheminées de cuisine.

3. Grillon monstrueux. *Gryllus monstrosus*.

G. elytris alisque caudato-convolutis. Oliv.

Acheta monstrosa. Fab.

Habite le Cap de Bonne-Espérance. Il est gros, brun, et a l'extrémité des élytres et des ailes roulée en spirale, au moins dans le mâle.

4. Grillon à voile. *Gryllus umbraculatus*.

G. niger; elytris apice albis; umbraculo frontis deflexo. Gmel. p. 2061.

Habite la Barbarie; l'Espagne.

LES COUREURS.

Corselet aplati, à bords tranchans, et débordant soit seulement sur les côtés, soit même sur la tête. Deux appendices au bout de l'abdomen.

Les coureurs tiennent aux grillonides par leur agilité, mais ils ne sautent point. Ils y tiennent encore parce qu'ils ont à l'extrémité de l'abdomen, dans les deux sexes, deux appendices, soit constitués par des vésicules oblongues, soit plus allongés et conformés en pinces. Leur corselet est toujours aplati; leurs antennes sont longues, sétacées ou filiformes.

Ces orthoptères sont fort agiles, courent avec célérité, et recherchent les lieux obscurs.

Je réunis sous cette coupe, deux genres très-distincts

l'un de l'autre, qui semblent même indiquer chacun l'existence d'une famille particulière, et néanmoins qui, sous certains rapports, sont ici convenablement rapprochés : voici les caractères qui les signalent.

- [1] Cinq articles aux tarses ; tête cachée sous le corselet ; élytres en recouvrement ; ailes droites.

Blatte.

- [2] Trois articles aux tarses ; tête libre, hors du corselet ; élytres à suture droite ; ailes pliées transversalement et plissées.

Forficule.

B L A T T E. (Blatta.)

Antennes sétacées, longues, posées sous les yeux. Labre arrondi antérieurement ; lèvre inférieure bifide.

Corps oblong, presque ovale, déprimé. Corselet aplati, lisse, bordé, recouvrant la tête. Elytres horizontales. Deux appendices courts et coniques à l'extrémité de l'abdomen. Pattes propres à la course ; cinq articles aux tarses.

Antennæ setaceæ, longæ, infrà oculos insertæ. Labrum antice rotundatum ; labium bifidum.

Corpus oblongum, subovale, depressum. Thorax planulatus, lævis, clypeiformis, marginatus, caput obtegens. Elytra horizontalia. Abdomen appendicibus duabus brevibus, conicis terminatum. Pedes cursorii ; tarsi quinque articulatis.

Corps allongé, étroit ; corselet presque carré, aplati, débordant. Elytres très-courtes à suture droite. Ailes longues, plissées, repliées, et cachées sous les élytres dans l'inaction. Abdomen armé de pinces. Trois articles aux tarsés.

Antennæ filiformes, ante oculos insertæ, corpore breviores, articulis valdè distinctis. Labrum integrum. Labium profundè bifidum.

Corpus elongatum, angustum. Thorax subquadratus, planus, marginatus. Elytra dimidiata, alis breviora; sutura recta. Alæ longæ, partim transversæ, partim in radios longitudinales plicatæ, in quiete sub elytris occultatæ. Abdomen apice forcipatum. Tarsi triarticulati.

OBSERVATIONS.

Les *forficules* terminent l'ordre des orthoptères, et forment une transition naturelle de cet ordre à celui des coléoptères. Elles ont, en effet, comme la plupart des coléoptères, des élytres à suture droite, et en outre des ailes plus longues que les élytres, non-seulement plissées en éventail dans leur longueur, mais de plus repliées transversalement, et cachées complètement sous ces élytres pendant le repos. D'ailleurs elles semblent presque entièrement privées de petits yeux lisses. Ainsi, sous ces rapports, les *forficules* seraient des coléoptères, avec lesquels effectivement Olivier les a rangées.

Cependant, comme les orthoptères, les *forficules* ont sur leurs mâchoires de véritables galettes, et leur nymphe est active, c'est-à-dire, marche et mange ; tandis que celle des coléoptères est inactive. Il faut donc, comme l'a fait M. Latreille, les placer parmi les orthoptères, et en ter-

ier l'ordre, afin qu'elles servent en quelque sorte de
sage pour arriver à l'ordre suivant. Par leurs élytres
courtes, les forficules semblent, en effet, conduire aux
laphiens qui sont dans le même cas, et qui commencent
l'ordre des coléoptères.

Les forficules, surtout la grande espèce d'Europe, sont
insectes fort communs et bien connus. La pince qu'elles
ont à l'extrémité de leur abdomen les rend fort remar-
rables, et c'est à cette espèce d'arme, avec laquelle elles
semblent vouloir se défendre, qu'elles doivent le nom
elles portent. On les connaît vulgairement sous le nom
notable de *perce-oreille*, et, par une prévention sans
fondement, beaucoup de personnes les craignent. Elles sont
encore plus à craindre, dans les jardins, par les dégâts
elles font en rongant les fruits mûrs et succulents, tels
que les pêches, les abricots, les prunes, les raisins, etc.
Les insectes, à corps presque linéaire et aplati, n'ont
rien d'écusson. Ils courent très-vite, et lorsqu'on veut
les prendre, ils relèvent l'extrémité de leur abdomen
comme pour se défendre, sans néanmoins pouvoir faire au-
cun mal.

ESPECES.

Forficule auriculaire. *Forficula auricularia*.

*F. antennis quatuordecim-articulatis, forcipe arcuato basi
dentato.*

Forficula auricularia. Lin. Fab. Oliv.

Le grand perce-oreille. Geoff. 1. p. 375. n.º 1. pl. 7.
f. 3.

Panz. fasc. 87. f. 8.

Habite en Europe, sous les pierres, sous l'écorce des arbres.

Forficule géante. *Forficula gigantea*.

*F. pallida; supra nigro variegata; anobidentato; forcipe
porrecto unidentato.* Fab.

Forficula gigantea. Oliv. dict. n.º 2.

Forficula maxima. Vill. ent. 1. p. 427. tab. 2. f. 53.

Habite la France méridionale. Plus de vingt articles aux antennes.

3. Forficule bimaculée. *Forficula biguttata*.

F. nigra, capite postice pedibusque rufis; elytris rufis maculatis et alarum apicibus exsertis albidis.

Forficula biguttata. Fab. et fortè *forficula bipunctata* ejusd.

Panz. fasc. 87. f. 10.

Habite en Autriche, etc. Onze ou douze articles aux antennes.

4. Forficule naine. *Forficula minor*.

F. elytris testaceis immaculatis; capite nigra.

Forficula minor. Lin. Fab. Oliv. dict. n.º 7.

Le petit perce-oreille. Geoff. 1. p. 375. n.º 2.

Panz. fasc. 87. f. 9.

Habite en Europe, et se trouve en France. Dix ou douze articles aux antennes. Pinces peu arquées. L'abdomen mucroné entre les pièces de la pince.

Etc.

ORDRE HUITIÈME.

LES COLÉOPTÈRES.

Bouche munie de mandibules, de mâchoires, et de lèvres. Quatre ou six palpes.

Deux élytres dures en général, coriaces, recouvrant deux ailes membraneuses plus longues, mais plissées et pliées transversalement dans l'inaction.

Larve vermiforme, hexapode, rarement subapode, à tête écailleuse, sans yeux. Nymphe inactive.

Les coléoptères, dans notre marche, constituent le huitième et dernier ordre des insectes, celui qui est le

plus étendu , le plus nombreux en espèces et en genres , enfin , celui qui embrasse les insectes les plus remarquables par leur taille , par la singularité de leur forme , par la solidité de leurs tégumens , en un mot , ceux dont l'organisation paraît la plus avancée dans ses progrès de composition.

En terminant leur classe , ces insectes , au lieu d'offrir une transition reconnaissable à celle qui vient ensuite , semblent finir brusquement leur série , et n'arriver qu'à une sorte de cul-de-sac où ils trouvent leur terme. On en donnera la raison dans l'exposition préliminaire des *arachnides* qui viennent après les insectes.

Si les coléoptères ne piquent pas autant la curiosité que les hyménoptères , par des habitudes singulières , par des sociétés nombreuses , travaillant , en quelque sorte , en commun , et formant des ouvrages vraiment admirables , ils intéressent singulièrement , malgré cela , par leur nombre et leur grande diversité dans la nature , par celle surtout des formes de leur tête ou de leur chaperon et de leur corselet , par celle de leur manière de vivre , en un mot , par cette consistance plus solide de la plupart de leurs parties extérieures qui les rend plus conservables dans nos collections.

Tous généralement sont des *broyeurs* , soit phytophages , soit zoophages ; tous prennent encore de la nourriture après être parvenus à leur état parfait ; aussi , sauf une espèce singulière à plusieurs égards [*la clavigère*] , tous ont des mandibules et des mâchoires distinctes.

Les coléoptères se reconnaissent au premier aspect par leurs parties extérieures opaques , coriaces , et en

général fort dures , et parce qu'ils ont deux ailes membraneuses , veinées , longues , repliées transversalement sur elles-mêmes dans l'inaction, et alors cachées sous des espèces d'étuis qu'on nomme *élytres*, et qui ne sont que les deux ailes supérieures ainsi transformées. Ces élytres sont opaques , dures , coriaces , convexes en dehors , un peu concaves en dedans ou en dessous , et presque toujours jointes l'une à l'autre, par leur bord interne, en une sautoire ou ligne droite.

Lorsque l'insecte veut voler , il écarte latéralement ses élytres en les élevant un peu , et alors il déploie les deux ailes membraneuses et transparentes qui se trouvaient cachées et repliées sous ces espèces d'étuis.

Les élytres étant ouvertes et assez écartées pour ne pas gêner le jeu des ailes, contribuent , par leur position et leur concavité , à faciliter le vol. On prétend néanmoins qu'elles ne font aucun mouvement , et que les ailes , mises en jeu et frappant l'air , occasionnent elles seules le vol.

Les ailes des coléoptères sont rarement en proportion avec le poids de leur corps : elles ne sont pas assez grandes et ne sont pas mues par des muscles assez vigoureux ; ce qui fait qu'en général ces insectes volent très-mal et avec quelque difficulté. Quelques-uns même ne peuvent faire usage de leurs ailes que quand l'air est parfaitement calme. Quelques autres , dont le corps est plus léger , s'élèvent et volent avec plus de facilité , surtout lorsque le temps est chaud et sec ; mais leur vol est court. Aucun d'ailleurs ne peut voler que vent arrière , et jamais contre le vent. *Oliv.*

Ici, comme dans les insectes des autres ordres , des différences d'habitudes en entraînent dans l'emploi des

parties, et celles qui ne servent plus ou qui ne servent que rarement, ne reçoivent plus de développemens, ou n'en obtiennent que de proportionnels. Aussi, un grand nombre de coléoptères ne faisant plus d'usage de leurs ailes, ces ailes sont avortées plus ou moins complètement, et beaucoup d'entre eux en manquent entièrement. Le plus souvent alors les élytres sont réunies par leur suture et ne peuvent plus s'ouvrir. Ces insectes ne se transportent d'un lieu à l'autre qu'en marchant, courant ou sautant. On les reconnaît toujours facilement pour des coléoptères, non-seulement par les caractères de leur bouche, mais parce que leurs élytres subsistent encore.

Un petit nombre de coléoptères, tels que les nécydales, les staphylins et quelques mordelles, ont des élytres si courtes ou si étroites, que ces parties peuvent à peine cacher les ailes. Ces élytres cependant n'en existent pas moins et se font reconnaître par leur position, leur consistance et leur forme.

La tête des coléoptères est pourvue de deux antennes diversement figurées, et en général composées de dix ou onze articles assez distincts.

La bouche de ces insectes est armée de deux fortes mandibules cornées qui leur servent comme de pince pour saisir leur proie; et couper les alimens que les deux mâchoires, qui se trouvent en dessous, divisent et broient pour compléter la mastication. La forme de cette bouche est à-peu-près la même que celle des orthoptères et des névroptères : on y voit quatre ou six palpes, savoir : un ou deux attachés à la base extérieure de chaque mâchoire, et deux autres insérés aux parties latérales de la lèvre inférieure. Les palpes maxillaires

coléoptères , employer la considération du nombre des tarses , à l'imitation de Geoffroy et d'Olivier , parce que cette considération offre des caractères constans et faciles à saisir , ce qui la rend extrêmement avantageuse. Je réserverai celle de la forme des antennes , pour subdiviser ces premières divisions , lorsque leur étendue le rendra nécessaire.

Ainsi je partage les genres nombreux de l'ordre des coléoptères en cinq sections , savoir :

1.^{re} SECT. 2 articles à tous les tarses [*les Dimères*].

2.^e SECT. 3 articles à tous les tarses [*les Trimères*].

3.^e SECT. 4 articles à tous les tarses [*les Tétramères*].

4.^e SECT. 5 articles aux tarses des deux premières paires de pattes , et quatre à ceux de la troisième paire [*les Hétéromères*].

5.^e SECT. 5 articles à tous les tarses [*les Pentamères*].

PREMIÈRE SECTION.

Deux articles à tous les tarses [les Dimères].

Conformément à notre manière générale de procéder , nous commençons l'ordre des coléoptères par les insectes de cet ordre qui ont le moins de parties , et même qui ont le plus d'imperfection dans les parties qui caractérisent leur ordre.

Il y a très-peu de coléoptères qui n'aient que deux articles aux tarses , et l'on a été long-temps sans en connaître un seul qui fût dans ce cas. Il y en a moins en-

core qui n'aient que six articles aux antennes , et même qui manquent de mandibules et de lèvre inférieure. Ce sera donc par ces coléoptères , en quelque sorte imparfaits , que l'ordre devra commencer.

En reste , on en connaît à peine une demi-douzaine. Tous ont les élytres fort raccourcies , comme dans les forficules et les staphylins. Quoiqu'il soit possible d'en former trois genres , comme l'a fait M. Latreille , je ne les diviserai ici qu'en deux coupes génériques , qu'en *clavigères* et en *psélaphes*.

CLAVIGÈRE. (Claviger.)

Antennes insensiblement épaissies en massue vers leur sommet , à six articles. Point de mandibules , ni de lèvre inférieure , ni de palpes labiaux distincts. Mandibules très-petites , ayant des palpes très-courts , sub-filiformes.

Corps et corselet subcylindriques. Abdomen large , presque arrondi à l'extrémité. Elytres raccourcies. Un seul crochet aux tarses.

Antennæ sensim extrorsum crassiores , sex articulatæ. Mandibulæ , labium , palpique labiales nulli aut obsoletissimi. Maxillæ minimæ ; palpis brevissimis subfiliformibus.

Corpus thoraxque subcylindrica ; abdomen magnum , latum , apice rotundatum. Elytra abbreviata. Tarsi monodactyli.

Tom. IV.

OBSERVATIONS.

C'est assurément une grande imperfection et une grande singularité pour un coléoptère, que de n'offrir ni mandibules, ni lèvre inférieure distinctes, et de n'avoir que six articles aux antennes. C'est cependant le cas de la *clavigère* dont nous ne connaissons encore qu'une espèce.

• ESPECE.

1. *Clavigère testacée. Claviger testaceus.*

Claviger. Latr. gen. crust. et ins.

Parz. fasc. 59. f. 3.

Habite en Allemagne. Sa couleur est d'un rouge-marron.

P S É L A P H E. (*Pselaphus.*)

Antennes submoniliformes, de onze articles. Des mandibules, des mâchoires, et une lèvre inférieure. Quatre palpes.

Tête distincte; corselet ovale ou subcylindrique. Elytres raccourcies. Un ou deux crochets aux tarses.

Antennæ submoniliformes; articulis undecim. Mandibulæ, maxillæ, labium. Palpi quatuor.

Caput distinctum. Thorax ovalis vel subcylindricus. Elytra abbreviata. Tarsi uni aut biunguiculati.

OBSERVATIONS.

Quoique la chenille de *M. Latreille* puisse être distinguée de ses psélaphes, elle me paraît s'en rapprocher assez pour qu'on puisse l'y associer sans un grand inconvénient. De part et d'autre, les antennes à onze articles, les élytres raccourcies, etc., semblent autoriser cette association.

Je ne crois pas, comme on pourrait le penser, que des élytres raccourcies, parmi les coléoptères, soient toujours les indices d'une seule et même famille; d'où il résulterait que les psélaphes appartiendraient à la famille des staphylins. Les forficules offrent déjà un exemple du contraire, et ici la forme des antennes et de l'abdomen, ainsi que le nombre des articles des tarses, en font présumer un autre.

ESPÈCES.

* *Palpes très-petits, non avancés.*

1. Psélaphe chennie. *Psolaphus chennium*.

Ps. rufo-castaneus; *capite bituberculato*.

Chennium bituberculatum. Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 1.

Habite la France méridionale, près de Brives. Sous chaque antenne, la tête est munie d'un tubercule pointu. Les tarses ont deux crochets.

** *Palpes maxillaires plus grands, avancés.*

2. Psélaphe de Heis. *Psolaphus Heisei*. Latr.

Ps. rufo-castaneus, *pubescens*; *capite elongato*.

Psolaphus Heisei. Herbst. coléopt. 4. tab. 39. f. 9—10.

Habite en Allemagne.

3. Psélaphe plissé. *Psolaphus impressus*.

Ps. ater; *elytris abbreviatis rufis*; *thorace globoso, puncto utrinque impresso*; *pedibus fuscis*. P.

Panz. fasc. 89. tab. 10.

Habite aux environs de Paris, etc. Les élytres sont rouges, comme plissées à leur base.

SECONDE SECTION.

Trois articles à tous les tarses [les Trimères].

Les coléoptères *trimères* n'embrassent pas beaucoup plus de genres que les *dimères*; néanmoins un de leurs

genres, celui des coccinelles, est fort nombreux et pièces connues. Ainsi, déjà le second cadre comprend beaucoup plus de races que le premier ; en sorte qu'il verra de même les cadres suivans s'accroître en étendue par la quantité de genres et d'espèces qu'ils embrassent, et offrir dans le dernier, celui des pentamères les coléoptères les plus nombreux et les plus perfectionnés. Il semble que la nature ait une tendance à donner cinq articles à tous les tarses des coléoptères, et qu'elle n'ait pu l'exécuter que peu-à-peu. Je divise les coléoptères trimères de la manière suivante :

(1) Antennes plus longues que le corselet. Corps ovale ou oblong.

(a) Antennes velues vers le sommet. Tous les articles des tarses entiers.

Dasycère.

(b) Antennes non velues. Le pénultième article des tarses bilobé.

(-+) Antennes moniliformes ou filiformes.

Lycoperdine.

Endomygète.

(+++) Antennes terminées en massue : le troisième article plus long que le suivant.

Eumorphe.

(2) Antennes plus courtes que le corselet. Corps hémisphérique.

Coccinelle.

DASYCÈRE. (*Dasycerus*.)

Antennes grêles, plus longues que le corselet ; à cinq premiers articles globuleux, velus. Le chaperon avancé couvrant le dessus de la bouche.

Corps ovale, convexe. Le corselet hexagone, plus large que la tête, plus étroit que les élytres. Celles-ci embrassant l'abdomen.

Antennæ graciles, thorace longiores: articulis ultimis globulosis, hispidis. Clypeus porrectus, os supertergens.

Corpus ovale, convexum. Thorax hexagonus, capite lator, elytris angustior. Elytra abdomen obvolvunt.

OBSERVATIONS.

Le *dasycère* est un insecte fort petit, découvert par M. Alex. Brongniart, très-remarquable par ses antennes, et dont la forme du corps semble tenir des ténébrionites, mais qui paraît n'avoir que trois articles à tous les tarses.

ESPECE.

1. *Dasycère sillonné. Dasycerus sulcatus.*

Dasycerus. Brongn. Bullet. des sciences, n.º 39. p. 115. pl. 7: f. 5.

Habite aux environs de Paris. Il vit dans les bolets. Il paraît être aptère.

LYCOPERDINE. (Lycoperdina.)

Antennes moniliformes, grossissant un peu vers leur sommet. Mandibules simples. Palpes maxillaires filiformes.

Tête plus étroite que le corselet. Le corps ovale-allongé. Le pénultième article des tarses bilobé.

Antennæ moniliformes, sensum versus apicem sub-

inorassatæ. Mandibulæ simplices. Palpi maxillares filiformes.

Caput thorace angustius. Corpus ovato-elongatum. Tarsorum articulo penultimo bilobo.

OBSERVATIONS.

Les *lycoperdines* paraissent voisines des endomyques par leurs rapports ; mais elles s'en distinguent par leurs antennes , leurs palpes maxillaires et leurs mandibules. D'ailleurs elles ne vivent guères que dans les champignons.

ESPECES.

1. *Lycoperdine sans tache. Lycoperdina immaculata.*

L. nigro-brunnea, nitida, lavis, immaculata; antennis pedibusque piceo-rufis.

Léotr. gen. crust. et ins. 3. p. 73.

Endomychus bovista Fab. Oliv. col. 6. n.º 100. pl. 1. f. 4.

Panz. fasc. 8. f. 4.

Habite en Europe , dans le *lycoperdon bovista*.

2. *Lycoperdine à bande. Lycoperdina fasciata.*

L. rufa; elytris lævibus: macula magna fusca.

Endomychus fasciatus. Fab. 1. p. 505.

Oliv. col. 6. n.º 100. pl. 1. f. 5.

Habite en Europe.

ENDOMYQUE. (Endomychus.)

Antennes filiformes , grossissant légèrement vers leur sommet. Les palpes maxillaires plus gros à leur extrémité. Mandibules bifides ou bidentées au sommet.

Corps ovale-oblong. Corselet un peu rétréci antérieurement.

Antennæ filiformes , versus apicem paululum cras-

niores. *Palpi maxillares apice subcapitati. Mandibulæ apice bifido aut bidentato.*

Corpus ovato-oblongum. Thorax anticè sensim angustatus.

OBSERVATIONS.

Les *endomyques* se distinguent principalement des *lycoperdines* par leurs mandibules non simples au sommet, mais bifides ou à deux dents. On ne les confondra point avec les *eumorphes* dont les antennes sont terminées en massue.

ESPECE.

1. Endomyque écarlate. *Endomychus coccineus*.

E. niger, nitidus; thoracis limbo laterali coleoptrisque sanguineo-rubris, elytra singula maculis duabus nigris.
Latr.

Chrysomela coccinea. Lin.

Endomychus coccineus. Fab. Panz. fasc. 44. f. 17.

Latr. hist. nat. des crust. et des ins. vol. 11. pl. 93. f. 10.

Oliv. coléop. 6. n.º 100. pl. 1. f. 1.

Habite l'Europe boréale, les environs de Paris, sous l'écorce des bouleaux.

EUMORPHE. (*Eumorphus*.)

Antennes plus longues que le corselet, terminées en massue comprimée : leur troisième article beaucoup plus long que le suivant. Palpes maxillaires filiformes; les labiaux très-courts, terminés en bouton.

Corps ovale; corselet presque carré.

Antennæ thorace longiores, in clavam depressam terminatæ: earum articulo tertio sequente multò lon-

glore. *Palpi maxillares filiformes; labiales brevissimi, subcapitati.*

Corpus ovatum. Thorax subquadratus.

OBSERVATIONS.

Les *eumorphes* sont des insectes exotiques, très-rares, et qui avoisinent les coccinelles par leurs rapports. Mais leur corps n'est point hémisphérique, et leurs antennes, plus longues que le corselet, sont remarquables par la longueur de leur troisième article. On en connaît déjà plusieurs espèces.

ESPÈCES.

1. Eumorphe de Kirby. *Eumorphus Kirbyanus.*
Latr.

E. niger nitidus punctulatus; elytro singulo maculis duabus rufo-flavescentibus, sinuatis.

Eumorphus. Oliv. col. 6. n.º 99. pl. 1. f. 3.

Habite les Indes orientales.

2. Eumorphe immarginé. *Eumorphus immarginatus.*
Latr.

E. niger nitidus; elytro singulo maculis duabus flavis rotundatis.

Eumorphus immarginatus. Latr. gen. crust. et ins. 1. t. 11. f. 12.

Habite l'île de Sumatra, les Indes orientales.

3. Eumorphe marginé. *Eumorphus marginatus.*

E. ater; elytris marginatis violaceis: punctis duobus flavis. Fab.

Eumorphus marginatus. Oliv. col. 6. n.º 99. pl. 1. f. 4.

Habite les îles de la mer du sud. Labillardière.

COCCINELLE. (Coccinella.)

Antennes plus courtes que le corselet, terminées en

2. Quatre palpes, dont les maxillaires plus longs, 4^e article sécuriforme.

Prothorax hémisphérique, plus rarement obovale. Corps transverse, bordé ainsi que les élytres. Trois anneaux aux tarses.

Antennæ thorace breviores, clavæ terminatæ. Palpi quatuor; maxillaribus longioribus: articulo ultimo securiformi.

Prothorax hemisphæricum, rarius obovatum. Thorax transversus, marginatus, externo margine retrorotato. Elytra submarginata. Tarsi articulis

OBSERVATIONS.

Les coccinelles sont des insectes communs, connus de tout le monde, même des enfans, et que leur forme générale fait assez facilement distinguer des autres coléoptères.

Les insectes sont, la plupart, hémisphériques, planes dessous, convexes en dessus où ils sont lisses et ornés de couleurs vives et brillantes. Leur coloration consiste généralement en divers points épars, sur un fond vivant et également coloré.

Les coccinelles ont des rapports avec les chrysomèles; elles en sont bien distinguées par le caractère de leurs antennes, et en outre par celui de leurs tarses.

Les larves des coccinelles sont hexapodes, allongées, larges à leur partie antérieure, et se rétrécissent graduellement en pointe postérieurement. Elles sont grisâtres, à bandes bariolées ou panachées et marchent lentement. On trouve souvent sur les plantes chargées de pucerons, qu'elles s'en nourrissent principalement: ce sont des *divores*.

Les nymphes sont courtes, ridées transversalement, variées et tachetées de diverses couleurs. Elles sont inactives, et fixées sur des feuilles ou des branches, par une extrémité de leur corps.

Les espèces de ce genre sont fort nombreuses, mais difficiles à déterminer, parce qu'on est exposé à prendre des variétés pour des espèces. En effet, on trouve quelquefois en accouplement deux coccinelles qui paraissent différentes entre elles, et qu'on eût pris pour deux espèces en les voyant séparément.

ESPÈCES.

1. Coccinelle marginée. *Coccinella marginata*.

C. coleoptris rubris : *marginē nigro* ; *thoracē utrinque puncto marginali albo*. Fab. eleut. 1. p. 356.

Coccinella marginata. Lin. Oliv. col. 6. n.º 98. pl. 4. f. 45.

Habite l'Amérique méridionale.

2. Coccinelle sanguine. *Coccinella sanguinea*.

C. elytris sanguineis immaculatis ; *thoracis marginē punctisque duobus flavis*.

Oliv. col. 6. n.º 98. pl. 3. f. 24. a. b.

Coccinella sanguinea. Linn. Fab. eleut. 1. p. 358.

Habite l'Amérique méridionale.

3. Coccinelle bipoctué. *Coccinella bipunctata*.

C. elytris rubris : *punctis duobus nigris*.

Coccinella bipunctata. Lin. Fab. eleut. 1. p. 360.

Oliv. col. 6. n.º 98. p. 1002. pl. 1. f. 2. a. b.

Habite en Europe. Commune.

4. Coccinelle à cinq points. *Coccinella quinquepunctata*.

C. elytris rubris : *punctis quinque nigris*.

Coccinella quinquepunctata. Lin. Fab.

Oliv. coléopt. pl. 1. f. 3. a. b.

Habite en Europe, sur les plantes.

Coccinelle à sept points. *Coccinella septempunctata*.

C. elytris rubris : punctis septem nigris.

Coccinella septempunctata. Lin. Fab.

Geoff. ins. 1. p. 321. n.º 3. pl. 6. f. 1.

Habite en Europe. C'est la plus commune.

Etc.

TROISIÈME SECTION.

Quatre articles à tous les tarsi [les Tétramères].

Cette troisième section est beaucoup plus nombreuse genres et en espèces que les deux précédentes, et comprend tous les coléoptères qui ont généralement quatre articles à tous les tarsi. Tous ces insectes sont phytivores, vivent dans les bois, sur les plantes ou sur des champignons. Dans la plupart, les larves ont des pattes s-courtes, et souvent n'ont à la place que des maillons.

Si l'on observe, parmi les insectes de cette section, quelques familles assez naturelles et même fort remarquables, comme les *chrysomélides*, les *cérambiciens*, les *charançons*, il y en a d'autres qui sont plus obscures et presque hypothétiques ; l'on trouve même, parmi ces insectes, quelques genres singuliers qui semblent, en quelque sorte, isolés. Il en résulte qu'en général les coléoptères tétramères sont difficiles à étudier, à distribuer dans l'ordre de leurs rapports, et surtout à diviser convenablement, c'est-à-dire, sans surcharger la méthode

d'une multitude de petites divisions qui accroîtraient proportionnellement la difficulté de son usage.

Dans ma tendance à simplifier la méthode, tant que je le croirai possible, sans trop nuire à l'étude, je diviserai les tétramères en six coupes principales, dont quelques-unes me paraissent des familles naturelles, tandis que les autres n'en sont que de supposées et de provisoires : voici mes divisions.

DIVISION DES COLÉOP. TÉTRAMÈRES.

§. *Tête sans museau avancé.*

* Antennes de onze articles au moins, et toujours le troisième article des tarses bilobé.

(1) Antennes en massue perfoliée.

Les érotylènes.

(2) Antennes non en massue. Elles sont, soit sétacées, soit filiformes ou moniliformes, quelquefois grossissant un peu vers leur sommet.

(a) Antennes filiformes ou moniliformes, courtes en général. Lèvre inférieure non dilatée en cœur à son extrémité.

Les chrysomélines.

(b) Antennes longues et sétacées dans la plupart, quelquefois moniliformes. Lèvre inférieure dilatée en cœur à son extrémité.

Les cérambiciens.

** Antennes n'ayant pas en même temps onze articles et le troisième article des tarses bilobé.

(1) Troisième article des tarses entier.

Les corticicoles.

(2) Troisième article des tarses bilobé.

Les scolitaires.

SS. Tête ayant un museau avancé.

Les charansonites.

LES ÉROTYLÈNES.

Antennes en massue perfoliée. Une dent cornée au côté interne des mâchoires. Le troisième article des tarses bilobé.

Parmi les coléoptères tétramères, dont la tête n'offre point antérieurement un museau avancé, et dont le troisième article des tarses est divisé en deux lobes, tous ceux qui ont des antennes en massue perfoliée, constituent la famille des érotylènes.

La plupart de ces insectes ont le corps arrondi ou ovale, quelquefois hémisphérique, souvent même très-bombé ou gibbeux, rappellent l'aspect des coccinelles qui terminent la section précédente, et semblent annoncer le voisinage des chrysomélinés qui viennent effectivement après eux.

Voici comment l'on peut diviser les quatre genres qui se rapportent à cette famille.

(1) Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, transversal, semi-lunaire ou en hache.

Érotyle.

Triplax.

TRIPLAX. (Triplax.)

Antennes moniliformes, terminées en massue courte, subovale. Mâchoires à division intérieure membraneuse; une très-petite dent à leur sommet.

Corps, soit arrondi, soit ovale-oblong. Corselet convexe. Pattes à jambes élargies, en triangle allongé.

Antennæ moniliformes, in clavam brevem subovata terminatæ. Maxillæ processu interno membranaceo : dente minimo ad apicem.

Corpus vel rotundatum, vel ovato-oblongum. Thorax disco altiore. Pedes tibiis subdilatis, elongato-trigonis.

OBSERVATIONS.

Fabricius a donné le nom de tritomes à ceux de ces insectes qui ont le corps arrondi; ce ne sont pas les tritomes de *Geoffroy*. Quant à ceux qui ont le corps ovale ou oblong, il les a nommés *triplax*. Il convient de réunir les uns et les autres en un seul genre, comme l'a fait *M. Latreille*.

On sent que les *triplax* avoisinent les érotyles par leurs rapports; mais ils ont la massue des antennes plus courte, ovale ou presque ronde. Leurs pattes ont les jambes moins grêles, un peu élargies. Ces insectes vivent dans les bolets sessiles qui naissent sur les troncs d'arbres, ou sous l'écorce des arbres.

ESPÈCES.

1. *Triplax bipustulé. Triplax bipustulatum.*

T. ovato-rotundatum, nigrum, nitidum; elytris maculæ baseos sanguineæ.

Tritoma bipustulatum. Fab. Latr.

Triplax bipustulata. Oliv. col. 5. n.° 89. pl. 1. f. 5.

Habite en Europe, dans les bolets.

Triplax nigripenne. *Triplax nigripenne*.

T. oblongum, rufum; antennis elytris pectoroque nigris.

Silpha russica. Lin.

Triplax russica. Fab. Oliv. col. 5. n.° 89. p. 491.

Et érotyle. pl. 1. f. 1.

Panz. fasc. 50. f. 7.

Habite en Europe, sur les arbres.

LANGURIE. (*Languria*.)

Antennes à massue perfoliée, oblongue, comprimée, de 7 articles. Mandibules bifides au sommet. Palpes maxillaires subfiliformes, à dernier article plus épais, allongé. Corps linéaire; corselet en carré long, marginé.

Antennæ in clavam perfoliatam, oblongam, compressam, quinque-articulatam terminatæ. Mandibulæ bífido. Palpi maxillares subfiliformes: articulo ultimo crassiore, longiore.

Corpus lineare. Thorax elongato-quadratus, marginatus.

OBSERVATIONS.

Les *languries* sont des insectes exotiques, à corps allongé, étroit, presque linéaire; à antennes à peine plus longues que le corselet. Le pénultième article de leurs antennes est bilobé. Malgré leur forme allongée, on sent que ces insectes tiennent aux érotylènes par leurs rapports.

ESPÈCES.

Langurie bicolore. *Languria bicolor*.

L. rufa; elytris æneis punctatis: punctis in strias digestis.

Tom. IV.

Languria bicolor. Lat. gen. crust. et ins. 1. tab. 11. f. 11.

Et vol. 3. p. 65. Oliv. col. 8. n.° 88. pl. 1. f. 1.

Trogosita bicolor. Fab. eleut. 1. p. 152.

Habite l'Amérique septentrionale. Bosc.

2. Langurie de Mozard. *Languria Mozardi*.

L. rubra; *elytris nigris punctatis* : *punctis per series distinctis*.

Languria Mozardi. Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 66.

Habite l'Amérique septentrionale. Mozard.

3. Langurie allongée. *Languria elongata*.

L. elongata, *ferruginea*; *capite elytrisque cyaneis*.

Trogosita elongata. Fab. eleut. 1. p. 152.

Habite l'île de Sumatra.

4. Langurie filiforme. *Languria filiformis*.

L. elongata, *ferruginea*; *anteanis pedibusque nigris*.

Trogosita filiformis. Fab. eleut. 1. p. 152.

Habite l'île de Sumatra.

PHALACRE. (Phalacrus.)

Antennes à massue oblongue, de trois articles : dernier allongé, ovale ou conique. Mandibules étroites arquées, bidentées au sommet. Palpes subfiliformes.

Corps presque hémisphérique ou ovale, très-lisse. Coxétole ayant des angles aigus.

Antennæ clavæ oblongæ, triarticulatæ : *articulo ultimo elongato, ovali aut conico. Mandibulæ angustæ arcuatæ, apice bidentatæ. Palpi subfiliformes.*

Corpus subhemisphæricum aut ovatum, lævissimum. Thorax angulis acutis.

OBSERVATIONS.

On rencontre les *phalacres* sur les fleurs composées semi-flosculeuses, et sous les écorces d'arbres. Leur cor

ovale ou presque hémisphérique, très-bombé et fort épais. Le troisième article de leurs tarses est bilobé, comme les autres érotylènes.

ESPECES.

Phalacre bicolor. *Phalacrus bicolor.*

Ph. niger, ovatus; elytris apice punctis duobus rubris.

Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 66.

Anthrabe à deux points rouges. Geoff. 1. p. 308.

Anthrabe bimaculé. Oliv. Encycl. n.º 5.

Antsostoma bicolor. Fab. éleut. 1. p. 100.

Habite en Europe, sur les fleurs du pissenlit.

Phalacre pédiculaire. *Phalacrus pedicularius.*

Ph. ovatus, niger, immaculatus; elytris lævibus.

Anthribus pedicularius. Oliv. Encycl. n.º 6.

Nitidula pedicularia. Fab. éleut. 1. p. 352.

Habite en Europe, sur les fleurs.

Phalacre marbré. *Phalacrus marmoratus.*

Ph. ovatus, niger; elytris striatis, rubro nigroque marmoratis.

Anthribus. Geoff. ins. 1. p. 306. n.º 1. pl. 5. f. 3.

Anthribus marmoratus. Oliv. Encycl. n.º 8.

Habite en Europe, sur les fleurs de la jacinthe.

LES CHRYSOMÉLINES.

Antennes non en massue : elles sont filiformes ou moniliformes. Lèvre inférieure non dilatée en cœur à son extrémité.

Les chrysomélines sont, en général, des insectes de petite taille, ayant la tête en partie enfoncée dans le corselet; des couleurs assez vives, quelquefois brillantes; les antennes courtes ou de longueur médiocre, filiformes ou moniliformes, s'épaississant quelquefois un peu

Tête cachée sous le corselet, on recense dans une échancrure de sa partie antérieure. Le corps suborbiculaire, déprimé, clypéiforme, bordé tout autour.

Antennæ submoniliformes, extrorsum sensim subcrassiores, basi approximatae, Os inferum. Palpi breves.

Caput sub thorace absconditum aut in illius incisura antice receptum. Corpus suborbiculare, depressum, clypeiforme, ad periphœriam marginatum.

OBSERVATIONS.

On reconnaît facilement les *cassides* au premier aspect. Leur corps large, presque orbiculaire, déprimé, a, en quelque sorte, la forme d'un bouclier ou d'une petite tortue. Il est souvent un peu relevé au milieu du dos, et se trouve bordé ou dépassé tout autour par le corselet et les côtés des élytres. Fabricius a fait son genre *imatidium* avec les espèces qui ont le corselet échancré antérieurement.

Les larves des *cassides* sont très-singulières : elles ont six pattes, le corps large, court, aplati, bordé sur les côtés d'appendices branchus, subépineux. Leur queue se recourbe en dessus, se termine en fourche, et soutient les exorémens de l'animal dont il se fait une espèce de parasol.

En Europe, on rencontre ces insectes sur les chardons, les plantes à feuilles verticillées et rubiacées [*gallii*], et sur une inule d'automne ; mais on n'y en connaît que très-peu d'espèces. Dans les pays étrangers, au contraire, surtout dans l'Amérique et dans l'Inde, on en trouve un assez grand nombre et de fort belles.

ESPECES.

2. Casside verte. *Cassida viridis*.

C. viridis, pedibus pallidis : femoribus nigris.

Cassida viridis. Lin. Fab. éleut. 1. p. 387.

Oliv. col. 6. n.º 97. p. 975. pl. 2. f. 29.

Panz. fasc. 96. f. 4.

Habite en Europe ; sur les chardons.

2. Casside équestre. *Cassida equestris*.

C. viridis, elytrorum basi strigâ argenteâ, abdomine nigro :
margine pallido.

Cassida equestris. Fab. éleut. 1. p. 388.

Oliv. coléopt. 6. n.º 97. pl. 1. f. 3.

Habite en Europe, sur la menthe aquatique.

3. Casside noble. *Cassida nobilis*.

C. grisea, elytris lineâ cæruleâ nitidissimâ. F.

Cassida nobilis. Lin. Fab. éleut. 1. p. 396.

Oliv. col. 6. n.º 97. pl. 2. f. 24.

Panz. fasc. 39. t. 15.

Habite en Europe, sur les plantes verticillées.

Etc. Presque toutes les autres espèces connues sont exotiques.

CHRYSOMÈLE. (*Chrysomela*.)

Antennes moniliformes, grossissant un peu vers leur sommet, écartées, insérées devant les yeux. Mandibules courtes, crochues ; mâchoires bilobées. Quatre palpes, à dernier article plus gros, subtronqué.

Corps ovale, quelquefois presque orbiculaire, épais, convexe. Corselet large, subtransverse.

Antennæ moniliformes, sensim extrorsum crassiores, remotæ, antè oculos insertæ. Mandibulæ bre-

ves, uncinatæ; maxillæ bilobæ. Palpi quatuor: articulo ultimo crassiore, subtruncato.

Corpus ovatum, interdum suborbiculare, crassum, convexum. Thorax subtransversus.

OBSERVATIONS.

Les couleurs brillantes dont sont parées la plupart des *chrysomèles* ont fait donner à ce genre le nom qu'il porte. Sur plusieurs, en effet, le vert-doré, le bleu, l'azur, l'écarlate, etc., brillent avec beaucoup d'éclat. Ces insectes néanmoins sont de moyenne taille. Leur corps est ovale, quelquefois presque hémisphérique, convexe en dessus, glabre, souvent lisse et même luisant.

Les *chrysomèles* ne sont pas sans rapports avec les érytyles, les coccinelles et les cassides, dont néanmoins elles sont très-distinctes. Mais elles en ont de plus grands avec les galéruques, les gribouris, les clythres et les altises.

La tête des *chrysomèles* est légèrement inclinée et un peu enfoncée dans le corselet, beaucoup moins cependant que dans les gribouris.

Le corselet est, en général, plus large que long et un peu bordé; mais les élytres ne le sont pas. Le pénultième article des tarses est constamment bilobé.

Les *chrysomèles* vivent sur les herbes et sur les arbres se nourrissent de leurs feuilles et y déposent leurs œufs. Plusieurs espèces aiment à vivre en société sur une même feuille qu'elles rongent en compagnie.

Ce genre est nombreux en espèces, quoiqu'il ait été fort réduit de l'état où on l'avait d'abord institué.

E S P E C E S.

1. *Chrysomèle ténébrion. Chrysomela tenebricosa.*

C. ovata, aptera, atra; thorace elytrisque lævibus; antennis pedibusque violaceis. Oliv. diet. 5. n.º 1. p. 689.

Coléopt. 5. p. 508. pl. 1. f. 11.

Tenebrio lœvigatus. Lin.

Chrysomela tenebricosa. Fab. Panz. fasc. 44. t. 1.

Habite en Europe. Commune en France.

Chrysomèle violette. *Chrysomela violacea*.

C. ovata, cyanea, nitida; thorace elytrisque subtilissimè punctatis.

Oliv. coléopt. pl. 6. f. 82.

Chrysomela violacea. Panz. fasc. 44. tab. 8.

Habite en France, en Allemagne, sur les saules.

Chrysomèle céréale. *Chrysomela cerealis*. L.

C. ovata, rubro-ænea; thorace elytrisque vittibus cæruleis.

Chrysomela cerealis. Lin. Fab. éleut. 1. p. 439.

Oliv. coléopt. 5. n.º 91. p. 545. pl. 7. f. 104.

Panz. fasc. 44. t. 11.

Habite en Europe, sur les genets.

Chrysomèle du peuplier. *Chrysomela populi*.

C. ovata; thorace cærulescente; elytris rubris, apice fuscis.

Chrysomela populi. Lin. Fab. éleut. 1. p. 433.

Oliv. coléopt. pl. 7. f. 110.

Habite en Europe, sur le peuplier.

Chrysomèle sanguinolente. *Chrysomela sanguinolenta*.

C. atra; elytris punctatis; margine exteriori sanguineo.

Chrysomela sanguinolenta. Lin. Fab. éleut. 1. p. 441.

Geoff. ins. 1. p. 259. tab. 4. f. 7.

Oliv. coléopt. pl. 1. f. 8. Panz. fasc. 16. t. 10.

Habite en Europe, dans les bois.

Etc.

G R I B O U R I. (Cryptoccephalus.)

Antennes filiformes, simples, aussi longues ou plus longues que le corselet, à articles oblongs. Division

externe des mâchoires plus grande que l'interne. Palpes courts.

Corps subcylindracé ; corselet bombé ou très-convexe. Tête penchée presque verticalement, enfoncée et en partie cachée sous le corselet.

Antennæ filiformes, simplices, thoracis longitudine vel thorace longiores; articulis oblongis. Maxilla processu externo interno majore. Palpi breves.

Corpus subteret. vel ovato-cylindricum: thorax valdè convexus. Caput ad perpendicularum ferè nutans, thoraci partim intrusum.

OBSERVATIONS.

Les gribouris ont de grands rapports avec les chrysomèles, ce qui est cause que Linné ne les en a point distingués. Néanmoins ils en diffèrent, 1.^o par leurs antennes filiformes, non grenues, mais à articles oblongs; 2.^o par leur corps presque cylindrique ou à-peu-près de même largeur d'un bout à l'autre; 3.^o en ce que leur corselet n'est point bordé, et surtout en ce que leur tête, au lieu d'être avancée ou saillante, est très inclinée en bas, forme presque un angle droit avec l'axe du corps, et ne paraît presque point lorsqu'on regarde l'animal en dessus. Je n'en distingue point les eumolpes, les colapses, ni même les chlamydes, quoique celles-ci aient les antennes un peu courtes et légèrement en scie.

Les gribouris sont la plupart ornés de couleurs assez brillantes. Ils vivent sur les plantes, et leurs larves y font quelquefois beaucoup de dégâts, en rongant les jeunes pousses à mesure qu'elles se développent.

ESPÈCES.

Gribouri de la vigne. *Cryptocephalus vitis*.

C. niger, pubescens, punctulatus; elytris brunneo-sanguineis.

Cryptocephalus vitis. Oliv. col. n.º 96. pl. 1. f. 9. *Eumolpus*, ibid. p. 911.

Eumolpus vitis. F. éleut. 1. p. 422.

Panz. fasc. 89. f. 12.

Habite la France et l'Europe australe, sur la vigne.

Gribouri soyeux. *Cryptocephalus sericeus*.

C. aurato-viridis, nitidus, punctulatus; elytris rugosulis; antennis nigris.

Chrysomela sericea. Ltn.

Cryptocephalus sericeus. Fab. Oliv. Latr.

Habite en Europe, sur les saules, les fleurs semi-flosculeuses.

Gribouri cordigère. *Cryptocephalus cordiger*.

C. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.

Chrysomela cordigera. Ltn.

Cryptocephalus cordiger. Fab. éleut. 2. p. 44.

Oliv. coléop. 6. n.º 96. p. 793. pl. 4. f. 57. Panz. fasc. 13. t. 6.

Habite en Europe.

Gribouri du coudrier. *Cryptocephalus coryli*.

C. niger; thorace elytrisque testaceis; sutura nigra.

Cryptocephalus coryli. Fab. éleut. 2. p. 45.

Panz. fasc. 68. t. 6. Oliv. col. pl. 4. f. 60.

Habite en Europe, sur le noisetier.

Etc.

CLYTHRE. (Clythra.)

Antennes filiformes, en scie d'un côté, à peine la longueur du corselet. Mandibules avancées, bidentées au sommet.

Tête penchée, enfoncée dans le corselet. Corps acylindrique, court.

Antennæ filiformes, hinc serratæ, breves, vix thoracis longitudine. Mandibulæ apice bidentatæ, sæpius porrectæ.

Caput nutans, thoraci intrusum. Corpus cylindraceum, breve.

OBSERVATIONS.

Ces coléoptères ont été confondus avec les chrysomèles par Linné, et avec les gribouris par Fabricius, dans ses premiers ouvrages. Laicharting et, depuis, les autres entomologistes, en ont formé un genre particulier, sous le nom de *clythre*. Geoffroy avait, le premier, reconnu ce genre, et lui avait donné le nom de *melolontha*; nom que l'on a depuis attribué au genre des hannetons.

Les *clythres* se reconnaissent aisément au caractère de leurs antennes, et à leurs mandibules grandes, quelquefois très-avancées. Ces insectes fréquentent les fleurs. On en trouve assez souvent sur le chêne.

ESPÈCES.

1. Clythre taxicorne. *Clythra taxicornis*.

C. obscurè cyanea; elytris testaceis immaculatis; antennis elongatis; serratis.

Clythra taxicornis. Fab. éleut. 2. p. 34.

Oliv. coléopt. n.º 96. p. 843. (Gribouri. pl. 1. f. 2.)

Habite le midi de la France, l'Italie.

2. Clythre à quatre points. *Clythra quadripunctata*.

C. nigra, elytris rubris: punctis duobus nigris.

Chrysomela quadripunctata. Lin.

Melolontha. Geoff. ins. 1. p. 195. tab. 3. f. 4.

Oliv. coléopt. 6. n.º 96. p. 850. (Gribouri. pl. 1. f. 1.)

Habite en Europe, sur les fleurs de différents arbres.

3. Clythre longipède. *Clythra longipes*.*C. elytris rabro-latescentibus : maculis tribus nigris.**Clythra longipes*. Fab. éleut. 2. p. 28.

Oliv. col. 6. n.° 96. p. 845. pl. 1. f. 13.

Habite en Europe, sur le noisetier.

Etc.

GALÉRUQUE. (*Galeruca*.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet, très-rapprochées à leur base. Mâchoires à deux divisions presque égales en longueur : l'extérieure plus grêle. Le dernier article des palpes de la grandeur des autres, quelquefois plus court.

Corps oblong ; corselet court.

Antennæ filiformes, thorace longiores, basi valde approximatae. Maxillæ processibus duobus subæquæ longis : externo graciliore. Palporum articulus ultimus aliis magnitudine similis, interdum brevior.

Corpus oblongum. Thorax brevis.

OBSERVATIONS.

Les galéruques tiennent encore aux chrysomèles par leurs rapports ; mais elles ont les antennes moins grêues, plus longues que la moitié du corps, insérées entre les yeux, et par suite très-rapprochées à leur base. Leur corps d'ailleurs est oblong à corselet un peu plus étroit antérieurement. On pourrait les confondre avec les altises ; mais leurs cuisses postérieures ne sont point renflées, et ces insectes ne sautent point.

La démarche des galéruques est lente ainsi que celle des chrysomèles. Au lieu de se servir de leurs ailes lorsqu'ils se

croient menacés, ces insectes se laissent tomber et demeurent sans mouvement. Leurs larves ont à-peu-près les mêmes habitudes que celles des chrysomèles, et vivent sur les plantes.

ESPÈCES.

1. Galérinque de la tannisia. *Galeruca tanacetii*.

G. nigra, punctata; elytris coriaceis.

Chrysomela tanacetii. Lin.

Galeruca tanacetii. Fab. éleut. 1. p. 481.

Oliv. coléopt. 6. n.º 93. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe, sur la tanaïse.

2. Galérinque de l'orme. *Galeruca calvariensis*.

*G. ovato-oblonga, cinereo-lutescens; elytris vittâ limbo-
ldque baseos nigris.*

Chrysomela calvariensis. Lin.

Galeruca calvariensis. Fab. éleut. 1. p. 483.

Oliv. col. 6. pl. 3. f. 37.

Habite en Europe, sur l'orme dont elle détruit les feuilles.

3. Galérinque sanguine. *Galeruca sanguinea*.

G. capite thorace elytris que rubris, punctatis nigro-maculatis.

Galeruca sanguinea. Fab. Oliv. coléopt. n.º 93. pl. 3.
f. 41.

Panz. fasc. 102. t. 8.

Habite en Europe, sur différens arbres.

Etc.

ALTISE. (Altica.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet, rapprochées à leur base. Mandibules terminées par deux dents. Palpes inégaux.

Tête petite, plus étroite que le corselet. Corps ovale-oblong. Pattes postérieures à cuisses renflées, propres à sauter.

Antennæ filiformes, thorace longiores, basi approximatae. Mandibulae apice bidentatae. Palpi incrassales.

Caput parvum, thorace angustius. Corpus ovato-longum. Pedes postici femoribus incrassatis saltatorius.

OBSERVATIONS.

Quelques rapports qu'aient les *altises* avec les galérinques, on doit les en distinguer, puisqu'elles ont la faculté de sauter, et qu'on en juge facilement au renflement des cuisses postérieures de l'insecte. Les altises sont, en général, petites, et font beaucoup de tort aux plantes. On les nomme vulgairement *puces* des jardins. On en connaît un assez grand nombre d'exotiques.

ESPECES.

1. Altise des jardins. *Altica oleracea*.

A. viridi-ænea; elytris punctatis.

Chrysomela oleracea. Lin. Altise bleue. Geoff. 1. p. 245.

Galeruca oleracea. Fab. Eleut. 1. p. 498.

Panz. fasc. 21. f. 1. *Altica*, n.º 66. Oliv. coléopt. 6. p. 705.

Habite en Europe, dans les jardins, sur les choux, les navets, etc.

2. Altise testacée. *Altica testacea*.

A. ovalis, convexa, testaceo-rubra; elytris punctulatis.

Altica testacea. Oliv. col. 6. n.º 93. bis. p. 696. pl. 3. f. 49.

Panz. fasc. 21. f. 13.

Habite en Europe.

3. Altise rubis. *Altica nitidula*.

A. nitidula, ovato-oblonga, viridis; nitens; capite thoraceque aureis; pedibus ferrugineis. Ol.

Chrysomela nitidula. Lin.

Altica nitidula. Oliv. col. 6. p. 713. pl. 5. f. 8a.

Habite en Europe, sur le saule.

Etc.

HISPE. (Hispa.)

Antennes filiformes, avancées antérieurement, rapprochées à leur insertion.

Tête entièrement découverte. Corps allongé. Collet presque carré ou en trapèze, un peu plus étroit que les élytres. Abdomen oblong. Elytres couvrant et brassant l'abdomen, arrondies ou presque tronquées à l'extrémité.

Antennæ filiformes, antice porrectæ, basi approximatæ.

Caput penitus exsertum. Corpus elongatum. Thorax subquadratus aut trapeziformis, elytris parvis angustior. Abdomen oblongum. Elytra abdomen tegentia amplectantiaque, apice rotundata aut truncata.

OBSERVATIONS.

Les hispes, par leur corps allongé et comme en pointe antérieurement, semblent se rapprocher des criocètes. Les uns ont le corps hispide, presque épineux, tandis que les autres ont le corps lisse; on les a distingués sous les noms d'*hispes* et d'*alurnes*.

ESPECES.

1. Hispe noir. *Hispa atra*.

H. atra; thorace antice spinoso, lateribus marginibus dilutis; elytris striato-punctatis, spinosis.

Hispa atra. Lin. Panz. fasc. 96. f. 8a.

Hispa spinosa. Fab. élent. 2. p. 58.

Habite en Europe, sur les graminées.

2. Hispe testacé. *Hispa testacea*. L.

H. testacea, spinosa; antennis aculeisque nigris.

Hispa testacea. Fab. élent. 2. p. 59.

Oliv. coléopt. 6. n.º 95. p. 762. pl. 1. f. 7.

Habite le midi de la France, l'Italie, etc.

3. Hispe sanguinicolle. *Hispa sanguinicollis*. L.

H. nigra; thorace elytrorumque basi sanguinis; elytris apice serratis.

Hispa sanguinicollis. Fab. élent. 2. p. 60.

Oliv. coléopt. pl. 1. f. 72. *Alurnus*. Latr.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles.

Etc.

CRIOCÈRE. (Crioceris.)

Antennes filiformes ou submoniliformes, moins longues que le corps, rapprochées à leur base. Mandibules et mâchoires bifides. Palpes filiformes. Les yeux échanerés.

Corps oblong; corselet étroit; abdomen en carré long, obtus à l'extrémité.

Antennæ filiformes aut submoniliformes, corpore breviores, basi approximatae. Mandibulae maxillaeque bifidae. Palpi filiformes. Oculi emarginati.

Corpus oblongum. Thorax angustus [elytris angustior]. Abdomen elongato-subquadratum, apice obtusum.

OBSERVATIONS.

Les *criocères* sont des chrysomélines allongées, qui commencent, en quelque sorte, à annoncer le voisinage des cérambiens. Ils ont les yeux saillans et échancrés; le

corps allongé , glabre , lisse ; le corselet immarginé , sub-cylindrique , toujours plus étroit que les élytres ; enfin , la plupart sont ornés de couleurs brillantes.

Ces insectes ont la démarche lente , sont en général petits , portent leurs antennes dirigées en avant , et ont le pénultième article des tarses bilobé. On les rencontre sur les fleurs des jardins , des prés et des campagnes. Leurs larves sont courtes , assez grosses ou ramassées , et se couvrent le dos de leurs excréments pour se garantir de l'action du soleil et des intempéries de l'air.

ESPÈCES.

1. Criocère du lis. *Crioceris merdigera*.

C. nigra ; thorace élytrisque rubris.

Crioceris merdigera. Lin. Criocère rouge. Geoff. n.º 1.

Crioceris merdigera. Oliv. col. 6. n.º 94. p. 732. pl. 1. f. 8.

Panz. fasc. 45. t. 2.

Habite en Europe , sur le lis. Les élytres sont striées.

2. Criocère de l'asperge. *Crioceris asparagi*.

C. thorace rubro ; élytris flavidulis : crute punctisque quatuor nigris.

Chrysomela asparagi. Lin. *Lema asparagi*. Fab. Eleut.

Panz. fasc. 71. t. 2.

Crioceris asparagi. Oliv. col. 6. p. 744. pl. 2. f. 28.

Habite en Europe , sur l'asperge.

Etc.

DONACIE. (Donacia.)

Antennes filiformes , plus longues que le corselet , à articles inégalement allongés. Mandibules bidentées au sommet. Mâchoires bifides. Les yeux entiers.

Corps allongé , brillant. Pattes postérieures à cuisses un peu renflées.

Antennæ filiformes , thorace longiores ; articulis

inæqualiter elongatis. Mandibulæ apice bidentatæ. Maxillæ bifidæ. Oculi integri.

Corpus elongatum, colore metallico sæpius nitidum. Pedes postici femoribus incrassatis, subclavatis.

OBSERVATIONS.

Les *donacies* paraissent se rapprocher des *sagres* par leurs couleurs brillantes et métalliques et même un peu par le renflement des cuisses de leurs pattes postérieures. Mais elles s'en distinguent par leurs mandibules bidentées au sommet, et par leur corps plus étroit. Ces insectes vivent la plupart sur des plantes aquatiques.

ESPÈCES.

1. Donacie de la sagittaire. *Donacia sagittariæ.*

D. viridi-aurea; elytris striatis; femoribus posticis denticatis.

Donacia sagittariæ. Fab. *flor.* 2. p. 128.

Panz. fasc. 29. t. 7. Oliv. col. 4. n.º 75. pl. 1. f. 4. a. b. c.

Habite en Europe, sur les plantes aquatiques.

2. Donacie clavipède. *Donacia clavipes.*

D. viridi-aurea; abdomine argenteo sericeo; femoribus posticis longis, clavatis inermibus. Ol.

Donacia clavipes. Fab. *flor.* 2. p. 128.

Oliv. col. 4. n.º 75. pl. 1. f. 6. a. b.

Donacia menyanthidis? Panz. fasc. 29. t. 13.

Habite en Europe, sur les plantes aquatiques.

Etc.

S A G R E. (Sagra.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet ou un peu plus, insérées devant les yeux. Palpes filiformes. Mandibules entières à leur pointe. Les yeux échancrés.

Corps oblong, brillant. Pattes postérieures très-grandes, à cuisses épaisses, fortes et dentées.

Antennae filiformes, thoracis longitudine vel ultra, ante oculos insertæ. Palpi filiformes. Mandibula acumine simplici terminatæ. Oculi emarginati.

Corpus oblongum, colore metallico nitidum. Pedes postici maximi, femoribus incrassatis, validis, subdentatis.

OBSERVATIONS.

Les *sagres* sont des insectes étrangers à l'Europe, qui sont très-voisins des *donaciers* par leurs rapports, mais qui s'en distinguent par leurs mandibules entières à leur pointe, et peut-être même par leurs cuisses postérieures qui sont en général épaisses et dentées.

ESPECE.

1. *Sagra fémorale. Sagra femorata.*

S. viridi-anea; femoribus tibiisque posticis dentatis.

Sagra femorata. Fab. élém. 2. p. 26.

Oliv. col. 5. n.º 90. p. 497. pl. 1. f. 1.

Habite aux Indes orientales, en Afrique.

Voyez pour les autres espèces, Fab. élém. vol. 2. p. 27. et

Oliv. col. 5. n.º 90.

— Les *mégaloques* ayant les mandibules entières à leur pointe, comme les *sagres*, mais en étant très-distinctes, appartiennent à cette division des *criocérides*.

Voyez Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 45. et Oliv. col. 6. n.º 96. bis. p. 917.

LES CÉRAMBICIENS.

La lèvre inférieure évasée en cœur à son extrémité;
les antennes longues, sétacées ou filiformes dans la plupart.

Les *cérambiciens* constituent, parmi les coléoptères,

une famille naturelle, très-remarquable par ses caractères généraux, et qui, comme toutes les autres, ne se lie et ne semble se confondre avec les familles avoisinantes, que vers ses limites.

En général, les cérambiciens se font remarquer par un corps allongé, des antennes longues, sétacées ou filiformes, et souvent par des yeux échancrés en forme de rein, qui embrassent la base des antennes.

Ces tétramères ont le troisième article des tarses bilobé, comme dans les chrysomélides, mais leur lèvre inférieure offre une languette fortement évasée en cœur à son extrémité. Les autres articles des tarses sont spongieux, et comme garnis de pelottes en dessous. Tous ces insectes sont phytophages, et dans la plupart les larves ne vivent que de la substance du bois : elles font beaucoup de tort aux arbres, surtout celles des grandes espèces.

DIVISION DES CÉRAMBICIENS.

* *Antennes longues, sétacées ou filiformes.*

(i) Lèvre supérieure très-apparée.

(a) Antennes insérées hors des yeux. Les yeux entiers ou très-peu échancrés.

(+) Corselet mutique.

Lepture.

(++) Corselet épineux ou tuberculeux.

Stencore.

(b) Antennes insérées dans une échancrure des yeux.

(a) Tête inclinée verticalement en bas.

(+) Corselet épineux ou tuberculeux.

Lamie.

(+ +) Corselet mutique, n'ayant ni épines ni tubercules.

Saperda.

(b) Tête en avant, mais un peu penchée.

(+) Elytres, soit plus courtes que l'abdomen, soit longues et rétrécies en pointe postérieurement, ne recouvrant pas complètement les ailes.

Nécydale.

(+ +) Elytres non subulées postérieurement, recouvrant complètement l'abdomen et les ailes.

(*) Corselet mutique, arrondi ou globuleux.

Callidie.

(*) Corselet épineux ou tuberculeux ou très inégal sur les côtés.

Capricorne.

(2) Lèvre supérieure nulle ou non apparente. Les bords du corselet tranchants, dentés, inégaux.

Prione.

** *Antennes courtes, moniliformes.*

(1) Corselet presque orbiculaire. Corps allongé, convexe.

Spondylide.

(2) Corselet carré. Corps allongé, déprimé.

Parandre.

LEPTURE. (Leptura.)

Antennes filiformes, insérées hors des yeux et entre eux. Les yeux entiers ou très - peu échancrés. Mandibules entières; mâchoires bifides. Le dernier article des palpes ovale, subcomprimé.

Tête penchée. Corselet mutique, rétréci antérieure-

ment. Corps allongé ; élytres se rétrécissant vers leur extrémité dans la plupart.

Antennæ filiformes , extrâ oculos interque eos insertæ. Oculi integri, vix lunati. Mandibulæ indivisæ ; maxillæ bifidæ. Palporum articulus ultimus ovatus, subcompressus.

Caput nutans. Thorax muticus , antice angustior. Corpus elongatum ; elytra versùs extremitatem sensim angustata in plurimis.

OBSERVATIONS.

Les *leptures* et les *stencores* sont remarquables en ce que leurs antennes ne sont point insérées dans les yeux , c'est-à-dire , n'ont point leur base entourée d'un côté par les yeux , ce qui les réunit sous ce rapport : aussi M. Latreille ne sépare point ces deux genres. Nous ne l'imitons pas ici , parce qu'il est dans nos principes que partout, lorsque les espèces sont très-nombreuses , des distinctions génériques sont utiles , dès qu'on trouve les moyens d'en établir.

Ainsi les *leptures*, dont il s'agit ici , sont distinguées de nos *stencores* , en ce que leur corselet est mutique , c'est-à-dire , n'offre ni épines, ni tubercules. Ce sont les mêmes que celles de Fabricius et d'Olivier.

Beaucoup de *leptures* sont indigènes de l'Europe ; les autres sont exotiques. On croit que leur larve se nourrit de la substance du bois , ou de la racine des végétaux vivaces.

E S P È C E S.

1. *Lepture mélanure. Leptura melanura.*

L. nigra ; elytris rubescentibus lividisque : suturâ apiceque nigris.

Leptura melanura. Lin. Fab. élent. 2. p. 355.

Stencorus. Geoff. 1. p. 226. n.º 7. pl. 4. f. 1.

Oliv. col. 4. n.º 73. pl. 1. f. 6. Panz. fasc. 69. t. 19.

Habite aux environs de Paris.

2. Lepture rouge. *Leptura rubra*.

L. nigra; thorace elytris tibiisque purpureis.

Leptura rubra. Lin. Fab. éleut. 2. p. 357.

Panz. fasc. 69. t. 11. Oliv. col. 4. 73. pl. 2. f. 15.

Habite en Europe.

3. Lepture testacée. *Leptura testacea*.

L. nigra; elytris testaceis; tibiis rufis; thorace posticè rotundato.

Leptura testacea. Lin. Fab. éleut. 2. p. 357.

Panz. fasc. 69. t. 12.

Habite en Europe.

4. Lepture noire. *Leptura nigra*.

L. elytris attenuatis; corpore nigro, nitido; abdominis rubro.

Leptura nigra. Lin. Fab. éleut. 2. p. 369.

Panz. fasc. 69. t. 18.

Habite en Europe.

Etc.

STENCORE. (Stencorus.)

Antennes sétacées ou filiformes, insérées hors des yeux et devant eux. Les yeux sans échancrure. Mandibules entières; mâchoires à deux lobes. Palpes inégaux, à dernier article plus gros, tronqué.

Corselet épineux ou tuberculeux latéralement.

Antennæ setaceæ vel filiformes, extrà et antè oculos insertæ. Oculi integri. Mandibulæ indivisæ; maxillæ bilobæ. Palpi inæquales, articulo ultimo crassiore, truncato.

Thorax spinosus aut tuberculatus ad latera.

OBSERVATIONS.

Les *stencores*, comme les leptures, n'ont point les antennes insérées dans les yeux, mais elles en sont séparées posées devant. Ainsi ces deux genres diffèrent à cet égard des autres cérambiciens. Mais les *stencores* sont distingués des leptures par leur corselet non mutique, étant muni sur ses côtés d'épines ou de tubercules. Cette distinction me paraît suffisante, et je la trouve utile, chacun de ces genres ayant beaucoup d'espèces.

Geoffroy a établi ce genre et l'a déterminé à-peu-près par les mêmes caractères, en y ajoutant la considération des antennes qui vont en se rétrécissant vers leur extrémité, ce qui a aussi lieu dans les leptures.

Les larves des *stencores*, comme la plupart de celles de cette famille, habitent, en général, dans l'intérieur des arbres.

ESPÈCES.

Stencore inquisiteur. *Stencorus inquisitor*.

S. niger, villosus; thorace spinoso; elytris nebulosis, fusco-subfasciatis.

Cerambyx inquisitor. Lin. Rhagium, n.º 2. Fab. éleut. 2. p. 313.

Stencorus. Geoff. 1. p. 223, n.º 2.

Oliv. coléop. 4. n.º 69. pl. 2. f. 11.

Habite en Europe, sur les troncs d'arbres.

Stencore du saule. *Stencorus salicis*.

S. rufus; thorace tuberculato-subspinoso; elytris caruleo-nigris.

Stencorus. Geoff. 1. p. 224, n.º 4.

Oliv. coléop. 4. n.º 69. p. 22. pl. 1. f. 5.

Habite aux environs de Paris, sur le saule, le marionnier d'Inde.

Éto.

LÂMIE. (Lamia.)

Antennes sétacées, longues, insérées dans l'échancrure des yeux. Mandibules simples; mâchoires bifides.

Tête inclinée verticalement en bas. Corselet épineux ou tuberculeux.

Antennæ setaceæ, prælongæ, in oculorum sinus insertæ. Mandibulæ simplices; maxillæ bifidæ.

Caput in imâ parte verticaliter inflexum. Thorax ad latera spinosus aut tuberculatus.

OBSERVATIONS.

Comme on a d'abord formé le genre des *lamies* presque uniquement d'après la considération du corps gros et un peu court de ces insectes, je n'avais pas voulu admettre ce genre fondé sur de semblables caractères. Mais M. Latreille ayant observé que ces cérambiciens ont, ainsi que nos saperdes, la tête fléchie verticalement en bas, c'est-à-dire, perpendiculaire à l'axe du corps, je profite de cette observation pour former le genre des lamies avec ceux des capricornes qui ont la tête verticale.

Ainsi les lamies, qui sont à-peu-près les mêmes que les *lamia* de Fabricius, ne sont distinguées des saperdes que parce qu'elles ont le corselet épineux ou tuberculeux, et des capricornes, que parce que, dans ceux-ci, la tête, quoique inclinée, est en avant.

Quelques-uns de ces insectes ont le corps allongé; beaucoup d'autres l'ont assez gros et un peu court. On les trouve sur les arbres et sur les plantes.

ESPÈCES.

1. *Lamie longimane. Lamia longimanus.*

L. thorace spinis mobilibus; elytris variegatis, basi unidentatis apiceque bidentatis; antennis longissimis.

Cerambyx longimanus. Lin.

Prionus longimanus. Fab. Oliv. coléopt. 4. n.º 66. pl. 3 et 4. f. 12.

Habite l'Amérique méridionale.

Lamie charpentier. *Lamia cedilis*. Fab.

L. thorace spinoso, punctis quatuor luteis: elytris obscuris, nebulosis; antennis longissimis.

Cerambyx cedilis. Lin.

Oliv. coléopt. 4. p. 81. n.º 67. pl. 9. f. 59.

Habite l'Europe boréale, la France.

Lamie aranéiforme. *Lamia araneiformis*. Fab.

L. thorace spinoso, antennis longis: articulo quinto dentato, elytris porosis.

Cerambyx araneiformis. Lin.

Oliv. coléopt. 4. p. 64. n.º 67. pl. 5. f. 34.

Habite l'Amérique méridionale,

Étc.

SAPERDE. (Saperda.)

Antennes sétacées, insérées dans l'échancrure des yeux. Ipes filiformes. Mandibules et mâchoires comme dans lamies.

Tête inclinée verticalement en bas. Corselet mutique, lindracé. Corps allongé.

Antennas setaceæ, in oculorum sinu insertæ. Palpi-formes. Mandibulæ maxilloque ut in lamiis.

Caput in imâ parte verticalitèr inflexum. Thorax uticus, cylindræus. Corpus elongatum.

OBSERVATIONS.

Les *saperdes* nous paraissent suffisamment distinguées des lamies par leur corselet mutique. Elles semblent par-là rapprocher davantage des *callidies* mais, outre que celles-

ci ont leur tête en avant, quoique un peu inclinée; leur corselet court, arrondi, presque globuleux, les en distingue facilement.

Le corps des saperdes est allongé, et d'une grosseur presque égale dans toute sa longueur. La tête est à-peu-près de même largeur que le corselet. Enfin, les élytres sont presque de même largeur partout, et recouvrent entièrement les ailes et l'abdomen, ce qui distingue les saperdes des nécydales.

Les saperdes se nourrissent de substance végétale. On les trouve sur les fleurs et sur les rameaux des arbrisseaux et des arbres, où elles sont presque immobiles, et se laissent prendre facilement. Leurs espèces sont nombreuses. Par leur aspect, elles ressemblent à des leptures; mais, leurs yeux échancrés, entourant la base des antennes, les en distinguent.

ESPECES.

1. Saperde carcharias. *Saperda carcharias*. Fab.

S. flavescens cinerea, nigro-punctata; antennis annulatis, mediocribus. Oliv.

Ceramix carcharias. Linn. Fab. éleut. 2. p. 317.

Lepture chagrinée. Geoff. 1. p. 208. n.° 1.

Oliv. coléopt. 4. n.° 68. p. 6. pl. 2. f. 22.

Habite en Europe.

2. Saperde du chardon. *Saperda cardui*. Fab.

S. fusca; thorace lineato; scutello flavo; antennis longis.

Ceramix cardui. Linn.

Saperda cardui. Fab. éleut. 2. p. 325. Pauc. fasc. 69. t. 6.

Oliv. pl. 1. f. 5.

Habite l'Europe australe.

3. Saperde tête-rouge. *Saperda erythrocephala*. F.

S. capite rufo; thorace villosa; elytris antennisque nigris.

Saperda erythrocephala. Fab. éleut. 2. p. 322.

Panz. fasc. 69. t. 5.

Habite en Allemagne, dans le midi de la France.

Etc. Voyez le *saperda plumigera*. Oliv. pl. 1. f. 2. et le *saperda fasciculata*. Oliv. pl. 1. f. 3. Espèces curieuses par les faisceaux de poils de leurs antennes.

NÉCYDALE. (Necydalis.)

Antennes filiformes, posées dans l'échancrure des yeux. Mandibules simples. Mâchoires à deux lobes inégaux. Tête un peu penchée. Corselet mutique. Abdomen long; étroit. Élytres, soit raccourcies, soit longues subulées, ne recouvrant qu'imparfaitement les ailes et abdomen.

Antennæ filiformes, in oculorum sinu insertæ. Mandibulæ simplices. Maxillæ lobis duobus inæqualibus. Caput paululum nutans. Thorax muticus. Abdomen longatum, angustum. Elytra vel dimidiata, vel elongato-subulata, alas abdominisque dorsum non peragentia.

OBSERVATIONS.

Les *nécydales*, quoique voisines des *callidiés* sous certains rapports, s'en distinguent au premier aspect, ainsi que des *très cérambiciens*. Leurs antennes sont plus filiformes et sétacées; leur abdomen allongé, offre un rétrécissement ou une espèce d'étranglement vers son origine, qui sépare du corselet. Mais ce qui les rend plus remarquables encore, c'est que leurs élytres, diverses en forme et de grandeur, ne recouvrent qu'incomplètement les ailes et abdomen; et, sous ces élytres, les ailes, en général, sont lâches, élevées, presque droites ou peu plées, même pendant le repos de l'animal.

Dans certaines espèces, les élytres sont raccourcies; dans d'autres, elles sont assez longues, et pointues en arrière.

Ces insectes, dans l'état parfait, se trouvent sur les fleurs. Leur larve vit dans le bois. On n'en connaît que peu d'espèces.

ESPECES.

1. Nécydale ichneumonée. *Necydalis major*.

IV. elytris abbreviatis; ferruginis; immaculatis, antennis brevibus.

Necydalis major. Lin. *Molorchus abbreviatus*. Fab. Gen. 2. p. 374.

Oliv. coléopt. 4. n.° 74. p. 5. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe. Rare aux environs de Paris.

2. Nécydale caramboïde. *Necydalis minor*.

IV. fusca; elytris abbreviatis, apice lineola alba. Oliv.

Molorchus dimidiatus. Fab. éleut. 2. p. 375.

Oliv. coléopt. 4. n.° 74. p. 6. pl. 1. f. 2.

Habite en Europe.

3. Nécydale rousse. *Necydalis rufa*. Fab.

IV. nigra; elytris subulatis rufis; femoribus clavatis.

Lepture à étuis étranglés. Geoff. 1. p. 220. n.° 22.

Oliv. coléopt. 4. p. 6. pl. 1. f. 6.

Habite en Europe. Commune aux environs de Paris.

CALLIDIE. (Callidium.)

Antennes sétacées, posées dans l'échancrure des yeux. Mandibules courtes, cornées. Palpes inégaux: le dernier article plus grand, obtus, presque en hache.

Tête un peu penchée. Corselet mutique, court, globuleux ou orbiculaire, quelquefois en ovale tronqué aux extrémités.

Antennæ setaceæ , in oculorum sinu insertæ. Manducæ breves , corneæ. Palpi inæquales : articulo ultimo majore , obtuso , subsecuriforme.

Caput paululum nutans. Thorax muticus , brevis , bosus aut orbiculatus , interdum ovalis utrdque extremitate truncatâ.

OBSERVATIONS.

Les *callidies* tiennent de très-près aux capricornes et aux lichromes par leurs rapports. Elles en sont distinguées par leur corselet mutique, court, subglobuleux, et elles le sont par les ailes par cette forme du corselet, et parce que leur tête n'est point penchée verticalement en bas.

Le corps de ces insectes est allongé, et, en général, assez varié dans ses couleurs. On trouve les *callidies* dans les bois, sur les troncs d'arbres à demi-pourris, sur les fleurs dans les maisons.

ESPECES.

Callidie sanguine. *Callidium sanguineum.*

C. thorace subtuberculato ; elytrisque sanguineis.

Cerambix sanguineus. Lin.

Callidium sanguineum. Fab. *Stent.* 2. p. 340.

Panz. fasc. 70. t. 9. *Leptura*, n.º 21. Geoff.

Habite en Europe. Commune aux environs de Paris. Elle est d'un rouge vif, velouté.

Callidie arquée. *Callidium arcuatum.*

C. thorace rotundato ; elytris fasciis quatuor flavis : prima interruptâ ; reliquis retrorsum arcuatis.

Leptura arcuata. Lin. *Clytus arcuatus.* Fab.

Leptura, n.º 10. Geoff. Panz. fasc. 4. t. 14.

Habite en Europe. Très-commune.

Etc. Voyez Panzer, fasc. 70. tab. 1—20, et les *clytus* de Fabricius.

CAPRICORNE. (Cerambyx.)

Antennes sétacées, longues, insérées dans l'échancrure des yeux. Lèvre supérieure apparente. Dernier article des palpes en cône renversé, plus grand que les autres.

Tête un peu inclinée. Corselet convexe, épineux ou tuberculeux.

Antennæ setaceæ, longæ, in oculorum sinu insertæ. Labrum conspicuum. Palporum articulus ultimus inverso-conicus, alius major.

Caput paululum nutans. Thorax convexus, spinosus aut tuberculatus.

OBSERVATIONS.

Après les priones, ce genre est un de ceux qui comprennent les plus beaux coléoptères, et c'est aussi celui qui a fourni son nom à la famille dont il fait partie.

Les *capricornes* sont remarquables par la longueur de leurs antennes. Leur tête est inclinée, mais en avant. Leur corselet est presque toujours plus large que la tête. Il est convexe, raboteux, plissé, tuberculé ou armé de quelques épines courtes, larges à leur base. Leurs élytres, plus ou moins convexes, couvrent entièrement l'abdomen, ayant quelquefois une ou deux pointes à leur extrémité.

On trouve ordinairement les capricornes dans les bois et sur les troncs d'arbres. Leurs larves vivent dans l'intérieur des arbres qu'elles percent. Elles réduisent en poudre la substance du bois dont elles se nourrissent.

ESPÈCES.

- * *Palpes maxillaires plus courts que les labiaux.*
Couleurs métalliques, brillantes; odeur agréable.
 [*Callichromes*. Latr.]

1. Capricorne musqué. *Cerambix moschatus*.

C. thorace spinoso, viridis, nitens; antennis mediocribus, cyaneis.

Cerambix moschatus. Lin. Fab. 2. p. 266.

Oliv. coléopt. 4. n.º 67. p. 23. pl. 2. f. 7.

Geoff. 1. p. 203. n.º 5.

Habite en Europe, sur le saule. Il a l'odeur de rose.

2. Capricorne bleu. *Cerambix alpinus*.

C. cinereo-carulescens, fuscis maculisque nigris; thorace spinoso.

Cerambix alpinus. Lin. Fab. éleut. 2. p. 272.

Oliv. col. n.º 67. t. 9. f. 58.

Geoff. 1. p. 202. n.º 4. pl. 3. f. 6. La Rosalie.

Habite en Europe, dans les montagnes. Il est très-bien et sent le musc.

3. Capricorne vert. *Cerambix virens*.

C. thorace rotundato, spinoso; corpore viridi; femoribus rufis. F.

Cerambix virens. Lin. Fab. p. 267.

Oliv. col. 4. n.º 67. tab. 11. n.º 78.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles. Il a une odeur agréable.

M. Latreille rapporte à cette division les *C. albicans*, *nitens*, *micans*, *aler*, *festivus*, *vittatus*, *velutinus*, *sericeus*, *elegans*, *suturalis*, *latipes*, *regius*, *albicornis*, *longipes*, *cyanicornis*, de Fabricius.

- ** *Palpes maxillaires plus longs que les labiaux.*

4. Capricorne noir. *Cerambix heros*.

C. niger, thorace spinoso rugoso; elytris subspinosis piceis; antennis longis.

Cerambix heros. Fab. elent. 2. p. 270.

Oliv. col. 4. n.º 67. pl. 1. f. 1.

Geoff. 1. p. 200. n.º 1.

Habite en Europe. C'est le plus grand qui soit en France.

5. Capricorne rude. *Cerambix cerdo*.

C. niger; thorace spinoso; elytris scabris, apices rotundatis.

Cerambix cerdo. Lin. Fab. p. 270.

Oliv. col. 4. n.º 67. pl. 10. f. 65.

Geoff. 1. p. 201. n.º 2.

Habite en Europe. Il a les élytres chagrinées, rudes.

Etc.

PRIONE. (Prionus.)

Antennes sétacées, longues, souvent pectinées ou en scie, insérées dans l'échancrure des yeux. Quatre palpes filiformes. Lèvre supérieure nulle ou point apparente. Mandibules fortes, avancées.

Corps déprimé. Corselet aplati, subtransverse, tranchant et denté ou épineux sur les côtés.

Antennæ setaceæ, longæ, in nonnullis pectinatæ aut serratæ, in oculorum sinu insertæ. Palpi quatuor filiformes. Labrum subnullum, inconspicuum. Mandibulæ validæ, porrectæ.

Corpus depressum. Thorax planulatus, subtransversus, lateribus acutis, dentatis aut spinosis.

OBSERVATIONS.

Les *priones* sont la plupart de grands et beaux insectes exotiques, qui vivent dans les bois comme les capricornes, et qui ont aussi la démarche lente. Leur genre est caractérisé par la double considération de la lèvre supérieure très-



petite et comme nulle, et du corselet tranchant, denté ou épineux sur les côtés.

Ces insectes ont le corps oblong, déprimé, glabre; la tête munie de mandibules fortes, souvent saillantes; les yeux réniformes, entourant d'un côté la base des antennes.

Geoffroy a, le premier, établi ce genre, d'après une seule espèce qu'il a connue (*prionus coriarius*); mais il ne l'a caractérisé que sur la considération des antennes en saie de ce prion; ce qui n'est pas général pour toutes les espèces de ce genre, et ce qui n'a lieu que dans les mâles.

ES P È C E S.

1. Prione cervicorne. *Prionus cervicornis*.

P. thorace marginato, utrinque tridentato; mandibulis porrectis, extus unispinosus; antennis brevibus. F.

Cerambyx cervicornis. Lin.

Prionus cervicornis. Fab. élém. 2. p. 259.

Oliv. coléopt. 4. n.° 66. pl. 2. f. 8.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles. On mange sa larve : elle vit dans le fromager.

2. Prione à collier. *Prionus armillatus*.

P. thorace marginato, utrinque quadridentato; elytris ferrugineis, nigro-marginatis. F.

Cerambyx armillatus. Lin.

Prionus armillatus. Fab. p. 261.

Oliv. col. 4. n.° 66. pl. 5. f. 17.

Habite dans l'Inde. Il est très-grand.

3. Prione géant. *Prionus giganteus*.

P. thorace utrinque bidentato; corpore nigro; elytris ferrugineis; antennis brevibus. F.

Cerambyx giganteus. Lin.

Prionus giganteus. Fab. p. 261.

Oliv. col. n.° 66. pl. 6. f. 21.

Habite à Cayenne.

4. Prione tanneur. *Prionus coriarius*.

P. thorace marginato, tridentato; corpore piceo; antennis brevibus. F.

Cerambyx coriarius. Linn.

Prionus coriarius. Fab. p. 260. Panz. fasc. 9. t. 8.

Geoff. 1. p. 198. tab. 3. f. 9.

Habite en Europe, aux environs de Paris, dans le tronc des vieux arbres.

5. Prione scabricorne. *Prionus scabricornis*.

P. nigro-cinnamomeus, subvillosus; thorace submarginato, unidentato; antennis scabris, versus apicem gracilioribus.

Prionus scabricornis. Fab. p. 258.

Oliv. col. 4. n.º 66. pl. 11. n.º 42.

Lepture rouillée. Geoff. 1. p. 210. n.º 6.

Habite l'Europe, les environs de Paris.

Etc.

× × *Antennes moniliformes ou grenues.*

APPENDICE DES CÉRAMBICIENS.

Je rapporte ici, comme appendice des cérambiciens, deux genres particuliers, qui tiennent d'une part aux cérambiciens par plusieurs rapports, et de l'autre qui se rapprochent des corticicoles; mais qui sont distincts des uns et des autres.

Les deux genres dont il s'agit, et qui forment une transition des cérambiciens aux corticicoles, sont les *spondylides* et les *parandres*.

SPONDYLIDE. (Spondylis.)

• Antennes courtes, moniliformes, comprimées, insérées dans l'échancrure des yeux. Labre très-petit, presque nul. Mandibules fortes, avancées. Lèvre inférieure à deux lobes divergens.

Corps oblong, convexe. Corselet subglobuleux, mutique.

Antennæ breves, moniliformes, compressæ, in oculorum sinu insertæ. Labrum minimum, subnulum. Mandibulæ validæ, perfectæ. Labium lobis divaricatis.

Corpus oblongum, convexum. Thorax subglobosus, muticus.

OBSERVATIONS.

La *spondylide* appartient encore aux cérambiciens, et doit être placée dans le voisinage des priones à cause de son labre presque nul. Elle ressemble un peu aux callidies par son corselet, mais ses antennes sont courtes ainsi que ses pattes.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre. Je lui donne en français le nom de *spondylide*, à cause du genre *spondyle* parmi les mollusques acéphales.

ESPECE.

1. *Spondylide buprestoïde. Spondylis buprestoides.*
Fab.

Oliv. coléop. 4. n.º 71. pl. 1. f. 1.

Attelabus buprestoides. Lin.

Habite en Europe, dans les bois de pins. Elle est toute noire.

PARANDRE. (Parandra.)

Antennes filiformes, moniliformes, insérées devant les yeux. Lèvre supérieure très-petite, à peine apparente. Mandibules fortes, avancées, dentées.

Corps parallépipède, un peu aplati. Corselet carré, mutique. Tarses allongés.

Antennæ filiformes , moniliformes , antè oculos insertæ. Labrum minimum , vix conspicuum. Mandibulæ valvæ , porrectæ , dentatæ.

Corpus elongatum , subdepressum. Thorax quadratus , muticus, Tarsi elongati.

OBSERVATIONS.

Les *parandres*, dont on ne connaît encore qu'une espèce , ne sont pas sans rapports avec les priones; ils paraissent néanmoins en avoir davantage avec les corticoles.

ESPECE.

1. Parandre lisse. *Parandra levis*. Latr.

Attélabé lisse. Degeer, mém. sur les ins. 4. p. 351. pl. 19. f. 14.

Tenebrio brunneus. Fab. Gent. 1. p. 148.

Parandra. Lat. gen. crust. et ins. 1. tab. 9. f. 7. et vol. 3. p. 28.

Habite en Amérique.

Troisième article des tarsi entier.

LES CORTICICOLES.

Parmi les coléoptères tétramères dont la tête est sans museau avancé , les *corticicoles* sont les seuls qui aient tous les articles des tarsi entiers , et conséquemment dont le troisième article n'est point bilobé ou bifide , pourvu cependant que l'on en sépare les scolites , comme formant une division à part.

Ainsi, sous la dénomination de corticicoles , je réunis différens coléoptères tétramères qui ont tous le troi-

sième article des tarses entier, des habitudes assez analogues, et qui ne peuvent faire partie d'aucune des familles bien reconnues parmi les autres tétramères. Ils constituent un groupe particulier, que l'on ne saurait regarder comme formant une seule famille, qui se compose de races diversifiées, et néanmoins dont ces races se lient ensemble par le caractère général que je viens d'assigner.

M. Latreille a partagé nos corticicoles en plusieurs petites familles particulières, savoir :

- En cucujipes ;
- En xylophages ;
- En paussiles ;
- Et en bostrichiens.

Mais, de ces derniers, je sépare ses scolites, ses hylélines et ses phlototribes. Ces familles nous paraissent médiocrement prononcées, et peu essentielles. Dans les unes, il n'y a que peu de genres, et dans les autres, les genres n'offrent qu'un petit nombre d'espèces, et quelquefois qu'une seule.

Les larves de la plupart de ces insectes vivent sous les écorces des arbres ; quelques-unes se trouvent dans les champignons. Voici le tableau des divisions qui partagent leur groupe.

DIVISION DES CORTICICOLES.

1.^{re} SECT. *Antennes de onze articles.*

- (1) Antennes de grosseur égale : elles sont moniliformes ou filiformes.

- (a) Antennes moniliformes.

Cucuje.

- (b) Antennes filiformes, à articles cylindriques.

Uléiote.

- (2) Antennes de grosseur inégale: elles grossissent vers leur sommet, ou se terminent en massue.

- (a) Mandibules non saillantes.

- (++) Corps ovale ou arrondi.

Mycétophage.

Agathidie.

- (+++) Corps allongé.

- ☐
- Palpes très-courts.

Xylophile.

- ☐
- ☐
- Palpes maxillaires saillants.

Méryx.

- (b) Mandibules fortes et saillantes.

Trogossite.

2.° SECT. *Antennes de dix articles ou d'un nombre moindre.*

- (1) Palpes soit filiformes, soit plus gros vers leur extrémité.

- (a) Corps ovale ou arrondi.

Cis.

- (b) Corps allongé, souvent étroit;

- (→) Corps déprimé.

- ☐
- Massue des antennes de trois articles.

Némosome.

- ☐
- ☐
- Massue des antennes de deux articles.

Cérylon.

- (→→) Corps convexe.

Bostriche.

- (2) Palpes coniques ou qui s'amincissent de la base à la pointe.

- (a) Antennes de deux articles.

Pausse.

- (b) Antennes de dix articles.

Cérapètre.

CUCUJE. (Cucujus.)

Antennes filiformes , moniliformes , plus courtes que le corps. Lèvre supérieure avancée entre les mandibules.

Corps allongé , déprimé. Tarses fort courts.

Antennæ filiformes , moniliformes , corpore breviores. Labrum inter mandibulas productum.

Corpus elongatum , depressum. Tarsi perbreves.

OBSERVATIONS.

Geoffroy donnait le nom de *cucuje* aux insectes que l'on nomme actuellement *huprestes* ; ainsi les cucujes , dont il est ici question , sont fort différens. Ce sont des coléoptères à corps allongé et aplati , qui vivent sous les écorces des arbres. Ils ont des antennes de grosseur égale , à onze articles ; le dernier article des palpes tronqué.

ESPECES.

1. Cucuje déprimé. *Cucujus depressus*.

C. glaber , punctatus ; capite , thoracis dorso elytrisque rubris.

Cantharis sanguinolenta. Lin.

Cucujus depressus. Fab. éleut. 2. p. 93.

Oliv. col. 4. n.º 74. bis. pl. 1. f. 2.

Habite en Europe , sous l'écorce morte du bois.

2. Cucuje clavipède. *Cucujus clavipes*.

C. ruber ; thorace quadrangulati sulcato ; femoribus clavatis.

Cucujus clavipes. Oliv. col. 4. n.º 74 bis. pl. 1. f. 1.

Habite l'Amérique septentrionale.

Etc.

ULÉIOTE. (*Uleiota*.)

Antennes filiformes, au moins aussi longues que le corps; à articles allongés, cylindriques. Lèvre supérieure avancée entre les mandibules. Palpes terminés en pointe.

Corps oblong, très-plat. Tarses courts.

Antennæ filiformes, corporis saltè longitudine; articulis elongatis cylindricis. Labrum inter mandibulas productum. Palporum articulus ultimus apice acutiusculus.

Corpus oblongum, valdè depressum. Tarsi breves.

OBSERVATIONS.

Ce n'est guère que par les antennes et par le dernier article des palpes que les uléiotes sont distinguées des cucujes. Elles vivent aussi sous les écorces des arbres.

ESPECE.

1. Uléiote flavipède. *Uleiota flavipes*. Lat.

Uleiota. Lat. gen. crust. et ins. 3. p. 26.

Cerambyx planatus. Lin.

Cucujus flavipes. Oliv. col. n.º 74 bis. pl. 1. f. 6.

Brontes flavipes. Fab. élent. 2. p. 97.

Habite en Europe, sous les écorces. Ses antennes sont velues.

MYCÉTOPHAGE. (*Mycetophagus*.)

Antennes moniliformes, grossissant insensiblement vers le bout ou se terminant en une massue médiocre et perfoliée. Mandibules simples, arquées.

Corps ovale ou ovale-oblong, un peu aplati.

Antennæ moniliformes, sensim extorsum crassiores, aut in clavam mediocrem et perfoliatam terminatæ. Mandibulæ simplices, arcuatæ.

Corpus ovatum vel ovato-oblongum, subdepressum.

OBSERVATIONS.

Les *mycétophages*, dont une espèce fut nommée *tritoma* par Geoffroy, parce qu'il ne lui attribuait que trois articles aux tarses, sont des coléoptères tétramères qui vivent dans les champignons et sous les écorces des arbres. Voici la citation de quelques-unes de leurs espèces.

ESPÈCES.

1. *Mycétophage quadrimaculé. Mycetophagus quadrimaculatus.*

M. rufus; thorace elytrisque nigris, his maculis duabus rufis. F.

Chrysomela quadripustulata. Lin.

Tritoma. Geoff. 1. p. 335. pl. 6. f. 2.

Mycetophagus quadrimaculatus. Lat. Fab. élent. 2. p. 565.

Oliv. Encycl. n.º 2. Panz. fasc. 12. t. 9.

Habite en Europe, dans les bolets.

2. *Mycétophage bifascié. Mycetophagus bifasciatus.*

M. niger; elytris fasciis duabus punctoque apicis ferrugineis.

Mycetophagus bifasciatus. Lat. gen. 3. p. 10.

Panz. fasc. 2. t. 24.

Ips bifasciata. Fab. élent. 2. p. 579.

Habite en France, en Allemagne, sous l'écorce des arbres.

3. *Mycétophage atomaire. Mycetophagus atomarius.*

M. niger; elytris, punctis fascisque postica fulvis. F.

Dermestes atomarius. Thunb. ins. suec. 67—78.

Mycetophagus atomarius. Fab. élent. 2. p. 568.

Panz. fasc. 12. t. 10. Oliv. Encycl. n.º 15.

Habite en Allemagne.

Etc.

AGATHIDIE. (*Agathidium* .)

Antennes courtes , se terminant en une massue triarticulée. Mandibules triangulaires , à sommet pointu.

Corps hémisphérique , presque globuleux , se mettant en boule. Articles des tarses tous entiers.

Antennæ breves , in clavam triarticulatam terminatæ. Mandibulæ triangulares , apice acuto.

Corpus hemisphærico-globosum , in globum contractile. Tarsorum articuli omnes integri.

OBSERVATIONS.

Par leur aspect , les *agathidies* ressemblent presque à de petites coccinelles ; mais le nombre des articles de leurs tarses dont le pénultième est entier comme les autres , et les habitudes de ces insectes , les font rapporter à cette division.

ESPECES.

1. Agathidie nigripenne. *Agathidium nigripenne*.

A. thorace rubro ; elytris abdomineque nigris.

Agathidium. Illig. Lat. gen. crust. et ins. 3. p. 67.

Anisostoma nigripennis. Fab. éleut. 1. p. 100.

Sphæridium. Panz. fasc. 39. t. 3.

Oliv. col. 2. n.º 15. pl. 2. f. 7.

Habite en France , sur les troncs cariés des arbres. Elle est très-petite.

2. Agathidie brune. *Agathidium seminulum*.

A. subglobosum , fuscum ; abdomine pedibusque rufis.

Anisostoma seminulum. Fab. éleut. 1. p. 100.

Dermestes seminulum. Lin.

Agathidium seminulum. Panz. fasc. 37. t. 10.

Habite en Europe , dans les champignons pourris.

XYLOPHILE. (*Xylophila*.)

nnées à peine plus longues que le corselet, terminées en massue de deux ou trois articles. Mandibules, non saillantes. Palpes très-courts.

Abdomen allongé, déprimé.

Antennæ vix thorace longiores, clavæ bi seu triarticulæ terminatæ. Mandibulæ simplices, non porrectæ. Palpi perbreves.

Corpus elongatum, depressum.

OBSERVATIONS.

Le nom de *xylophila*, je réunis les ditomes, lyctes, latridies et sylvains de M. Latreille; parce que la distinction, comme genres, ne me paraît pas nécessaire. Ces insectes sont fort petits, ne se distinguent des mycétophages que parce qu'ils ont le corps allongé et la plupart sont des ips d'Olivier.

ESPECES.

Xylophile crénelé. Xylophila crenata.

♂ niger; thorace rugoso; elytris striato-crenatis: maculis duabus rufis.

Lyctus crenatus. Fab. élém. 2. p. 561.

Ips crenata. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 2. f. 9.

Ditoma crenata. Lat.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Xylophile oblong. Xylophila oblonga.

♂ brunnea, pubescens; thorace canaliculato; elytris striatis.

Ips oblonga. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 1. f. 5.

Lyctus canaliculatus. Fab. élém. 2. p. 562.

Lyctus. Latr. gen. 3. p. 16. Panz. fasc. 4. t. 16.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

3. Xylophile unidenté. *Xylophila unidentata*.*X. oblonga, testacea; thorace utrinque unidentato.**Ips unidentata*. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 1. f. 4.*Sylvanus unidentatus*. Latr.*Dermestes unidentatus*. Fab. éleut. 1. p. 317.

Habite en France, etc., sous l'écorce des arbres.

Etc.

M É R Y X. (Meryx.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet, ayant les trois derniers articles un peu plus gros. Mandibules bifides au sommet, non saillantes. Palpes en massue; les maxillaires saillans.

Corps allongé, étroit.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine; articulis tribus ultimis subcrassioribus. Mandibulæ apice bifidæ, non exsertæ. Palpi clavati: maxillaribus productis.

Corpus elongatum, angustum.

O B S E R V A T I O N S.

Le *meryx* se rapproche, par son port, des xylophiles, et peut-être a-t-il des habitudes analogues aux leurs; mais il en est distingué surtout par ses mandibules.

E S P E C E.

1. Méryx ridé. *Meryx rugosa*.*Meryx rugosa*. Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 11. f. 1, et vol.

3. p. 17.

Habite aux Indes orientales. Riche.

T R O G O S S I T E. (Trogossita.)

Antennes courtes, moniliformes, plus épaisses ou en massue vers leur sommet, ayant les trois derniers ar-

es plus grands. Mandibules fortes , saillantes , dens.

Corps allongé , déprimé. Corselet tronqué antérieurement , et ayant un étranglement à sa partie postérieure le sépare des élytres.

Antennæ breves , moniliformes , versus apicem assiores aut clavatæ , articulis tribus ultimis majusculis. Mandibulæ validæ , exsertæ , dentatæ.

Corpus elongatum , depressum. Thorax anticè truncatus , posticè ab elytris strangulo disjunctus.

OBSERVATIONS.

Les *trogossites* ont un peu l'aspect des passales à cause de l'étranglement de la partie postérieure de leur corselet ; mais en sont bien distingués par la forme de leurs antennes et par le nombre des articles de leurs tarse. Ce sont encore des corticoles à onze articles aux antennes , ayant les articles des tarse tous entiers.

ESPECES.

Trogossite mauritanique. *Trogossita mauritanica.*

T. nigricans , subitè picea ; elytris striatis.

Oliv. col. 2. n.º 19. p. 6. pl. 1. f. 2.

Trogossita caraboides. Fab. éleut. 1. p. 151.

Panz. fasc. 3. t. 4.

Platycerus , n.º 5. Geoff. 1. p. 64. La chevrette brune.

Habite en France , etc. , dans les vieux bois.

Trogossite bleu. *Trogossita cœrulea.*

T. cœrulea , nitida ; capite lined impressd.

Trogossita cœrulea. Oliv. col. 2. n.º 19. pl. 1. f. 1.

Fab. éleut. 1. p. 151. Panz. fasc. 43. t. 14.

Habite dans la France méridionale , dans le vieux pin.

Etc.

CIS. (Cis.)

Antennes plus longues que la tête , à dix articles : les trois derniers formant une massue perfoliée. Lèvre supérieure saillante, transverse. Palpes inégaux , plus gros à leur extrémité : les labiaux très-petits.

Corps ovale , déprimé.

Antennæ capite longiores , decem-articulatæ : articulis tribus ultimis in clavam perfoliatam dispositis. Labrum exsertum , transversum. Palpi inæquales , apice crassiores : labialibus minimis.

Corpus ovatum , depressum.

OBSERVATIONS.

Les *cis* , que Fabricius a confondus avec les vrillettes, vivent dans les bolets ou les agarics desséchés des arbres, et font partie des corticicoles qui ont moins de onze articles aux antennes.

ESPECES.

1. Cis du bolet. *Cis boleti*. Lat.

C. brunneo-nigricans , nitidiusculus , subpunctulatus ; elytris rugosulis ; antennis pedibusque rufescentibus.

Cis boleti. Latr. gen. 3. p. 12.

Anobium boleti. Fab. éleut. 1. p. 323.

Panz. fasc. 10. f. 7. *Colore castaneo.*

Anobium bidentatum. Oliv. col. n.º 16. pl. 2. f. 5.

Habite en Europe , dans les bolets.

2. Cis nain. *Cis minutus*.

C. ater , glaber , punctulatus , immaculatus.

Hylesinus minutus. Fab. éleut. 2. p. 395.

Bostrichus minutus. Panz. fasc. 15. t. 11.

Habite en France, en Allemagne, dans le bolet versicolor.
Etc. Ajoutez-y l'*anobium reticulatum*, le *micans* et le *nitidum* de Fabricius.

NÉMOSÔME. (Nemosoma.)

Antennes guères plus longues que la tête ; à massue foliée, de trois articles. Mandibules fortes, avancées.

Corps linéaire. La tête presque aussi longue que le corps.

Antennæ capite non aut vix longiores : clavæ perfoliatæ, triarticulatæ. Mandibulæ validæ, porrectæ. Corpus lineare : capite longitudine thoracem subuante.

OBSERVATIONS.

Le *némosome*, remarquable par sa forme allongée, a été déjà parmi les ips par Olivier, et parmi les dermestes par né. Il appartient aux corticoles qui ont dix articles aux antennes.

ESPECE.

Némosome allongé. *Nemosoma elongatum*.

Lat. gen. crust. et ins. 1. tab. 11. f. 4, et vol. 3. p. 13.

Ips allongé. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 2. f. 16.

Dermestes elongatus. Lin.

Colydium fasciatum. Panz. fasc. 31. t. 22.

Habite en France, en Allemagne.

CÉRYLON. (Cerylon.)

Antennes un peu plus longues que la tête ; à massue que globuleuse, d'un ou deux articles. Mandibules saillantes.

Tom. IV.

Corps allongé, étroit. Corselet presque carré, beaucoup plus long que la tête.

Antennæ capite paulò longiores : clavæ subglobosæ uni seu biarticulatæ. Mandibulæ non exsertæ.

Corpus elongatum , angustum. Thorax capite multò longior , subquadratus.

OBSERVATIONS.

Les *cérylons* sont allongés , étroits , aplatis , et ressemblent au némosome par leur port ; mais leur tête est bien plus courte , la massue de leurs antennes n'est point triarticulée , et leurs mandibules ne sont point saillantes. Ils vivent de la substance du bois , et se trouvent sous les écorces des arbres , sur les branches mortes.

ESPÈCES.

1. *Cérylon* escarbot. *Cerylon histeroïdes*. Lat.

C. ater , nitidus ; antennis pedibusque piceis.

Lyctus histeroïdes. Fab. élent. 2. p. 561.

Panz. fasc. 5. t. 16.

Habite en Europe , sous l'écorce des arbres :

2. *Cérylon* tarrière. *Cerylon terebrans*. Lat.

C. fusco-ferrugineus , immaculatus ; elytris striato-crenatis.

Ips terebrans. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 1. f. 7.

An lyctus terebrans ? Fab. élent. 2. p. 561.

Habite aux environs de Paris , sous l'écorce des arbres.

Etc. On en connaît beaucoup d'autres.

BOSTRICHE. (*Bostrichus*.)

Antennes plus courtes que le corselet ; à massue , tantôt perfoliées ou en scie , tantôt presque solide. Mandibules courtes , cornées , pointues. Palpes non saillans.

Tête en partie cachée par le corselet. Corps allongé, subcylindrique. Corselet convexe ou semi-globuleux.

Antennæ thorace breviores : clavd modò perfoliatâ aut serratâ, modò subsolidâ. Mandibulæ breves , cerneæ , apice acutæ. Palpi non exertî.

Caput thorace partim occultatum. Corpus elongatum , subcylindricum. Thorax convexus aut semi-globosus.

OBSERVATIONS.

Les *bostriches* tiennent de très-près aux scolitaires par leur forme générale et par leurs habitudes ; ce sont de part et d'autre des rongeurs de bois. Mais les premiers sont des corticoles, ont tous les articles des tarses entiers ; tandis que les seconds ont le pénultième article des tarses bilobé. Leur corps allongé les distingue des cis ; ils diffèrent du némosome par leur tête courte , et des cérylons par la convexité de leur corps ou de leur corselet , qui est ordinairement scabre antérieurement.

Les larves des *bostriches* vivent dans le bois mort ; le rongent , le percent et le réduisent en poussière. Quelques-unes vivent sous les écorces, attaquent le bois vivant, et font des dégâts dans les forêts.

ESPÈCES.

[*Massue des antennes perfoliée ou en scie.*]

1. Bostriche muriqué. *Bostrichus muricatus*.

B. thorace muricato , gibbo ; elytris ante apicem bispl-nosis.

Dermestes muricatus. Lin.

Bostrichus muricatus. Lat. Oliv. col. 4. n.º 77. pl. 2. f. 13.

Sinodendron muricatus. Fab. éleut. 2. p. 377.

Panz. fasc. 35. f. 17.

Habite le midi de la France , dans le bois carié,

2. Bostriche capucin. *Bostrichus Capucinus*.

B. niger; *elytris abdomineque rufis*; *thorace retuso emarginato*.

Dermestes capucinus. Linn.

Bostrichus. Geoff. 1. p. 302. pl. 5. f. 1.

Apate capucina. Fabr. 2. p. 381. Panz. fasc. 43. t. 18.

Bostrichus capucinus. Latr. Oliv. col. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe, sur le tronc des arbres morts.

3. Bostriche de Dufour. *Bostrichus Dufourii*. Latr.

B. fuscus; *thorace convexo*, *scabro*, *emarginato*; *elytris maculis sericeo-griseis*, *seriatim dispositis*.

Bostrichus Dufourii. Latr. gen. 3. p. 7.

Apate gallica. Panz. fasc. 101. t. 17.

Habite aux environs de Fontainebleau, sous l'écorce du hêtre.

[*Massue des antennes solide ou presque solide.*]

4. Bostriche typographe. *Bostrichus typographus*.

B. testaceus, *pilosus*; *elytris striatis*, *retusis*, *præmordentatis*. F.

Dermestes typographus. Linn.

Bostrichus typographus. Fab. élent. 2. p. 385.

Panz. fasc. 15. t. 2. *Tomicus*. Latr.

Scolyte, n.º 7. Oliv. coléopt. 4. n.º 78. pl. 1. f. 7.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres. Il y creuse une multitude de canaux, en forme de labyrinthe, qui sillonnent la surface du bois et la paroi interne de l'écorce.

5. Bostriche cylindrique. *Bostrichus cylindricus*.

B. ater, *cylindricus*; *elytris striatis*, *apice villosis*, *denticatis*; *pedibus compressis*, *testaceis*. F.

Bostrichus cylindricus. Fab. élent. 2. p. 384.

Panz. fasc. 15. t. 1. *Platypus*. Latr.

Scolyte, n.º 2. Oliv. col. pl. 1. f. 2.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

(Etc., etc.)

CÉRAPTERÈ. (*Cerapterus*.)

Antennes de dix articles, dont neuf sont perfoliés et le dixième semi-globuleux. Palpes coniques.

Corps en carré long. Corselet carré.

Antennæ decem-articulatæ; articulis perfoliatis: ultimo semi-globoso. Palpi conici.

Corpus elongato-quadratum. Thorax quadratus.

OBSERVATIONS.

Le *céraptère* est un insecte exotique sur lequel M. Latreille n'a pas encore donné beaucoup de détails, et qui paraît former le type d'un genre. Je doute qu'on puisse l'associer au genre suivant, pour en former une division naturelle.

ESPECE.

1. Céraptère de Macleay. *Cerapterus Macleayi*.

Latr. gen. crust. et ins. 3. p. 4.

Habite la Nouvelle-Hollande. Il est entièrement brun.

PAUSSE. (*Paussus*.)

Antennes un peu plus longues que le corselet, de deux articles, dont le dernier est fort grand. Mandibules petites, allongées, cornées. Palpes saillans, coniques.

Corps allongé, déprimé. Corselet en carré long. Elytres larges et comme tronquées au bout, un peu plus courtes que l'abdomen.

Antennæ thorace paulò breviores, biarticulatæ:

articulo ultimo maximo. Mandibulae parvae, elongatae, corneae. Palpi exserti, conici aut à basi ad apicem attenuati.

Corpus elongatum, depressum. Thorax elongato-quadratus. Elytra lata, extremitate subtruncata, abdomine paulò breviora.

OBSERVATIONS.

Les *pausses* sont des coléoptères bien singuliers, puisqu'ils n'ont que deux articles aux antennes, ce qui est un fait très-rare. Ces insectes sont exotiques.

ESPECES.

1. Pausse à petite tête. *Paussus microcephalus*. Lin.

Diss. big. ins. tab. 1. f. 6—10.

P. antennis biarticulatis: clavo irregulari dentato maximo; corpore fusco. F.

Paussus microcephalus. Thunb. act. suec. 1781. 170. 1.

Fab. éleut. 2. p. 75. Latr. gen. 3. p. 3.

Habite en Afrique.

2. Pausse trigonicoorne. *Paussus tricornis*. Latr.

P. rubro-ferrugineus; antennarum articulo secundo compresso, trigono.

Latr. gen. crust. et ins. 1. tab. 11. f. 8, et vol. 3. p. 3.

Habite dans l'Inde.

Etc. Voyez, pour les autres espèces, *Fabricius*, éleut. 2. p. 75.

LES SCOLITAIRES.

Tête sans museau avancé. Antennes de huit à dix articles, terminées en massue. •

Corps subcylindrique, à dos ou corselet convexe. Le pénultième article des tarsi bilobé.

Les *scolitaires* tiennent par leurs habitudes aux cor-

ticiques, et principalement aux bostriches; ce sont aussi des rongeurs de bois. Néanmoins, comme elles ont le pénultième article des tarses bilobé, il convient de les en séparer. Elles constituent une petite famille, qui semble former une transition des corticiques aux charançonites. Je ne les divise qu'en deux genres, savoir : les scolytes et les phlootribes.

SCOLYTE. (Scolytus.)

Antennes courtes, de huit à dix articles, terminées en massue solide d'un ou deux articles. Mandibules épaisses, courtes, pointues. Palpes très-petites.

Tête cachée par le corselet. Corps allongé, subcylindrique.

Antennæ breves, octo ad decem articulatæ, clavæ solidæ uni seu biarticulatæ terminatæ. Mandibulæ crassiusculæ, breves, acutæ. Palpi minimi.

Caput thorace subocculatum. Corpus elongatum, subcylindricum.

OBSERVATIONS.

Quoique les *scolytes* tiennent aux corticiques et particulièrement aux bostriches par les habitudes, elles semblent annoncer le voisinage des charançonites, ayant comme ces dernières le troisième article des tarses bilobé. Ces insectes ont une forme presque cylindrique, quelquefois un peu rétrécie antérieurement; la tête subglobuleuse; les élytres dures; les pattes comprimées, souvent dentées. Leurs larves vivent sous les écorces et dans le bois même des arbres vivans. Elles font souvent beaucoup de dégâts dans les forêts.

Je ne distingue point des scolytes les hylurges, ni les hylésines de M. Latreille, quoiqu'on puisse le faire.

ESPECES.

1. Scolyte destructeur. *Scolytus destructor*.

S. niger, nitidus, punctatus; antennis, elytris, pedibusque rufo-castaneis; fronte pubescente.

Scolytus. Geoff. 1. p. 310. tab. 5. f. 5.

Scolytus destructor. Latr. Oliv. col. 4. n.° 78. pl. 1. f. 4.

Hylesinus scolytus. Fab. éleut. 2. p. 390.

Panz. fasc. 15. t. 6.

Habite en France, en Allemagne, sous l'écorce des arbres.

2. Scolyte ligniperde. *Scolytus ligniperda*.

S. villosus, nigricans; tibiis quatuor posticis serratis.

Scolytus ligniperda. Oliv. col. 4. n.° 78. pl. 1. f. 9.

Hylesinus ligniperda. Fab. p. 391.

Hylurgus ligniperda. Latr. gen. vol. 2. p. 274.

Habite en France, etc., sous l'écorce des pins.

3. Scolyte crénelée. *Scolytus crenatus*.

S. glaber, ater; elytris crenato-striatis.

Hylesinus crenatus. Fab. p. 390.

Latr. gen. vol. 2. p. 279. Panz. fasc. 15. t. 7.

Scolytus crenatus. Oliv. col. 4. n.° 78. pl. 2. f. 18.

Habite en France, en Allemagne, en Suède.

Etc.

PHLOIOTRIBE. (Phloiotribus.)

Antennes presque de la longueur du corselet; à massue allongée, composée de trois lames linéaires.

Corps des scolytes, mais plus court.

Antennæ thoracis ferè longitudine; clavus elongatus, lamellis tribus linearibus.

Corpus scolytorum, at brevius.

OBSERVATIONS.

La *phloiotribe* ne paraît différer des scolytes que par la singulière massue de ses antennes, ce qui a engagé M. Latreille à l'en séparer.

ESPECE.

1. *Phloiotribe* de l'olivier. *Phloiotribus oleæ*.

Latr. hist. nat. des crust. et des ins. vol. 11. p. 221.

Gén. ejusd. vol. 2. p. 280.

Scolytus oleæ. Oliv. col. 4. n.º 78. pl. 2. f. 21.

Hylesinus oleæ. Fab. dent. 2. p. 395.

Habite au midi de la France, dans le bois de l'olivier.

§§. Tête ayant un museau avancé.

LES CHARANSONITES.

Bouche très-petite, située à l'extrémité d'un museau avancé, plus ou moins long, ressemblant à un bec ou à une trompe, et formé par la partie antérieure de la tête.

Antennes insérées sur le museau dans le plus grand nombre. Abdomen grand ou gros. Le troisième article des tarses bilobé dans la plupart.

Parmi les coléoptères tétramères, les charansonites composent une famille très-nombreuse en espèces, et malheureusement trop célèbre par les dégâts que ces insectes causent à l'égard des végétaux, même les plus utiles à l'homme.

Ces insectes se reconnaissent au premier aspect par le museau avancé ou par l'espèce de trompe, quelque-

[*Celles qui sont indigènes de l'Europe.*]

5. Charanson vert. *Curculio viridis*.

C. virescens ; thoracis elytrorumque lateribus flavis. F.

Curculio viridis. Lin. Fab. éleut. 2. p. 512.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 337. pl. 2. f. 18.

Brachyrinus viridis. Latr. gen. vol. 2. p. 256.

Habite en Europe, dans les vergers.

6. Charanson grisâtre. *Curculio incanus*.

C. fuscus, pilis cinereis nitidisque adpersus ; antennis prolongis, ferrugineis.

Curculio incanus. Lin. Fab. éleut. 2. p. 518.

Panz. fasc. 19. t. 8. Geoff. 1. p. 282. n.º 10.

Oliv. coléopt. 5. n.º 83. pl. 31. f. 471.

Habite en Europe.

Etc.

RHYNCHÈNE. (Rhynchænus.)

Antennes de onze articles, coudées, en massue, insérées vers le milieu de la trompe ; à massue de trois ou quatre articles. Trompe ordinairement arquée, quelquefois fléchie vers la poitrine.

Corps ovale ou oblong.

Antennæ undecim-articulatæ, fractæ, clavate, versus medium rostri insertæ : clavæ tri seu quadriarticulatæ. Rostrum plerumque arcuatum, interdum ad pectus inflexum.

Corpus ovatum aut oblongum.

OBSERVATIONS.

Les *rhynchènes*, dont il s'agit, sont celles de Fabricius et d'Olivier que M. Latreille divise en *lignes*, *lipares* et *charançons*. Ces charansonites ne diffèrent de nos charançons que parce que leurs antennes, au lieu d'être attachées près

de l'extrémité de la trompe. Ces antennes sont coudées, minées par une massue triarticulée, perfoliée ou presque lide. Ce genre comprend les coléoptères les plus riches couleurs brillantes.

ESPÈCES.

[*Celles qui sont étrangères à l'Europe.*]

Charanson impérial. *Curculio imperialis*.

C. viridi-aureus; elytris striis elevatis, atris, brevibus, punctisque impressis viridi-aureis. Oliv.

Curculio imperialis. Fab. éleut. 2. p. 508.

Oliv. coléopt. 5. n.º 83. pl. 1. f. 1. p. 293.

Habite le Brésil. Très-bel insecte, fort recherché dans les collections.

Charanson royal, *Curculio regalis*.

C. viridi-cœruleus; elytris fuscis repandis aureis. Oliv.

Curculio regalis. Lin. Fab. éleut. 2. p. 508.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 297. pl. 1. f. 8.

Habite Saint-Domingue. Oliv. Insecte orné de couleurs très-brillantes.

Charanson somptueux. *Curculio sumptuosus*.

C. elytris virescentibus: punctis elevatis, atris, basi gibbis. F.

Curculio sumptuosus. Fab. éleut. 2. p. 508.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 294. pl. 1. f. 13.

Habite à Cayenne.

Charanson fastueux. *Curculio fastuosus*.

C. nigro-viridis; elytris punctato-striatis, basi utrinque gibbis, auro maculatis. Oliv.

Curculio fastuosus. Oliv. col. 5. n.º 83. p. 294. pl. 5. f. 51.

Curculio splendidus. Fab. éleut. 2. p. 507.

Habite au Brésil.

Etc.

Rhynchænus echii. Fab. éleut. 2. p. 482.

Panz. fasc. 17. t. 12.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 209. pl. 23. f. 317.

Habite en Europe, sur la vipérine.

6. Rhynchène des noisettes. *Rhynchænus nucum*.

R. femoribus dentatis; corpore græco, longitudinis rostri. F.

Curculio nucum. Lin. Panz. fasc. 42. t. 21.

Rhynchænus nucum. Fab. éleut. 2. p. 486.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 215. pl. 5. f. 47.

Habite en Europe. Sa larve vit dans les noisettes.

Etc., etc., etc.

C I O N E. (Cionus.)

Antennes de dix articles, légèrement coudées, insérées un peu au-delà du milieu de la trompe; à massue de quatre articles.

Corps court, ovale-arrondi, subglobuleux.

Antennæ decem-articulatæ, subfractæ, rostri paulo post medium insertæ: claud quadrarticulatæ.

Corpus breve, ovato-rotundatum, subglobosum.

OBSERVATIONS.

Les ciones tiennent d'assez près aux rhynchènes par leur forme, quoique en général leur corps soit très-court; mais leurs antennes, selon M. Latreille, n'ont que dix articles. Ces insectes n'ont point leurs cuisses postérieures renflées et ne sont point sauteurs, comme les orchètes et les ramphes.

E S P E C E S.

1. Cione de la scrophulaire. *Cionus scrophulariæ*.

C. femoribus dentatis; thorace albido; elytris maculis duabus atris albo connatis.

SANS VERTÈBRES.

353.

Rhynchosus scrophularia. Fab. éleut. 2. p. 478.

Curculio scrophularia. Lin. Geoff. 1. p. 296. n.º 44.

Cionus. Oliv. col. 5. n.º 83. p. 106. pl. 23. f. 314.

Habite en Europe, sur la scrophulaire. Selon M. Latreille, le

C. thapsus et le *C. verbasci* de Fabricius, ne sont que des variétés de cette espèce.

2. Cione de la blattaire. *Cionus blattariae.*

C. albidus; femoribus dentatis; elytris nigro variis; nuda-
culd dorsali bascos apicisque nigris.

Rhynchosus blattariae. Fab. éleut. 2. p. 479.

Habite en France, en Italie.

Etc.

R H I N E. (Rhina.)

Antennes coudées, insérées vers le milieu de la trompe, de huit articles : le dernier en massue allongée. Trompe droite, cylindrique, dirigée en avant.

Corps allongé. Pattes antérieures plus longues que les autres.

Antennae fractae, versus medium rostri insertae; articulis octo : ultimo clavam elongatam constituentes.

Rostrum rectum, cylindricum; antice porrectum.

Corpus elongatum. Pedes antici aliis longiores.

OBSERVATIONS.

La rhine serait une rhynchène si ses antennes avaient onze articles et leur massue moins simple. Elle paraît offrir le type d'un genre particulier.

ESPÈCE.

1. Rhine barbirostre. *Rhina barbirostris.* Lat.

Rhina. Latr. gen. vol. 2. p. 268.

Lixus barbirostris. Fab. éleut. 2. p. 501.

Tom. IV,

23

Charançon. Oliv. col. 5. n.º 83. pl. 4. f. 37. a. &c.

Sebanus. 4. t. 95. f. 5.

Habite en Afrique et dans l'Inde.

CALANDRE. (Calandra.)

Antennes de neuf articles, coudées, insérées, sur les côtés, à la base de la trompe; à massue solide, biarticulée. Trompe allongée, grêle, penchée.

Corps ovale, un peu en pointe aux deux bouts.

Antennæ novem-articulatæ, fractæ, rostri baseos lateribus insertæ: clavâ solidâ, biarticulatâ. Rostrum elongatum, gracile, nutans.

Corpus ovatum, extremitatibus subacutum.

OBSERVATIONS.

Les *calandres* sont bien distinguées des charançons, des rhynchènes, etc., puisque leurs antennes sont insérées latéralement à la base de la trompe, et qu'elles n'ont que huit ou neuf articles. Les espèces connues de ce genre sont encore peu nombreuses; mais l'une d'elles n'est que trop connue par les dégâts que sa larve fait dans les greniers, en dévorant le blé.

E S P È C E S.

1. Calandre palmiste. *Calandra palmarum*.

C. atra; elytris abbreviatis, striatis. F.

Curculio palmarum. Lin.

Calandra palmarum. Fab. érud. 2. p. 430.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 77. pl. 2. f. 16.

Habite l'Amérique méridionale. Sa larve vit dans les palmiers; on la mange.

2. Calandre raccourcie. *Calandra abbreviata*.

C. atra; thorace punctato; elytris substriatis. F.

Calandra abbreviata. Fab. éleut. 2. p. 436.

Latr. gen. crust. et ins. 2. p. 270.

Oliv. col. 5. n.º 83. pl. 16. f. 195. a. b.

Panz. fasc. 42. t. 3.

Habite en France; en Allemagne.

3. Calandre du blé. *Calandra granaria*.

C. picea; thorace punctato, longitudine elytrorum. F.

Curculio granarius. Lin.

Calandra granaria. Fab. éleut. 2. p. 437.

Oliv. col. 5. n.º 83. p. 95. pl. 16. f. 196. a. b.

Curculio. Panz. fasc. 17. t. 11. Géoff. 1. p. 286. n.º 18.

Habite en Europe, et dévore le blé des greniers.

4. Calandre du riz. *Calandra oryzae*.

C. picea; thorace punctato, longitudine elytrorum; elytris punctis dubius rufis. F.

Curculio oryzae. Lin.

Calandra oryzae. Fab. *ibid.* p. 438.

Oliv. col. 5. p. 97. pl. 7. f. 81. a. b.

Habite le Levant, l'Afrique, et souvent est apportée avec le riz qui nous vient de ces pays.

Etc.

ORGHÈTE. (Orchestes.)

Antennes presque droites, insérées près du milieu de la trompe, de dix articles : les trois derniers formant la massue. Trompe courbée en bas.

Corps ovale; corselet petit; pattes postérieures à cuisses épaisses et propres à sauter.

Antennae subrectae, rostri versus medium insertae, decem-articulatae : articulis tribus ultimis clavam formantibus. Rostrum subius inflexum.

Corpus ovatum; thorax parvus; pedes postici saltatorii; femoribus crassis.

OBSERVATIONS.

Les *orchètes* sont des charansonites sauteuses, et qui n'ont que dix articles aux antennes, dont les trois derniers forment une massue ovale. Elles tiennent de très-près aux ramphes par leurs rapports.

ESPECES.

1. Orchète de l'aulne. *Orchestes alni*.

O. niger, pubescens; thoracè elytrisquè fulvò rubris; elytris maculis duabus nigris.

Curculio alni. Lin. *Curculio*. Geoff. 1. p. 286. n.º 20.

Rhynchænus alni. Fab. Latr. gen. 2. p. 267.

Oliv. col. 5. n.º 83. pl. 32. f. 482.

Habite en Europe, sur l'aulne, le bouleau.

2. Orchète de l'osier. *Orchestes viminalis*.

O. pubescens, testaceus; elytris striatis.

Curculio quercus. Lin.

Rhynchænus viminalis. Fab. éleut. 2. p. 494.

Orchestes viminalis. Oliv. col. 5. n.º 83. pl. 32. f. 480.

Habite en Europe, sur le chêne, le saule, etc.

Etc.

RAMPHE. (Ramphus.)

Antennes droites ou presque droites, insérées à la base latérale de la trompe, entre les yeux, ayant onze articles : les quatre derniers formant une massue ovale. Trompe allongée, fléchiè vers la poitrine.

Corps ovale. Les pattes postérieures propres à sauter : leurs cuisses étant renflées.

Antennæ subrectæ, ad basin lateralem rostri, inter oculos insertæ, undecim-articulatæ; articulis qua-

ior ultimis clavam ovalem formantibus. Rostrum longatum, ad pectus inflexum.

Corpus ovatum. Pedes postici saltatorii : femoribus incrassatis.

OBSERVATIONS.

Les *ramphe* sont des charançonites sauteuses, comme les orchètes ; mais ils en sont bien distingués par leurs antennes. Par l'insertion des antennes, ces insectes ont une sorte de rapport avec les calandres.

ESPECE,

1. Ramphe flávicorne. *Ramphus flavicornis*.

Latr. hist. nat. des crust. et des ins. vol. 11. p. 94.

Et gen. vol. 2. p. 250.

Oliv. col. 5. n.º 81. pl. 3. f. 58. a. b. c.

Habite en France, etc., sur le prunier épineux. Le *R. tomentosus* d'Olivier paraît n'en être qu'une variété.

BRACHYCÈRE. (*Brachycerus*.)

Antennes courtes, droites, de neuf articles : le dernier formant une massue tronquée. Trompe courte ou médiocre, large, épaisse, penchée.

Corps renflé, raboteux. Elytres connées. Point d'écusson. Tous les articles des tarses entiers.

Antennæ breves, rectæ, novem articulatæ : articulo clavam truncatam formantē. Rostrum breviusculum ; latum, crassum, nutans.

Corpus ovatum, turgidum, asperum. Scutellum nullum. Tarsorum articuli omnes indivisi.

OBSERVATIONS.

Les *brachycères*, dont le genre fut établi par Olivier, sont, en quelque sorte, aux autres charançonites, ce que

les piméliés sont aux ténébrions. Ces insectes ont le corps ovale, renflé ou gibbeux, à élytres connées, aptères, embrassant l'abdomen par les côtés. Ils habitent, en général, les pays chauds, l'Afrique et les pays méridionaux de l'Europe, et se tiennent dans le sable.

ESPÈCES.

1. Brachycère aptère. *Brachycerus apterus*.

B. thorace spinoso, cruce impressâ; elytris ferrugineo-punctatis.

Brachycerus apterus. Oliv. col. 5. n.º 82. pl. 1. f. 3. a. b.

Curculio apterus. Lin.

Brachycerus apterus. Fab. élent. 2. p. 412.

Habite le Cap de Bonne-Espérance.

2. Brachycère algérien. *Brachycerus algerius*.

B. cinereus; thorace spinoso sulcato; elytris angulo duplici spinosis. F.

Brachycerus algerius. Fab. élent. 2. p. 415.

Oliv. col. *ibid.* pl. 2. f. 19. a. b.

Lat. gen. 2. p. 252.

Habite le midi de la France, l'Italie, la côte d'Afrique.

B R E N T E. (Brentus.)

Antennes filiformes ou s'épaississant un peu vers leur sommet, droites, à onze articles, et insérées au-delà du milieu de la trompe. Tête prolongée antérieurement en une trompe droite, le plus souvent très-longue, grêle, antennifère, et terminée par la bouche.

Corps allongé, subcylindrique, se rétrécissant antérieurement.

Antennæ filiformes aut sensim extrorsum subcrassiores, rectæ, undecim-articulatæ, post medium rostri insertæ. Caput in rostrum sæpius longissimum, gra-

cile , rectum , antenniferum , ore terminatum , anticè porrectum.

Corpus elongatum , subcylindricum , antice angustatum.

OBSERVATIONS.

Les *brentes*, par leur forme extraordinaire, sont, en quelque sorte, des charansonites exagérées. Toutes leurs parties sont allongées, étroites, et donnent à leur corps une forme presque linéaire. La partie antérieure de leur tête s'allonge en une espèce de trompe grêle, cylindrique, droite, toujours dirigée en avant, et quelquefois singulièrement remarquable par son extrême longueur. Outre cette forme extraordinaire, les *brentes* sont distinguées des charansons et des rhynchènes par leurs antennes non cou-dées. Ces insectes se trouvent sous les écorces des arbres dans les pays chauds.

ESPÈCES.

1. Brente barbicorne. *Brentus barbicornis*.

B. rostro longissimo, subtus barbato; elytris apice recurvato-spinosis; antennis filiformibus. F.

Brentus barbirostris. Fab. éleut. 2. p. 545.

Oliv. col. 5. n.º 84. p. 432. pl. 1. f. 5, et pl. 2. f. 5.

Habite la Nouvelle-Zélande.

2. Brente anchorago. *Brentus anchorago*.

B. femoribus anticis dentatis; thorace postice canaliculato; elytris striâ sesquialtera flavâ. F.

Curculio anchorago. Lin.

Brentus anchorago. Fab. *ibid.* p. 549.

Oliv. coléopt. 5. n.º 84; pl. 1. f. 2. a. b.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles.

Etc. Voyez, pour les autres espèces, Fabricius et Olivier.

CYLAS. (Cylas.)

Antennes droites, insérées vers le milieu de la trompe,

en massue au sommet, de dix articles : le dixième formant une massue ovale-oblongue. Trompe droite, avancée, cylindrique.

Corps allongé, rétréci antérieurement. Port des brentes.

Antennæ rectæ, versus medium rostri insertæ, apice clavatæ, decem-articulatæ : articulo decimo clavam ovato-elongatam constituyente. Rostrum rectum, cylindricum, porrectum.

Corpus elongatum, anticè angustatum. Habitus brentorum.

OBSERVATIONS.

Quoique les *cylas* aient beaucoup de rapports avec les brentes, leurs caractères, et particulièrement ceux de leurs antennes, me paraissent avoir suffisamment autorisé M. Latreille à en former un genre particulier.

ESPÈCES.

1. *Cylas brun.* *Cylas brunneus.*

C. brunneus, immaculatus; elytris ovatis levibus. Oliv.

Cylas brunneus. Lat. gen. 2. p. 244.

Oliv. col. 5. n.º 84 bis. p. 446. Brente, pl. 1. f. 3. a. b.

Brentus brunneus. Fab. élent. 2. p. 548.

Habite au Sénégal.

2. *Cylas fourmi.* *Cylas formicarius.* Oliv.

C. piceus, thorace ferrugineo.

Oliv. col. *ibid.* p. 446. pl. 2. f. 19.

Brentus formicarius. Fab. élent. 2. p. 549.

Habite aux Indes orientales.

A P O D È R E. (Apoderus.)

Antennes de onze articles, dont les trois derniers

ment la massue. Trompe courte, large, dilatée à son extrémité.

Tête dégagée ; un cou distinct. Abdomen large, obtus à son extrémité.

Antennæ subundecim articulatae, propè apicem ostri insertæ : articulis tribus ultimis clavam efformantibus. Rostrum breviusculum apice dilatatum.

Caput posticè attenuatum, collo distincto elevatum. Abdomen crassum, extremitate obtusum.

OBSERVATIONS.

Les apodères ont des rapports avec les attélabes, mais leur tête n'est point enchâssée postérieurement dans le corselet. Leurs jambes sont terminées par un seul éperon.

• ES P È C E S.

1. Apodère longicolle. *Apoderus longicollis*.

A. rufus ; collo elongato cylindrico-nigro ; elytris punctis impressis, striatis. Oliv. col. 5. n.º 81. p. 18. Attélabes, pl. 1, f. 25.

Attelabus longicollis. Fab. éleut. 2. p. 417.

Habite aux Indes orientales.

2. Apodère du noisetier. *Apoderus coryli*.

A. niger ; elytris rubris punctato-striatis.

Attelabus coryli. Lin. Fab. éleut. 2. p. 416.

Rhinomacer. Geoff. 1. p. 273. n.º 11.

Apoderus coryli. Oliv. col. 5. n.º 81. pl. 1. f. 14.

Habite en Europe, sur le noisetier et sur quelques autres arbres.

Sa larve en roule les feuilles en cylindre et s'y enferme pour se métamorphoser.

Etc.

A T T É L A B E. (Attelabus.)

Antennes de onze articles, insérées un peu au-delà du milieu de la trompe : les trois derniers articles for-

mant une massue. Trompe ordinairement courte, dilatée au sommet.

Tête sessile ou enchâssée postérieurement dans le corselet. Abdomen épais, obtus à son extrémité, les terminées par deux éperons.

Antennæ undecim-articulatæ, paulò post medium rostri insertæ : articulis tribus ultimis clavatis, mantibus. Rostrum, sæpius breve, latum, apicatum.

Caput sessile aut posticè intrà thoracem in abdomen crassum, extremitate obtusum. Tibiæ calcaratæ.

OBSERVATIONS.

Les attélabes semblent se rapprocher un peu des charançonites, et en indiquer le voisinage ; mais à trompe ordinairement courte et un peu dilatée à son extrémité. Ces insectes ont le corps ovale, rétréci en pointe antérieurement. Leurs antennes ne sont point coudées comme celles des charançons et des rhynchènes ; elles se terminent en massue foliée. Le pénultième article de leurs tarses est bilobé. Les larves des attélabes sont sans pattes, vivent de subtilement, et attaquent les feuilles, les fleurs, les fruits des plantes. Elles font d'autant plus de tort aux végétaux, qu'elles se tiennent cachées, soit dans des feuillets roulés, soit dans des fruits, soit dans les tiges des plantes. Elles s'enferment dans une coque pour se métamorphoser.

ESPÈCES.

1. Attélabes laque. *Attelabus curculionoides*. Lin.
A. niger ; thorace élytrisque striato-punctatis,
Attelabus curculionoides. Fab. élém. 2. p. 420.

Rhinomaor, Geoff. 1. p. 273. n.º 10.

Attelabus, n.º 2. Latr. gen. 2. p. 247.

Habite en Europe, sur différens arbres. Il a le corselet et les élytres rouges.

Atélabé de la vigne. *Attelabus bacchus*.

A. cupreo-viridulus, pubescens; antennis rostrique apice nigris.

Curculio bacchus. Lin.

Attelabus bacchus. Fab. Gout. 2. p. 421.

Rhynchites bacchus. Latr. gen. 2. p. 249.

Oliv. col. 5. n.º 81. pl. 2. f. 27.

Habite en Europe, sur la vigne et sur différens arbres. Sa larve vit dans les feuilles enroulées de la vigne, et fait un grand tort à cette plante en la dépouillant quelquefois presque totalement de ses feuilles.

Etc.

Lèvre supérieure apparente; palpes très-distincts; museau court.

BRUCHE. (Bruchus.)

Antennes filiformes, souvent pectinées ou en scie vers le sommet, insérées dans l'échancrure des yeux. Palpes inégaux. Mandibules simples, pointues. Les yeux ancrés.

Tête penchée, séparée du corselet; corps obtus postérieurement; les élytres ordinairement un peu plus larges que l'abdomen.

Antennæ filiformes, versus apicem sæpè serratæ et pectinatæ, in oculorum sinu insertæ. Palpi inæuales. Mandibulæ simplices, acutæ. Oculi emarginati.

Caput nutans , a thorace distinctum ; corpi posticè obtusum ; elytra sæpiùs abdomine paulò breviora.

OBSERVATIONS.

Les bruches appartiennent encore aux charansonites par leurs principaux caractères ; mais comme leur museau est un peu court et large , les parties de leur bouche sont plus distinctes que dans la plupart des autres charansonites. Leurs antennes sont filiformes , quoique s'épaississant un peu vers leur sommet , et , en général , elles sont un peu pectinées ou en scie dans leur partie supérieure. Elles sont presque de la longueur de la moitié du corps , et ont onze articles.

La tête des bruches est la partie la plus étroite de leur corps ; elle est inclinée en avant , séparée du corselet , et comme soutenue par un cou qui se courbe en avant. Le troisième article des tarsez est bilobé.

Les larves des bruches exercent de grands ravages sur les différentes graines , et particulièrement sur celles des plantes légumineuses , telles que les fèves , les lentilles , le vesces , etc. Elles attaquent aussi les graines du *theobroma* , de plusieurs palmiers , etc. La larve passe l'hiver dans la graine dont elle consomme une partie de la substance intérieure , et ensuite elle s'y métamorphose. On rencontre l'insecte parfait sur différentes fleurs. Les espèces connues de ce genre sont déjà assez nombreuses.

ESPECES.

1. Bruche des noyaux. *Bruchus nucleorum*.

B. cinereus ; elytris striatis ; femoribus posticis apicatis dentatis. F.

Bruchus nucleorum. Fab. eleut. 2. p. 396.

Oliv. col. 4. n.º 79. pl. 1. f. 1.

Habite l'Amérique méridionale. Oliv.

Bruche du pois. *Bruchus pisi.*

B. elytris nigris, albo maculatis; podice albo : punctis duobus nigris. F.

Bruchus pisi. Lin. Fab. éleut. 2. p. 396. Latr. gen. 2. p. 240.

Panz. fasc. 66. t. 11. Oliv. *ibid.* pl. 1. f. 6.

Mylabris. Geoff. 1. p. 267. n.º 1. pl. 4. f. 9.

Habite en Europe. Sa larve vit dans l'intérieur des pois, des lentilles, etc.

Bruche des graines. *Bruchus granarius.*

B. elytris nigris : atomis albis; femoribus posticis undentatis. F.

Bruchus granarius. Lin. Fab. éleut. 2. p. 399.

Oliv. *ibid.* pl. 1. f. 10. a. b.

Habite en Europe, dans différentes graines.

Etc.

ANTHRIBE. (Anthribus.)

Antennes de onze articles; les trois derniers formant une massue. Trompe aplatie, courte. Lèvre supérieure parente. Mandibules un peu fortes. Les yeux enfoncés.

Tête sessile. Corps ovoïde ou ovale-oblong. Le pénultième article des tarses bilobé.

Antennae undecim articulatæ : articulis tribus ultimis clavam formantibus. Rostrum planulatum, breve. Labrum conspicuum. Mandibulæ validiusculæ. Culi integri.

Caput sessile. Corpus obovatum aut ovato-oblongum. Tarsorum articulus penultimus bilobus.

OBSERVATIONS.

Les *anthribes* avoisinent les bruches par leurs rapports et en sont néanmoins très-distinctes. Leurs antennes sont en massue, quoique un peu moins dans les mâles que dans les femelles. Ces insectes fréquentent les arbres et les fleurs. On croit que leurs larves vivent sous les écorces. Plusieurs des macrocéphales d'Olivier, appartiennent à ce genre.

ESPECES.

1. Anthrîbe rhinomacer. *Anthribus rhinomacer*. Latr.

A. villosopiceus ; antennis pedibusque testaceis.

Rhinomacer attelaboides. Fab. élém. 2. p. 428.

Oliv. col. 5. n.º 87. pl. 1. f. 2.

Anthribus. Latr. gen. 2. p. 237.

Habite en Europe, en France, sur les pins.

2. Anthrîbe latirostre. *Anthribus latirostris*.

A. rostro latissimo plano ; elytris apice albis : punctis dubus nigris. F.

Anthribus latirostris. Latr. Fab. élém. 2. p. 428.

Panz. fasc. 15. t. 12.

Anthrîbe. Geoff. 1. p. 307. n.º 3. pl. 5. f. 2.

Habite en Europe, dans les bois.

Etc. Voyez l'*anthribus scabrosus* et l'*anthribus varius* de Fabricius.

QUATRIÈME SECTION.

Cinq articles aux tarses des deux premières paires de pattes, et quatre seulement à ceux de la troisième paire.

LES HÉTÉROMÈRES.

Les insectes de cette section sont évidemment intermédiaires ou moyens entre les C. tétramères ci-dessus

exposés, et les C. pentamères qui viennent après eux. La transition des tétramères aux hétéromères est, en effet, indiquée par les rhinites qui, quoique insectes hétéromères, offrent encore un museau avancé, comme dans les charansonites. Ces insectes sont très-nombreux et très-diversifiés dans leurs espèces.

Les entomologistes ont beaucoup varié dans la division de cette section, dans l'institution des familles, et surtout dans celle des genres nombreux qu'ils ont formés parmi ces insectes; ce qui rend cette même section plus difficile encore à étudier que la précédente.

Tendant toujours à simplifier la méthode et à faciliter les distinctions indispensables, j'emploie ici les principales coupes formées en dernier lieu par M. Latreille, les disposant entre elles selon mon opinion, et je divise les hétéromères, dont il s'agit, en cinq coupes primaires, de la manière suivante :

DIVISION DES C. HÉTÉROMÈRES.

§. *Un museau avancé, antennifère.*

Les rhinites.

§§. *Point de museau antennifère.*

(1) Tête ovalaire, sans cou, c'est-à-dire, sans rétrécissement brusque par derrière.

(a) Mâchoires sans dent cornée au côté interne.

(→) Antennes de grosseur égale, ou s'amincissant vers leur extrémité.

Les sténélites.

(→→) Antennes grossissant insensiblement, ou se terminant en massue, et ordinairement perforées.

Les taxicornes.

(b) Mâchoires ayant une dent cornée au côté interne.

Les mélasomes.

(a) Tête triangulaire ou en cœur, séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou.

Les trachélites.

LES RHINITES.

Un museau avancé et antennifère.

Les *rhinites* paraissent de véritables charansonites, la partie antérieure de leur tête formant un museau plus ou moins long, avancé et antennifère. Mais comme ces insectes sont de la section des *C. hétéromères*, j'ai dû les séparer des charansonites, qui terminent les *C. tétramères*, et les placer en tête des *C. hétéromères*, afin de conserver l'ordre des rapports.

Il n'y a que trois genres connus qui puissent être rapportés à la coupe des rhinites et que l'on ne doit pas écarter, savoir : le *rhinosime* qui tient de très-près à la division des bruchelles; le *rhinomacer* qui semble avoir des rapports avec les sténélites; et le *sténostome* qui avoisine les oedémères.

RHINOSIME. (*Rhinosimus*.)

Antennes de onze articles, grossissant vers le bout, et presque en massue. Museau plat, dilaté, plus ou moins avancé et antennifère. Mandibules bidentées à leur pointe.

Corps ovale-oblong. Les yeux entiers, globuleux.

Antennae undecim-articulatae, subclavatae aut extror-

*n sensim crassiores. Rostrum planulatum, anticè
ductum, antenniferum. Mandibulæ apice biden-
tæ aut bifidæ.*

Corpus ovato-oblongum. Oculi integri, globosi.

OBSERVATIONS.

Les *rhinosimes*, quoique hétéromères par les articles
leurs tarses, paraissent avoisiner les anthribes et les bru-
s par leurs rapports. Le pénultième article de leurs
ses est plus court que dans tous les autres hétéromères.
Ils ont les mâchoires bifides comme les rhinomacers,
is leurs mandibules sont fendues et bidentées à leur
inte.

ESPECES.

Rhinosime du chêne. *Rhinosimus roboris.*

R. rostro thorace pedibusque rufis; elytris nigro-aneis:

Curculio ruficollis. Ltn.

Anthribus roboris. Fab. élent. 2. p. 410.

Rhinosmus roboris. Latr. Oliv. col. 5. n.º 86. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe, en France, sous l'écorce des arbres.

Rhinosime planirostre. *Rhinosimus planirostris.*

*R. rostro plano latissimo, aneus, rostro pedibusque tes-
taceis.*

Anthribus planirostris. Fab. élent. 2. p. 410.

Panz. fasc. 15. t. 14.

An rhinosimus aneus? Oliv. col. 5. n.º 86. pl. 1. f. 3.

Habite en Europe.

Etc.

RHINOMACER. (Rhinomacer.)

Antennes filiformes, insérées au-delà des yeux. Mu-
a étroit, antennifère. Mandibules simples. Mâchoires
ides.

Corps ovale, rétréci antérieurement. Elytres dures.

Antennæ filiformes , ante oculos et ab illis distant rostro insertæ. Rostrum angustum antenniferum. Mandibulæ simplices. Maxillæ bifidæ.

Corpus ovatum , antice angustatum. Elytra rigida.

OBSERVATIONS.

D'après le caractère du museau antennifère , ce genre peut rester placé à côté des rhinosimes , avant le sténostome qui fait la transition aux sténélites , celles-ci ayant les céphalotrochantères en tête.

ESPÈCES.

1. *Rhinomacer charansonite. Rhinomacer curculionoides.*

R. villosogriseus , antennis pedibusque nigris.

Mycterus curculionoides. Oliv. coléopt. 5. n.º 85. pl. 1. f. 11

Panz fasc. 12. f. 8.

Rhinomacer curculionoides. Fab. élent. 2. p. 428.

Habite l'Europe australe. Se trouve sur la millefeuille.

2. *Rhinomacer des ombelles. Rhinomacer umbellatarum.*

R. supra cinereus , subtus albidus ; antennis tibiisque rufescentibus. Oliv.

Mycterus umbellatarum. Oliv. 5. n.º 85. pl. 1. f. 2.

Bruchus umbellatarum. Fab. élent. 2. p. 396.

Habite les îles de l'Archipel , sur les fleurs des ombellifères.

STÉNOSTOME. (Stenostoma.)

Antennes subfiliformes , insérées sur la trompe au-delà des yeux. Le dernier article des palpes cylindracé.

Corps allongé ; corselet étroit , subcylindrique. Elytres longues , un peu molles , rétrécies vers leur sommet.

Antennæ subfiliformes , ultra oculos rostro insertæ , Palporum articulus ultimus cylindræus.

Corpus elongatum ; thorax angustus , subcylindricus. Elytra longa , versus apicem angustata , molliuscula.

OBSERVATIONS.

Le sténostome ne tient plus aux rhinites que par son museau antennifère ; il avoisine tellement les tédémères par ses rapports que M. Latreille ne l'en avait pas séparé d'abord. Illiger le lui a envoyé sous le nom de *rhinomacer nécydaloïde*.

ESPECE.

1. Sténostome muselière. *Stenostoma rostrata*.

Leptura rostrata, Fab. élém. 2. p. 361.

OEdemera rostrata, Latr. gen. 2. p. 229.

Stenostoma, Latr. Considérations , etc. p. 217.

Habite la côte de Barbarie , la France australe.

LES STÉNÉLITES.

Antennes de grosseur égale , ou s'amincissant vers leur extrémité.

Les sténérites nous paraissent devoir suivre immédiatement la coupe artificielle , mais nécessaire , des rhinites. Quelques-unes , parmi elles , ont encore la partie antérieure de la tête un peu avancée en museau , mais qui n'est plus antennifère. Ces insectes n'ont point de cou ,

c'est-à-dire , que leur tête ne forme aucun rétrécissement brusque par derrière. Leurs mâchoires sont dépourvues de dent cornée au côté interne , et leurs antennes n'offrent ni massue, ni grossissement graduel vers leur extrémité. Ils ont des ailes , et paraissent vivre , en état de larve , dans le bois ou sous l'écorce des arbres.

M. *Latreille* , qui a établi cette famille et ses caractères , la divise d'après la considération de l'état des articles de leurs tarsi. En adoptant cette considération, nous présentons les deux divisions qui en résultent, de la manière suivante :

- (1) Ceux qui ont le pénultième article de tous leurs tarsi bilobé ou profondément échancré.

OEédémère.

Nothus.

Calope.

Lagrie.

Mélandrie.

- (2) Ceux qui ont tous les articles des tarsi, ou au moins ceux des postérieurs, entiers.

Serropalpe.

Hallomène.

Pythe.

Hélops.

Nilion.

Cistèle.

OE D'É M È R E. (OEdemera.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet , insérées devant les yeux : à articles cylindriques. Mandi-

boules bifides au sommet. Bouche avancée en museau court. Les yeux presque entiers.

Corps allongé. Elytres longues, molles, rétrécies vers leur extrémité.

Antennæ filiformes, thorace longiores, antè oculos insertæ : articulis cylindricis. Mandibulæ apice bifidæ. Os in rostrum breve productum. Oculi subintegri.

Corpus elongatum. Elytra longa, mollia, versùs apicem angustata.

OBSERVATIONS.

Sous le rapport de la forme générale du corps et de la mollesse des élytres, les *œdémères* semblent devoir être rapprochées des cantharides; sous d'autres rapports, néanmoins, l'on doit les en écarter et les rapprocher des calopes, etc., comme le fait M. Latreille. Ces insectes ont la tête sessile, les mandibules bifides au sommet, les palpes maxillaires terminés par un article comprimé ou en hache allongée, et les crochets des tarses simples.

On trouve ces insectes sur les herbes et les fleurs, dans les prés.

ESPECES.

1. *Œdémère bleue. Œdemera cœrulea.*

Œ. cœrulea; elytris subulatis; femoribus posticis clavatis arcuatis.

Necydalis cœrulea. Lin. Fab. clent. 2. p. 372.

Œdemera cœrulea. Oliv. col. 3. n.º 50. pl. 2. f. 16.

Latr. gen. 2. p. 228.

Habite en Europe, sur les plantes. C'est la cantharide; n.º 3, de Geoffroy.

2. *Œdémère bleuâtre. Œdemera cœrulescens.*

Œ. thoracis teretiusculo, corpore cœruleo subopaco:

Cantharis cœrulea. Lin.

Necydalis cœrulescens. Fab. éleut. 2. p. 369.

OEdemera cœrulescens. Latr. Oliv. col. 3. n.º 50. pl. 2.
f. 14.

Habite en Europe, sur les plantes.

Etc.

NOTHUS. (Nothus.)

Antennes filiformes, simples, plus longues que le corselet, insérées dans une échancrure des yeux. Mandibules bifides au sommet. Palpes maxillaires ayant le dernier article en hache.

Corps allongé, étroit.

Antennæ filiformes, simplices, thorace longiores, in oculorum sinu insertæ. Mandibulæ apice bifido. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi.

Corpus elongatum, angustum, subcylindricum.

OBSERVATIONS.

Le genre *nothus*, établi par M. Latreille, dans son ouvrage intitulé : *Considérations*, etc., p. 417, embrasse quelques espèces encore rares et peu connues. Il paraît faire la transition des *œdémères* aux *calopes*.

ESPECES.

1. *Nothus clavipède. Nothus clavipes.*

IV. nigricans, griseo-pubescent; femoribus posticis clavatis.
Oliv.

Nothus clavipes. Oliv. Encycl. n.º 1.

Habite en Hongrie.

2. *Nothus brûlé. Nothus præustus.*

IV. testaceus; capite, pectore, maculis duabus thoracis apiceque elytrorum nigris. Oliv.

SANS VERTÈBRES.

375

Nothus præustus. Oliv. Encycl. n.º 2.

Habite en Hongrie.

Etc.

CALOPE. (Calopus.)

Antennes filiformes, un peu longues, en scie, surtout dans les mâles. Les yeux échancrés. Mandibules bifides à leur pointe.

Corps allongé, étroit. Le pénultième article des tarses bifide.

Antennæ filiformes, thorace multò longiores, serratæ præsertim in maribus; in oculorum sinu insertæ. Mandibulæ arice bifidæ. Oculi emarginati.

Corpus elongatum, angustum. Tarsorum articulus penultimus bifidus.

OBSERVATIONS.

Le calope, ayant les yeux échancrés et les antennes insérées dans l'échancrure des yeux, a été regardé comme un capricorne, par Linné et Degeer; mais ce coléoptère, par ses tarses, est un hétéromère. Or, ayant les mandibules bifides, il paraît se ranger assez naturellement dans la division des sténélites qui ont le pénultième article de tous les tarses bilobé. Cet insecte a la lèvre inférieure échancrée, et le devant de la tête un peu avancé en museau.

ESPECE.

1. Calope serraticorne. *Calopus serraticornis*.

Cerambix serraticornis. Lin.

Calopus serraticornis. Fab. Élémt. 2. p. 312.

Latr. gen. 2. p. 203.

Oliv. col. 4. n.º 72. pl. 1. f. 1

Panz. fasc. 3. t. 15.

Habite l'Europe boréale, dans les bois.

Chrysomela caraboides. Lin.

Melandria serrata. Fab. éleut. 1. p. 163.

Melandria caraboides. Latr. gen. 2. p. 191.

Serropalpus caraboides. Oliv. col. 3. n.º 57 bis. pl. 1. f. 1.

Hélips. Panz. fasc. 9. t. 4.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

2. Mélandrie variée. *Melandria variegata*. Latr.

M. fusca; *elytris pallide testaceis, fusco variis.*

Serropalpus variegatus. Bosc. Act. soc. hist. nat. tab. 10. f. 2.

Oliv. col. 3. n.º 57. bis. pl. 1. f. 2.

Dircæa variegata. Fab. éleut. 2. p. 90.

Habite aux environs de Paris.

Etc. Voyez le *dircæa discolor* de Fabricius et quelques autres qui suivent.

SERROPALPE. (Serropalpus.)

Antennes filiformes, à articles allongés, la plupart cylindriques. Palpes maxillaires très-saillans, plus longs que la tête, en scie, à dernier article en hache allongée.

Corps long, subcylindrique. Elytres presque linéaires. Les quatre tarses antérieurs seuls ayant le pénultième article bilobé.

Antennæ filiformes; articulis elongatis plerique cylindricis. Palpi maxillares valde exserti, capite longiores, serrati; articulo ultimo securem elongatam simulante.

Corpus longum, subcylindricum. Elytra sublinearia. Tarsi quatuor antici articulo penultimo bilobo; postici articulis omnibus integris.

OBSERVATIONS.

Le *serropalpe* a le corps bien plus allongé que celui des *mélândries*, et s'en distingue particulièrement par les arses de ses deux pattes postérieures dont tous les articles sont entiers.

ESPECE.

1. Serropalpe strié. *Serropalpus striatus*.

Latr. gen. vol. 1. tab. 9. f. 12. et vol. 2. p. 193.

Dircasa barbata. Fab. élent. 2. p. 88.

Habite en Allemagne, en France, sur le vieux bois.

HALLOMÈNE. (Hallomenus.)

Antennes filiformes, insérées presque dans l'échancrure des yeux. Mandibules bidentées au sommet. Palpes presque filiformes; les maxillaires plus longs, à dernier article subcylindrique.

Corps ovale-oblong, un peu déprimé. Tous les tarses à articles entiers.

Antennæ filiformes, in oculorum sinu ferè insertæ. Mandibulæ apice bidentato. Palpi subfiliformes: maxillaribus longioribus, articulo ultimo subcylindrico.

Corpus ovato-oblongum, depressiusculum. Tarsi omnes articulis integris.

OBSERVATIONS.

Les *hallomènes*, ainsi que les quatre genres qui suivent, ont tous les articles de leurs tarses entiers, ce qui les dis-

tingue des sténélites précédentes. Leurs antennes sont à peu-près de la longueur du corselet.

ESPECE.

1. Hallomène humérale. *Hallomenus humeralis*.

Latr. gen. vol. 1. tab. 10. f. 11. et vol. 2. p. 194.

Panz. fasc. 16. t. 17.

Dircæa humeralis. Fab. élém. 2. p. 91.

Habite en Allemagne, etc. dans les champignons et sous l'écorce des arbres.

P Y T H E. (Pytho.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet, insérées devant les yeux. Mandibules échancrées à leur pointe. Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, comprimé, obtrigone.

Corps allongé, très-aplati. Corselet presque orbiculaire, plane.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine, antè oculos insertæ. Mandibulæ apice acuto emarginato. Palpi maxillares articulo majori, compresso, obtrigono.

Corpus oblongum, valdè depressum; thorace sub-orbiculato, plano.

OBSERVATIONS.

Les *pythes* tiennent d'assez près aux hallomènes, mais leurs palpes maxillaires sont terminés différemment. Leur corps est aplati presque comme celui du *cossyphe*.

ESPECE.

1. Pythe bleu. *Pytho cæruleus*.

P. niger; thorace sulcato; elytris striatis cæruleis; abdomine rufo.

Pytho cœruleus. Latr. gen. 2. p. 196.

Fab. éleut. 2. p. 95. Panz. fasc. 95 t. 2.

Tenebrio depressus. Lin. Oliv. col. 3 n.º 57. pl. 2. f. 19.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Etc. Voyez *pytho festivus* et *pytho castaneus* de Fabricius.

HÉLOPS. (Helops.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet ou un peu plus longues. Mandibules bidentées au sommet. Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, en forme de hache.

Corps ovale-oblong, convexe.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine vel paulo longiores. Mandibulæ apice bidentatæ. Palpi maxillares articulo majori securiformique terminati.

Corpus ovato-oblongum, convexum.

OBSERVATIONS.

Les *hélops* ont été regardés comme ayant beaucoup de rapports avec les *ténébrions*, et Linné ne les en distinguait même pas. Diverses considérations néanmoins paraissent exiger qu'on les en écarte assez considérablement. Ces insectes courent assez vite, ont souvent d'assez belles couleurs, volent pour la plupart et tous manquent de dent cornée au côté interne des mâchoires. Ils ne rongent que des substances végétales.

ESPECES.

1. Hélops lanipède. *Helops lanipes*.

H. æneus; *elytris striatis acuminatis*.

Tenebrio lanipes. Lin. Geoff. 1. p. 349. n.º 5.

Helops lanipes. Fab. 1. p. 157. Panz. fasc. 50. t. 2.

Latr. gen. 2. p. 188. Oliv. col. 3. n.º 58. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe ; sous l'écorce des arbres.

2. Hélops strié. *Helops striatus*.

H. nigro-cæneus, nitidus ; elytris striatis obtusis ; antennis pedibusque piceis. Oliv.

Helops striatus. Oliv. col. 3. n.º 58. pl. 1. f. 4.

Latr. gen. 2. p. 188. Ténébrion. Geoff. 1. p. 348. n.º 4.

Helops caraboides. Panz fasc. 24. t. 3.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Etc.

NILION. (Nilio.)

Antennes filiformes, un peu grenues. Palpes intégraux.

Mandibules courtes, bidentées au sommet.

Corps hémisphérique ; corselet très-court, transversal. Elytres un peu molles.

Antennæ filiformes ; articulis rotundato - conicis. Palpi inæquales. Mandibulæ breves, apice bidentatæ.

Corpus hemisphæricum ; thorax brevissimus, transversus. Elytra molliuscula.

OBSERVATIONS.

Le *nilion* a le port d'une coccinelle ; mais c'est un hétéromère, et ses antennes ne sont point en massue. Il est velu et noirâtre en-dessus. *

ESPECE.

i. Nilion velu. *Nilio villosus*.

Latr. vol. 1. tab. 10. f. 2.

Nilio. Lat. gen. 2. p. 199.

Oegithus marginatus. Fab élent. 2. p. 10.

Habite la Guyane. De Cayenne. Richard.

CISTÈLE. (Cistela.)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet, insérées dans l'échancrure des yeux. Mandibules entières à leur pointe. Palpes subfiliformes, inégaux. Les yeux échancrés.

Corps ovale, un peu convexe. Elytres plus larges que le corselet. Onglets des tarses simples, dentelés.

Antennae filiformes, thorace paulò longiores, inculorum sinu insertae. Mandibulae apice acutò indiso. Palpi subfiliformes, inaequales. Oculi lunati.

Corpus ovale vel oblongo-ovatum, convexiusculum. Elytra thorace latiora. Tarsorum ungues simplices lenticulati.

OBSERVATIONS.

Les *cistèles*, que Linné confondait avec les chrysomèles, appartiennent aux coléoptères hétéromères. Ce ne sont ni des ténébrionites ni des cantharidies, mais des sténélites distinguées des autres par leurs mandibules entières à leur pointe. Ces insectes sont, en général, assez petits. Leur tête est inclinée en avant; leur corps est rétréci antérieurement, et leurs élytres couvrent l'abdomen dans toute sa longueur. On les trouve sur les fleurs; ils ont des couleurs assez brillantes.

ESPÈCES.

Cistèle céramboïde. *Cistela ceramboides*.

C. antennis serratis; corpore infra nigro; elytris flavo-rufis, striatis.

Chrysomela ceramboides. Lin.

Cistela ceramboides. Fab. éleut. 2. p. 16.

Oliv. col. 3. n.º 54. pl. 1. f. 4. a. b.

Latr. gen. 2. p. 226. Mordelle. Geoff. 1. p. 354. n.º 3.

Habite en Europe, dans les bois.

2. Cistèle soufrée. *Cistela sulphurea*.

C. flava; *elytris sulphureis*.

Chrysomela sulphurea. Lin.

Cistela sulphurea. Fab. p. 18 Latr. p. 226.

Oliv. col. 3. n.º 54. pl. 1. f. 6.

Tenebrio Geoff. 1. p. 351. n.º 11.

Habite en Europe, sur la millefeuille, les fl. ombellées.

3. Cistèle lepturoïde. *Cistela lepturoides*.

C. atra; *thorace quadrato*; *elytris striatis testaceis*.

Cistela lepturoides. Fab. éleut. 2. p. 17.

Oliv. col. 3. n.º 54. pl. 1. f. 3. a.

Panz. fasc. 5. t. 11.

Habite le midi de l'Europe.

Etc.

LES TAXICORNES.

Les antennes grossissent insensiblement vers leur extrémité ou se terminent en massue, et sont ordinairement perfoliées.

Cette troisième famille de coléoptères hétéromères nous semble intermédiaire entre les sténélites et les mélasomes. Les insectes qui s'y rapportent ont, comme les sténélites, une tête ovoïde, sans rétrécissement brusque par derrière, des mâchoires dépourvues de dent cornée au côté interne; mais leurs antennes grossissent insensiblement vers leur sommet ou sont terminées en massue. Presque tous sont pourvus d'ailes. Plusieurs parmi eux vivent dans les champignons, et les autres sous les écorces des arbres ou à terre. En employant les caractères

ères indiqués par M. Latreille, je les distribue de la manière suivante :

(1) Tête saillante ou découverte, ne s'offrant point dans une échancrure du corselet.

(a) Base ou insertion des antennes découverte, non cachée par le bord latéral ou avancé de la tête :

Orchésie.

Tétratome.

Léiode.

(b) Insertion des antennes cachée sous les bords latéraux de la tête.

Cnodalon.

Epitrage.

Elédone.

Trachyscèle.

Phalérie.

Diapère.

Hypophlée.

(2) Tête cachée sous le corselet, ou reçue dans une échancrure de sa partie antérieure.

Cossyphe.

Hélée.

ORCHÉSIE. (Orchesia.)

Antennes courtes, de onze articles : les trois derniers formant une massue. Palpes maxillaires saillans, à dernier article en hache.

Tête très-inclinée. Corps ovale-oblong.

Antennæ breves, undecim-articulatæ : articulis tribus ultimis clavam formantibus. Palpi maxillares exserti, articulo ultimo securiformi.

Tome IV.

25

Caput valdè nutans. Corpus oblongo-ovatum.

OBSERVATIONS.

L'*orchésie* ressemble beaucoup à l'hallomène par son aspect ; mais , outre que ses antennes sont en massue , les quatre tarsi antérieurs ont le pénultième article bilobé , tandis que dans l'hallomène tous les tarsi ont leurs articles entiers.

ESPECE.

1. Orchésie luisante. *Orchesia micans.*

Laur. gen. 2. p. 194.

Dircæa micans. Fab. Eleut. 2. p. 91.

Hallomenus micans. Panz. fasc. 16. t. 18.

Habite en Europe , dans les bolets. Les jambes postérieures ont deux épines à leur extrémité.

TÉT RATOME. (Tetratoma.)

Antennes de la longueur du corselet , terminées en une massue perfoliée , de quatre articles. Palpes maxillaires plus longs que les labiaux.

Corps ovale. Tous les tarsi à articles entiers.

Antennæ thoracis longitudine : clavæ quadriarticulatæ perfoliatæ terminatæ. Palpi maxillares labialibus longiores.

Corpus ovatum. Tarsi omnes articulis integris.

OBSERVATIONS.

Les *tétratomes* vivent dans les champignons comme les diptères et s'en distinguent principalement par leurs antennes en massue. Ils n'ont point d'épines à leurs jambes postérieures.

ESPECES.

1. Tétratome des champignons. *Tetratoma fungorum*.*T. rufum*; capite elytrisque nigris. F.*Tetratoma fungorum*. Fab. élent. 2. p. 574.

Latr. gen. 2. p. 180. Panz. fasc. 9. t. 10.

Habite en Europe, dans les champignons.

2. Tétratome de Desmarests. *Tetratoma Desmarestii*.*T. capite*, thorace elytrisque cupreo-viridibus nitidis.*Tetratoma Desmarestii*. Latr. gen. 2. p. 180.

Habite aux environs de Paris, dans le boîet du chêne.

LÉIODE. (Leiodes.)

Antennes courtes, terminées par une massue perfectionnée de cinq articles : le second article de la massue fort petit. Palpes courts.

Corps en ovale raccourci, presque hémisphérique. Jambes extérieurement épineuses.

Antennae breves, clavâ porfoliatâ, quinque-articulatâ terminatâ : clava articulo secundo perparvo. Palpi breves.

Corpus ovato-abbreviatum, subhemisphaericum. Pedes tibis extus spinosis.

OBSERVATIONS.

Les *léiodes* ayant le corps court, en ovale arrondi, convexe et lisse, sont faciles à reconnaître. On les trouve sur les plantes et les arbres.

ESPECES.

1. Léiode brune. *Leiodes picea*. Lat.

L. picea; antennis pedibusque rufis; elytris punctato-striatis; tibiis posticis arcuatis. P.

Anisostoma picea. Panz. fasc. 37. f. 8.

Leiodes picea. Latr. gen. 2. p. 181.

Habite en Europe, sur les plantes.

2. Léiode ferrugineuse. *Leiodes ferruginea*.

L. ferruginea, elytris striatis; tibiis posticis rectiusculis.

Anisostoma ferruginea. Fab. élent. 1. p. 99.

Sphæridium ferrugineum. Oliv. col. 2. n.º 15. pl. 3. f. 14.

Habite en Europe.

3. Léiode humérale. *Leiodes humeralis*.

L. atra, nitida; elytris macula baseos rubra.

Anisostoma humeralis. Fab. élent. 1. p. 99.

Panz. fasc. 23. t. 1. *Sphæridium*.

Habite en Europe, sur les arbres.

CNODALON. (Cnodalon.)

Antennes grossissant insensiblement vers leur extrémité, les six derniers articles imitant des dents de scie. Palpes maxillaires terminés en hache.

Corps ovale, très-bombé; corselet transversal.

Antennæ sensim extrorsum crassiores; articulis sex ultimis compressis, latere interno dilatato-serratis.

Palpi maxillares articulo ultimo securiformi.

Corpus ovale, gibbum. Thorax transversus.

OBSERVATIONS.

Le *cnodalon* a un peu le port d'un érotyle. Ses antennes sont de la longueur du corselet, et leur insertion n'est plus à découvert. Le sternum se termine postérieurement en une pointe reçue dans une fourche située entre les secondes pattes.

ESPECE.

1. *Cnodalon* vert. *Cnodalon viride*.

Latr. gen. vol. 1. tab. 10. f. 7. et vol. 2. p. 182.

Ejnad. hist. nat., etc. vol. 10. pl. 69. f. 5 et p. 320.

Habite à Saint-Domingue. Il est d'un vert bleuâtre.

EPITRAGE. (*Epitragus*.)

Antennes grossissant insensiblement vers leur extrémité, les quatre derniers articles presque dentiformes. Palpes maxillaires à dernier article plus grand, obtrigone. Menton grand, recouvrant la base des mâchoires.

Corps oblong, à dos convexe. Corselet carré ou en trapèze.

Antennæ sensim extorsim crassiores, articulis quatuor ultimis subdentiformibus. Palpi maxillares articulo majori obtrigono. Mentum magnum, maxillarum basim obtegens.

Corpus oblongum, dorsi medio convexo. Thorax quadratus aut trapeziformis.

OBSERVATIONS.

L'*épitrage* est remarquable par ses antennes courtes, son menton, et son corps oblong, un peu en pointe aux extrémités.

ESPECE.

1. Epitrage brun. *Epitragus fuscus*. Latr.

Latr. gen. vol. 1. tab. 10. f. 1 et vol. 2. p. 183.

Habite à Cayenne.

ELÉDÔNE. (*Eledona*.)

Antennes courtes, arquées; à derniers articles plus grands; formant une massue oblongue et comprimée.

Palpes filiformes : le dernier article des maxillaires sub-cylindrique.

Corps ovale ; corselet transverse.

Antennæ breves, arcuatæ : articulis aliquot ultimis majoribus elavem) oblongam compressamque formantibus. Palpi filiformes : maxillarum articulo ultimo subcylindrico.

Corpus ovatum ; thorax transversus.

OBSERVATIONS.

L'*élédone* a la tête en partie cachée sous le corselet, le corps légèrement convexe, un peu inégal ou rude en dessus, ce qui l'a fait considérer comme un opatre. Elle paraît se rapprocher davantage des diaspères. On en connaît plusieurs espèces.

ESPECE.

1. *Elédone agaricicole. Eledona agaricicola. Latr.*

E. obscure nigricans ; thorace rugosulo ; elytris striatis.

Bolitophagus agaricola. Fab. éleut. 1. p. 114.

Opatrum agaricola. Panz. fasc. 43. t. 9.

Oliv. col. 3. n. 56. pl. 1. f. 11. a. b.

Eledona. Latr. gen. 2. p. 178.

Habite en Europe, dans les bolets.

Etc. Voyez les autres espèces dans Fabricius et Latreille.

TRACHYSCÈLE. (Trachyscelis.)

Antennes à peine plus longues que la tête, terminées par une massue ovale, perfoliée, de six articles.

Corps arrondi, bombé. Pattes fortes, fousseuses ; jambes très-épineuses.

Antennæ capite vix longiores, articulis sex ulti-

mis clavam perfoliatam breviter ovatam effloientibus.

Corpus rotundatum, convexum. Pedes validissimi, fossorii; tibiis spinosis.

OBSERVATIONS.

Les *trachyscèles* avoisinent les diapères et surtout les phaléries de M. Latreille. Elles s'enterrent dans le sable des bords de la mer. Leurs mandibules sont entières à leur pointe.

ESPECE.

1. *Trachyscèle aphodiotide. Trachyscelis aphodioides.*

Latr. gen. crust. et ins. 4. p. 379.

Habite aux environs de Montpellier, sur les bords de la mer.

PHALÉRIE. (Phaleria.)

Antennes insérées sous un rebord, grossissant insensiblement, et perfoliées seulement près de l'extrémité.

Corps ovale ou en carré long, un peu déprimé. Jambes antérieures élargies, épineuses, comme propres à fouir.

Antennæ infra clypei marginem insertæ, sensim extrorsum crassiores, versus extremitatem perfoliatæ.

Corpus ovato-oblongum, subdepressum. Pedes antici tibiis dilatatis spinosis subfossoriis.

OBSERVATIONS.

Les *phaléries* avoisinent les diapères par leurs rapports, mais leur corps est plus allongé, moins bombé, et ce n'est

que près de leur extrémité que les antennes sont perfoliées. Les mâles ont souvent des tubercules sur la tête. On croit qu'elles vivent dans le bois pourri ou sous l'écorce des arbres.

ESPÈCES.

1. Phalérie cornue. *Phaleria cornuta*.

Ph. ferruginea; *mandibulis porrectis recurvis corniformibus*.

Trogossita cornuta. Fab. élent. 1. p. 153.

Phaleria cornuta. Latr. gen. 1. t. 10. f. 4. et vol. 2. p. 175.

Habite l'Afrique boréale, l'Asie australe.

2. Phalérie des cuisines. *Phaleria culinaris*.

Ph. ferruginea; *elytris crenato-striatis*; *tibiis anticis dentatis*.

Tenebrio culinaris. Lin. Fab. él. 1. p. 148.

Phaleria culinaris. Latr. gen. 2. p. 175.

Tenebrio culinaris. Oliv. col. 3. n.° 57. pl. 1. f. 13.

Habite en Europe, sous les écorces, dans les tas de blé.

Etc.

DIAPÈRE. (Diaperis.)

Antennes perfoliées, grossissant insensiblement vers le bout. Palpes filiformes.

Corps ovoïde, très-convexe. Tête inclinée et un peu enfoncée sous le corselet. Toutes les jambes allongées, également étroites.

Antennæ perfoliatæ, sensim extrorsum crassiores. Palpi filiformes.

Corpus obovatum, vel ovato-rotundatum, valdè convexum. Caput thorace partim occultatum. Tibiæ omnes elongatæ subæquè angustæ.

OBSERVATIONS.

Les *diapères* vivent dans les champignons. Ils ont le corps plus raccourci et plus convexe que celui des phalères, et leurs antennes, qui grossissent insensiblement vers le bout, sont perfoliées dans presque toute leur longueur.

ESPECES.

1. Diapère du bolet, *Diaperis boleti*.

D. nigra; elytris fuscis tribus flavis repandis.

Diaperis. Geoff. 1. p. 337, pl. 6. f. 3. *Chrysomela boleti*. Lin.

Diaperis boleti. Fab. éleut. 2. p. 586.

Oliv. col. 3. n.° 55. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Habite en Europe, dans les bolets des arbres.

2. Diapère tacheté. *Diaperis maculata*.

D. atra; elytris rufis: puncto suturali fascisque atris.

Diaperis hydni. Fab. éleut. 2. p. 586.

Diaperis maculata. Oliv. col. 3. n.° 55. pl. 1. f. 2. a. b.

Habite la Caroline. Bosc.

Etc.

HYPOPHLÉE. (*Hypophlæus*.)

Antennes à peine de la longueur du corselet, grossissant un peu vers le bout, et à articles perfoliés, le dernier ovale.

Corps allongé, presque linéaire. Corselet en carré long.

Antennæ thoracis vix longitudine, extrorsum sensim crassiores, articulis perfoliatis; ultimo ovato.

Corpus elongatum, sublineare. Thorax elongatus, quadratus.

OBSERVATIONS.

Les *hypophlées* sont des ips d'Olivier, et ont aussi le corps allongé, presque linéaire. Elles vivent sous les écorces des arbres, et sont agiles.

ESPECES.

1. Hypophlée bicolor. *Hypophlæus bicolor*.

H. rufus, nitidus; *elytris nigris*, *basi fasciatim rufis*.

Ips bicolor. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 2. f. 14. a. b.

Hypophlæus bicolor. Latr. gen. 2. p. 174. Fab. él. 2. p. 559.

Panz. fasc. 12. t. 14.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

2. Hypophlée marron. *Hypophlæus castaneus*.

H. lavis, nitidus, *castaneus*; *antennis nigris*.

Hypophlæus castaneus. Fab. élent. 2. p. 558.

Panz. fasc. 12. t. 13.

Ips taxicornis. Oliv. col. 2. n.º 18. pl. 1. f. 2. a. b.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Etc.

C O S S Y P H E. (Cossyphus.)

Antennes courtes, de onze articles; les cinq derniers formant une massue perfoliée. Palpes maxillaires à dernier article plus large, sécuriforme.

Tête cachée sous le corselet. Corps ovale - oblong; très-plat. Le corselet et les élytres débordant horizontalement de tous côtés.

Antennæ brevès, undecim-articulatæ, articulis quinque ultimis clavam perfoliatam formantibus. Palpi maxillares articulo ultimo latiore securiformi.

Caput sub thorace absconditum. Corpus ovato-

oblongum, valdè depressum; thoracis elytrorumque limbus horizontaliter productus undique marginans.

OBSERVATIONS.

Les *Cossyphus* ressemblent aux lampyres par leur corselet plat, chypéiforme, débordant et recouvrant la tête; mais leurs tarses, leurs antennes et leurs palpes les en distinguent considérablement. Selon *Olivier*, les mandibules de ces insectes sont bifides à leur pointe qui est tronquée. On ne connaît de ce genre que deux ou trois espèces, qui sont même médiocrement distinctes.

ESPECES.

1. Cossyphus déprimé. *Cossyphus depressus*.

C. brunneus; elytrorum carina à basi ad apicem producta.

Cossyphus depressus. Fab. élém. 2. p. 98.

Oliv. col. 3. n. 44. Pl. nat. f. 2. a. b. c.

Latr. gen. 2. p. 184.

Habite aux Indes orientales.

2. Cossyphus de Hoffmannseg. *Cossyphus Hoffmannsegii*.

C. brunneus; elytrorum carina singula utraq. extremis oblitterata.

Cossyphus Hoffmannsegii. Latr. gen. 2. p. 185.

Ejisd. Hist. nat., etc., vol. 10. p. 325. pl. 99. f. 2.

Habite en Portugal et en Barbarie.

Voyez le *Cossyphus planus* de Fabricius.

HÉLÉE. (Hélea.)

Antennes presque de la longueur du corselet, grossissant un peu vers leur extrémité, les quatre derniers articles subglobuleux. Le menton à lobe du milieu avancé, cachant la base de la bouche.

Tête reçue dans l'échancrure du corselet. Corps ovale, à dos convexe. Corselet transverse, semi-circulaire, échancré antérieurement. Un limbe produit par le corselet et les élytres entourant tout le corps.

Antennae thoracis sublongitudine, sensim extrorsum crassiores, articulis quatuor ultimis subglobosis. Mentum lobo mediano producto oris basim obtegens.

Caput in incisurâ thoracis insertum. Corpus ovatum, dorso convexo. Thorax transversus, semi-circularis, anticè profundè emarginatus. Limbus thorace elytrisque emissus, corpus totum obvallans.

OBSERVATIONS.

Les *hélées*, dont M. Latreille a déjà fait mention dans son ouvrage intitulé, *Hist. nat. des Crust.*, etc. [vol. 10, p. 326], sont des insectes fort remarquables de la Nouvelle-Hollande, et qui avoisinent de très-près les cossyphes par leurs rapports. Leur corselet et leurs élytres sont partout débordans comme dans les cossyphes; mais leurs antennes ne sont point en massue, et la partie antérieure de leur corselet offre une échancrure profonde dans laquelle la tête est reçue et se trouve apparente. Cette échancrure ressemble quelquefois à un trou, parce que les deux angles de ses bords sont prolongés en pointe et s'avancent l'un sur l'autre. La partie que couvrent les élytres est convexe et non aplatie. Ces insectes sont noirs ou d'une couleur sombre. Ils indiquent, en quelque sorte, le voisinage des ténébrionites. Parmi les espèces de la collection du Muséum, je citerai seulement les suivantes.

ESPÈCES.

1. *Hélée cornue, Helea cornuta.*

H. nigra; thorace postice cornuto: thoracis elytrorumque limbo reflexo, ascendente; dorso lavi.

Helea cornuta. Latr. catal.

Habite l'île des Kangaroos. Péron et Le Sueur. Espèce grande.

4. Héléé hispide. *Helea hispida*.

H. nigra; thorace submutico; limbo generali reflexo; dorso setis nigris hispido.

Helea fenestrata. Latr. catal.

Habite l'île des Kangaroos. Même taille et même aspect que la précédente.

5. Héléé tricostale. *Helea tricostalis*.

H. nigra; limbo marginali horizontali angusto; dorso costis tribus granulatis.

Helea perforata. Latr. catal.

Habite la Nouvelle-Hollande. Elle est beaucoup plus petite que les précédentes.

6. Héléé à six côtes. *Helea sexcostata*.

H. nigra; limbo marginali perangusto; dorso costis sex simplicibus punctisque impressis.

Helea costata. Latr. catal.

Habite la Nouvelle-Hollande.

7. Héléé à bordure. *Helea limbata*. Lat. Cat.

H. obscurè fulva, suborbicularis; limbo hyalino.

Habite l'Asie australe. Elle est plus petite que les autres et a presque l'aspect d'une casside.

Etc.

LES MÉLASOMES,

(ou *Ténébrionites*.)

Mâchoires ayant une dent cornée au côté interne.

Cette quatrième famille de coléoptères hétéromères nous paraît très-naturelle, et devoir suivre immédiatement celle des taxicornes. Elle comprend des insectes d'une couleur noire ou fort obscure, et la plupart dépourvus de la faculté de voler, parce qu'ils ont pris, depuis

long-temps, l'habitude de se tenir cachés et de fuir la lumière. Dans le plus grand nombre, effectivement, les élytres sont soudées, ne peuvent plus s'ouvrir, et les ailes qu'elles devraient recouvrir sont avortées.

Ces insectes ont, en général, des mouvements lents, rongent des substances végétales ou des matières animales, et vivent à terre ou dans le sable. On les a distingués en un assez grand nombre de genres, que l'on peut distribuer et diviser de la manière suivante :

(1) Elytres soudées : point d'ailes en-dessous par avortement.

(a) Palpes maxillaires filiformes, à dernier article presque cylindrique.

* Base des mâchoires recouverte par un menton large.

Erodië.

Pimélie.

** Base des mâchoires découverte et point caché par le menton.

Scaurë.

Tagénie.

Sépidie.

Moluris.

Eurichore.

Akis.

(b) Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, triangulaire ou en forme de hache.

* Base des mâchoires recouverte par un menton large et grand.

Chiroscèle.

Aside.

** Base des mâchoires découvertes.

Blaps.

Pédine.

ytres non soudées ; recouvrant des ailes.

Opatre.

Cryptique.

Ténébrion.

Sarrotrie.

Toxique.

ERODIE. (Erodus.)

ennes à peine plus longues que le corselet , filiformes , terminées par un bouton formé des deux der-articles , ou du dernier seulement. Palpes filiformes. Menton grand.

ps ovale , très-convexe. Corselet transverse , échancré antérieurement. Point d'écusson. Elytres connées.

Annæ thorace vix longiores , filiformes , apice biforcæ ; capitulo ex duobus ultimis articulis , ultimo distincto. Palpi filiformes. Mentum mag-

pus breviter ovatum , valdè convexum. Thorax versus : margine antico emarginato. Scutellum 1. Elytra connata.

OBSERVATIONS.

Érodies sont des coléoptères noirâtres , glabres , dépourvus d'ailes , et voisins des pimélies. Leur corps est presque arrondi , convexe ou gibbeux. Leur corselet antérieurement une large échancrure qui reçoit la postérieure de leur tête. Ceux dont le bouton des ailes est formé des deux derniers articles , et dont les antennes de la première paire de pattes sont dentées extérieurement , sont les *Érodies* de M. Latreille. Il distingue ,

sous le nom de *zophosis*, ceux dont les jambes antérieures sont non dentées, et dont le bouton des antennes est formé du onzième article.

ESPECES.

1. Erodie bossue. *Erodus gibbus*.

E. gibbus, ater; *elytris lineis elevatis tribus*.

Erodus gibbus. Fab. *El.* 1. p. 121. Latr. *gen.* 2. p. 145.

Oliv. *col.* 3. n.º 63. pl. 1. f. 3.

Habite le Levant, l'Arabie.

2. Erodie testudinaire. *Erodus testudinarius*.

E. gibbus, ater; *elytris connatis scabris: lateribus pulverulento-albidis*.

Erodus testudinarius. Fab. *El.* 1. p. 121.

Oliv. *col.* 3. n.º 63. pl. 1. f. 1. a. b.

Zophosis testudinaria. Lat. *gen.* 2. p. 146.

Habite en Arabie.

Etc.

PIMÉLIE. (Pimelia.)

Antennes filiformes, submoniliformes, le dixième article enveloppant le dernier. Palpes filiformes. Mandibules bifides. Menton grand, transverse.

Corps ovale, convexe. Corselet transverse, plus étroit que l'abdomen. Ecusson souvent nul. Abdomen renflé. Elytres connées, réfléchies en dessous.

Antennæ filiformes, submoniliformes; articulo decimo ultimo involvente. Palpi filiformes. Mandibulæ bifidæ. Mentum magnum, transversum.

Corpus ovatum, convexum. Thorax transversus, abdomine angustior. Scutellum subnullum. Abdomen turgidum. Elytra connata, subtus inflexa.

OBSERVATIONS.

Les *pimélies* ont le corps glabre, ovale, rétréci antérieurement, et l'abdomen gros, très-renflé. En général, ces insectes sont noirs, vivent dans les climats chauds, et se trouvent dans les terrains arides. Une seule espèce se trouve aux environs de Paris.

ESPECES.

1. Pimélie muriquée. *Pimelia muricata*.

P. atra; thorace globoso: punctis duobus impressis; elytris rugosis; striis tribus, elevatis, laevibus. F.

Pimelia bipunctata. Fab. élent. 1. p. 130. Lat. gen. 2. p. 147.

Pimelia muricata. Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 1. f. 1. a. b. f. 4.

Pimelia muricata. Lin. et Oliv.

Ténébrion cannelé. Geoff. 1. p. 352.

Habite l'Europe australe, et même près de Paris.

2. Pimélie africaine. *Pimelia grossa*.

P. atra; elytris scabris: lineis elevatis tribus laevibus.

Pimelia grossa. Fab. él. 1. p. 130.

Oliv. col. 3. n.º 59. tab. 1. f. 5.

Habite les sables de Barbarie.

3. Pimélie hispide. *Pimelia hispida*.

P. nigra; corpore muricato hispido.

Pimelia hispida. Fab. él. 1. p. 129.

Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 1. f. 10 et 12.

Habite en Orient et en Afrique.

Etc.

S C A U R E. (Scaurus.)

Antennes filiformes, presque moniliformes; à dernier article en cône allongé.

Corps ovale-oblong. Corsetlet orbiculaire, presque

Tome IV.

carré. Abdomen ovale. Elytres soudées. Pattes antérieures plus grosses.

Antennæ filiformes, submoniliformes : articulo terminali elongato-conico.

Corpus ovato-elongatum. Thorax orbiculato-quadratus. Abdomen ovatum. Elytra connata. Pedes antici femoribus crassioribus.

OBSERVATIONS.

Les *scaures* ont les trois ou quatre avant-derniers articles des antennes presque globuleux, et le corselet séparé de l'abdomen par un étranglement. Ces insectes sont noirs, aptères, et c'est surtout dans les mâles que les cuisses des pattes antérieures sont plus grosses, dentées au sommet.

ESPÈCES.

1. Scaure strié. *Scaurus striatus*.

S. ater; elytris lineis elevatis tribus; femoribus anticis dentibus duobus.

Scaurus striatus. Fab. él. 1. p. 122. Lat. gen. 2. p. 159.

Oliv. col. 3. n.º 62. pl. 1. f. 2, et Pimélie, pl. 2. f. 15.

Lat. hist. nat., etc. vol. 10. pl. 88. f. 2.

Habite l'Europe australe, le midi de la France, l'Afrique.

2. Scaure noir. *Scaurus atratus*.

S. ater; elytris striato-punctatis.

Scaurus atratus. Fab. él. 1. p. 122.

Oliv. col. 3. n.º 62. pl. 1. f. 3. b.

Habite en Egypte.

Etc.

TAGÉNIE. (*Tagenia*.)

Antennes submoniliformes, presque perfoliées. Palpes filiformes à dernier article tronqué.

allongé, étroit, déprimé.

*innæ submoniliformes : articulis ferè perfolia-
ri filiformes ; articulo ultimo truncato.
is elongatum , angustum , depressum.*

OBSERVATIONS.

énie, dans cette famille, est remarquable par la
ongée et étroite de son corps. Son corselet est en
g.

ESPECE.

nie filiforme. Tagenia filiformis. Latr.

genia. Lat. gen. vol. 1. pl. 10. f. 9.

isd. gen. 2. p. 149.

is filiformis. Fab. eleut. 1. p. 137.

site la France australe, la Barbarie.

SÉPIDIE. (Sepidium.)

mes filiformes, à troisième article plus long que
is. Palpes subfiliformes.

s ovale-oblong, convexe, inégal. Corselet di-
les côtés, cariné ou très-inégal. Elytres soudées,
sant l'abdomen.

*nnæ filiformes : articulo tertio aliis longiore.
ubfiliformes.*

*us ovato-oblongum , convexum , inæquale.
: valde inæqualis , sæpè carinatus , lateribus
s. Elytra connata , subitè inflexa.*

OBSERVATIONS.

épidias ressemblent un peu aux pimélies par leur
ais, outre les angles, les crêtes et les autres aspéri-

mo majore , securiformi. Mentum magnum , cordiforme.

Corpus elongatum , parallelipedum , depressum , marginatum. Thorax ab abdomine postice intervallo disjunctus : margine antico truncato. Tibiæ antica apice dilatata , digitata , subpalmata.

OBSERVATIONS.

Le *chiroscèle* forme un genre très-remarquable parmi les ténébrionites. Le corps de l'insecte a presque l'aspect de celui d'une passale. Il offre une tête saillante ; un corselet presque en cœur , bordé ; des élytres aplaties , striées , soudées et un écusson.

ESPECE.

1. *Chiroscèle à deux lacunes. Chiroscelis bifenestra.*

Annales du Muséum , vol. 3. p. 260. pl. 22. f. 2.

Latr. gen. 2. p. 144. Ejusd. hist. nat. , etc. vol. 10. p. 262. pl. 87. f. 1.

Habite la Nouvelle - Hollande , l'île Maria. Péron et Lesueur.

ASIDE. (Asida.)

Antennes subfiliformes , plus grosses près du bout : le dixième article , plus grand et semi-globuleux , recevant le onzième. Labre saillant. Palpes maxillaires à dernier article plus grand , obtrigone. Menton grand.

Corps ovale , un peu aplati. Corselet subtransverse , un peu échancré antérieurement. Elytres connées , réfléchies en dessous.

Antennæ subfiliformes , propè apicem crassiores : articulo decimo majore semigloboso undecimum exci-

mâchoires. Je n'en sépare point les tentyries de *M. Latreille*.

ESPECES.

1. *Moluris striée. Moluris striata. Latr.*

M. atra, glabra; elytris striis quatuor sanguinalis.

Pimelia striata. Fab. éleut. 1. p. 128.

Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 1. f. 11.

Moluris. Latr. gen. 2. p. 148. et hist. nat., etc. vol. 10. p. 266.

pl. 87. f. 4.

Habite en Afrique.

2. *Moluris brune. Moluris brunnea.*

M. rufo-testacea, glabra, punctulata; thorace, antice subtruncato.

Pimelia brune. Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 1. f. 6.

Moluris brunnea. Latr. catal.

Habite le Cap de Bonne-Espérance.

3. *Moluris interrompue. Moluris interrupta.*

M. elongata, atra, nitida; thorace ab elytrorum basi postice utrinque remoto.

Pimelia glabra. Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 2. f. 13.

Tentyria interrupta. Lat. gen. 2. p. 155.

Habite la France australe, etc.

EURICHORE. (Eurichora.)

Antennes filiformes, à troisième article fort long, les autres courts. Palpes filiformes. Menton court, très-large.

Corps en ovale court. Corselet grand, transverse, échancré en devant.

Antennæ filiformes, articulo tertio valde elongato; aliis brevibus. Palpi filiformes. Mentum breve, lustrissimum.

Corpus breviter ovatum. Thorax magnus, transversus; margine antico emarginato.

OBSERVATIONS.

La forme raccourcie des *eurichores*, et surtout leur corselet large, transverse, et très-échancré en devant pour recevoir la tête, les distinguent des *moluris*. On n'en connaît que l'espèce suivante.

ESPECE.

1. *Eurichore ciliée. Eurichora ciliata.*

Thunb. nov. ins. sp. 6. p. 116.

Fab. éleut. 1. p. 133. Latr. gen. 2. p. 150.

Pimelia ciliata. Oliv. col. 3. n.º 59. pl. 2. f. 19. a. b.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

A K I S. (Akis.)

Antennes filiformes, de onze articles : le troisième plus long que les autres. Palpes filiformes.

Corps allongé-ovale, un peu aplati. Corselet aussi long que large ou plus long, souvent aplati. Elytres connées.

Antennæ filiformes, undecim-articulatæ; articulo tertio aliis longiore. Palpi filiformes.

Corpus elongato-ovatum, subdepressum. Thorax longitudine latitudinem adæquans vel superans, sæpè planulatus. Elytra connata.

OBSERVATIONS.

Les insectes que je réunis ici, sous le nom d'*akis*, tiennent de très-près aux précédens par leurs antennes, leurs palpes, etc.; mais leur forme en général plus allon-

gée, plus déprimée, et leur corselet aussi long que large ou plus long, m'ont paru permettre cette réunion qui diminue avantageusement le nombre des genres. Ainsi, aux akis de M. Latreille, je réunis ses hégètes, quoique ces insectes puissent être facilement distingués.

ESPÈCES.

1. Akis hégète. *Akis hegeter*.

A. ater, obscurus; thorace quadrato plano; elytris subulcatis.

Hegeter striatus. Latr. gen. vol. 1. tab. 9. f. 11.

Habite l'île de Ténérife.

2. Akis réfléchi. *Akis reflexus*.

A. ater, nitidus; elytris dorso lævi, ad margines laterales supra et infra longistrorsum tuberculatis. Lat.

Akis reflexa. Latr. gen. 2. p. 152, et hist. nat., etc. vol. 10. pl. 87. § 6.

Akis reflexa. Fab. cl. 1. p. 135.

Habite la France australe, le Levant.

Etc.

CHIROSCÈLE. (Chirosceles.)

Antennes moniliformes, de onze articles; le dernier plus gros et en bouton. Lèvre supérieure saillante, arrondie, entière. Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, sécuriforme. Menton très-grand, cordiforme.

Corps allongé, aplati, bordé. Corselet séparé de l'abdomen par un étranglement. Jambes antérieures élargies, dentées et presque palmées au sommet.

Antennae moniliformes, undecim-articulatae, articulo ultimo majore, capituliformi. Labrum exsertum, rotundatum, integrum. Palpi maxillares articulo pli-

tennes ne sont point comprimés. Ces insectes vivent dans les lieux sablonneux, arides.

ES P È C E.

1. Pédi-ne fémorale. *Pedinus femoralis*.

P. ater; *femoribus posticis subtile canaliculatis; femoribus neo-villosis*.

Blaps femoralis. Fab. *El.* 1. p. 143.

Fanz. fasc. 39. t. 5.

Pedinus femoralis. Lat. gen. 2. p. 165. *Ejused. hist. nat.*, t. vol. 10. p. 282. pl. 88. f. 4.

Habite en France, en Allemagne, aux lieux arides.

Etc. Voyez les *platynotus reticulatus*, *excavatus*, *crassus*, *dilatatus*, *dentipes* de Fab.; ces *blaps buprestoides*, *calcarata*, *punctata*, *emarginata*, *tristis*, *tibialis* et *destrata*, qui, selon M. Latreille, sont des pédi-nes.

OPATRE. (*Opatrum*.)

Antennes moniliformes, grossissant un peu vers le sommet. Labre petit, reçu dans une échancrure antérieure du chaperon. Palpes maxillaires en massue.

Corps en carré-ovale, déprimé. Corselet transvers presque carré, ayant un sinus antérieur pour recevoir la tête.

Antennæ moniliformes, sensim extrorsum subcreiores. Labrum parvum, in sinu antico clypei receptum. Palpi maxillares clavati.

Corpus quadrato-ovale, depressum. Thorax transversus, subquadratus; margine antico concavo, p. capite excipiendo.

OBSERVATIONS.

Les opatres ne sont point privés de la faculté de voler comme les ténébrionites précédens. Ils ont de gra-

ports avec les ténébrions ; mais leur tête est moins pro-
minente, fort enfoncée dans le sinus antérieur du corselet,
et leurs élytres sont moins luisantes, striées dans la plupart.
Leur corselet est aplati, bordé. Ces insectes sont d'une cou-
leur obscure, grisâtre, brune ou noirâtre. Ils vivent par
foiblesse, dans les lieux sablonneux.

ESPECES.

1. Opatre sabuleux. *Opatrum sabulosum*.

O. fuscum ; *elytris lineis elevatis tribus dentatis* ; *thorace marginato*. F.

Silpha sabulosa. Lin. Ténébrion. Geoff. 1. p. 356. n.º 7.

Opatrum sabulosum. Fab. él. 1. p. 116.

Oliv. col. 3. n.º 56. pl. 1. f. 4. Lat. gen. 2. p. 166.

Panz. fasc. 3. t. 2.

Habite l'Europe, aux lieux sablonneux. Très-commun.

2. Opatre bossu. *Opatrum gibbum*.

O. nigrum ; *elytris lineis elevatis plurimis obsoletis* ; *tiblis anticis triangularibus*. F.

Opatrum gibbum. Oliv. col. 3. n.º 56. pl. 1. f. 6.

Fab. él. 1. p. 116. Panz. fasc. 39. f. 4.

Habite en Europe.

3. Opatre arénaire. *Opatrum arenarium*.

O. griseum ; *elytris striatis*. F.

Opatrum arenarium. Fab. él. 1. p. 117.

Oliv. col. 3. n.º 56. t. 1. f. 7.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

Etc.

CRYPTIQUE. (Crypticus.)

Antennes filiformes, à articles la plupart en cône renversé : le dernier subglobuleux. Chaperon entier. Labre transverse. Les palpes maxillaires terminés en hache.

Corps ovale-oblong.

Antennæ filiformes ; articulis plerisque obversis cenicis : ultimo subgloboso. Clypeus integer. Labrum transversum. Palpi maxillares apice securiformi.

Corpus ovato-oblongum.

OBSERVATIONS.

M. Latreille a établi nouvellement ce genre avec la pédine lisse de ses ouvrages. Il en connaît maintenant plusieurs espèces, les unes d'Espagne, les autres du Cap de Bonne-Espérance.

ESPECE.

1. Cryptique glabre. *Crypticus glaber.*

Blaps glabra. Fab. éleut. 1. p. 143. Panz. fasc. 50. t. 1.

Helops glaber. Oliv. col. 3. n.º 58. pls 2. f. 12.

Pedius glaber. Latr. gen. 2. p. 164.

Ténébrion, n.º 8. Geoff. 1. p. 351.

Var. Panz. fasc. 36. t. 1.

Habite en France, aux lieux sablonneux.

TÉNÉBRION. (Tenebrio.)

Antennes moniliformes, grossissant insensiblement vers leur sommet. Labre saillant, transverse, entier. Palpes maxillaires un peu en massue.

Corps allongé ou ovale-oblong, déprimé. Tête saillante en avant. Corsélet bordé. Jambes grêles : les antérieures arquées.

Antennæ moniliformes, extrorsum sensum crassiores. Labrum exsertum, transversum, integrum. Palpi maxillares subclavati.

Corpus elongatum seu ovato-oblongum, depressum. Caput anticè prominulum. Thorax marginatus. Tibiæ fragiles : anticis subarcuatis.

OBSERVATIONS.

Du nom de ce genre, dont plusieurs espèces fréquentent nos habitations, on a fait celui de toute la famille. Les *ténébrions* sont, en effet, connus depuis long-temps, et l'on sait qu'ils sont, en général, d'une couleur noire ou noirâtre, qu'ils fuient la lumière, et ne volent que le soir. On reconnaît ces insectes à leur forme allongée, leur tête non enfoncée dans le corselet, leurs élytres non soudées. Leurs larves vivent, soit dans la farine, le son, soit dans le bois pourri, soit dans la terre, etc. On en connaît un assez grand nombre d'espèces.

ESPÈCES.

1. Ténébrion serré. *Tenebrio serratus.*

T. ater, glaber; elytris striatis; tibiis posticis serratis.

Tenebrio serratus. Fab. élém. 1. p. 145.

Oliv. col. n.º 57. pl. 1. f. 1.

Habite en Afrique.

2. Ténébrion obscur. *Tenebrio obscurus.*

T. oblongus, niger, obscurus; thorace quadrato; elytris substriatis.

Tenebrio obscurus. Fab. él. 1. p. 146.

Panz. fasc. 43. t. 12. Latr. gen. 2. p. 169.

Habite en Europe. Commun près de Paris.

3. Ténébrion de la farine. *Tenebrio molitor.*

T. oblongus, piceus; elytris striatis.

Tenebrio molitor. Lit. Fab. él. 1. p. 145.

Latr. gen. 2. p. 170. Panz. fasc. 43. t. 13.

Tenebrio, n.º 6. Geoff. 1. p. 349.

Oliv. col. 3. n.º 57. pl. 1. f. 12. a. b. c. d.

Habite en Europe , dans les maisons; dans la farine, le pain, les cuisines.

Etc.

SARROTRIE. (Sarrotrium.)

Antennes droites , épaisses , formant une massue fusiforme , perfoliée , velue. Mandibules bidentées au sommet.

Corps allongé , un peu étroit , presque linéaire.

Antennæ rectæ , crassæ , clavam , fusiformem perfoliatam et hirsutam sistentes. Mandibulæ apice bidentatæ.

Corpus elongatum , angustiusculum , sublineare.

OBSERVATIONS.

Le nom d'orthocère que M. Latreille a donné à l'insecte qui constitue ce genre , n'est point convenable , puisque ce nom est déjà employé pour un genre de coquilles multiloculaires ; celui de *sarrotrium* , donné par Illiger et Fabricius , doit donc être conservé. Cet insecte , remarquable par ses antennes , est un véritable ténébrionite.

ESPÈCE.

1. Sarrotrie hirticorne. *Sarrotrium hirticorne*.

Orthocerus hirticornis. Lat. gen. 2. p. 172.

EjUSD. hist. nat. , etc. vol. 10. p. 299. pl. 89. f. 1.

Sarrotrium muticum. Fab. éleut. 1. p. 327.

Hispa mutica. Panz. fasc. 1. t. 8. Lin. syst.

Habite en Europe , aux lieux sablonneux.

TOXIQUE. (Toxicum.)

Antennes courtes , de onze articles : les quatre derniers formant une massue ovale , comprimée.

Corps allongé, presque linéaire, un peu déprimé.

Antennæ breves, undecim-articulatæ; articulis quatuor ultimis clavam ovatam et compressam formantibus.

Corpus elongatum, sublineare, depressiusculum.

OBSERVATIONS.

Le *toxique* est un genre encore peu connu, qui semble se rapprocher de la sarrotrie par son port, et qui tient d'assez près aux ténébrions. Son corselet est presque carré; l'insecte est muni d'ailes.

ESPECE.

1. *Toxique* de Riche. *Toxicum richesianum*. Latr.

Latr. gen. 2. p. 167, et vol. 1. t. 9. f. 9.

Habite les Indes orientales. Riche. Couleur noire.

LES TRACHÉLITES.

Tête triangulaire ou en cœur, séparée du corselet par un rétrécissement brusque, en forme de cou. — Point de dent cornée au côté interne des mâchoires.

C'est ici la cinquième et dernière coupe des coléoptères hétéromères : elle comprend quelques genres qui semblent avoisiner les mélasomes ou ténébrionites par leurs rapports, et d'autres qui tiennent davantage aux *cantharidiens*. Ceux-ci terminent les trachélites, et forment une transition aux coléoptères pentamères, que les *téléphoriens* commencent. Nous croyons cette distribution fort rapprochée de l'ordre naturel.

La plupart de ces insectes ont des élytres minces, molles ou flexibles, et sont presque toujours munis d'ailes. Beaucoup d'entre eux ont la tête fort inclinée, quoique saillante; leurs antennes en général sont filiformes, rarement épaissies vers le bout, et plus rarement en massue. Dans l'état parfait, ils vivent sur différens végétaux et mangent leurs feuilles ou se nourrissent sur les fleurs. Nous les divisons de la manière suivante :

DIVISION DES TRACHÉLITES.

(1) Crochets des tarses simples, avec ou sans dentelures (*des Polytypiens*).

(a) Tous les tarses à pénultième article bilobé.

(+) Antennes simples.

Notoxe.

Scraptie.

(++) Antennes en scie, ou pectinées, ou branchues.

Pyrochre.

Dendrocère.

(b) Tous les tarses à articles entiers ou au moins ceux des pattes postérieures.

(+) Corps courbé; abdomen conique.

(*) Aucun tarse à pénultième article bilobé.

Rhipiphore.

Mordelle.

(**) Les quatre tarses antérieurs à pénultième article bilobé.

Anaspe.

(+++) Corps droit, non déprimé sur les côtés.

Apale.

Horie.

(2) Crochets des tarses doubles ou profondément divisés et sans dentelures en dessous (*les Cantharidiens*).

(a) Pénultième article des tarses bilobé.

Tétraonyx.

(b) Tous les articles des tarses entiers.

Mylabre.

Cérocome.

OEnas.

Méloë.

Cantharide.

Zonite.

LES POLYTYPIENS.

Crochets des tarses simples, avec ou sans dentelures.

Cette première division des trachélites semble embrasser diverses petites familles, telles que les pyrochroïdes, les mordellones, etc.; ce que j'ai voulu exprimer en les nommant *polytypiens*. Ces insectes ont le corps allongé, des élytres plus ou moins flexibles, les yeux souvent échancrés, et des couleurs quelquefois sombres, quelquefois éclatantes. Ils avoisinent évidemment les cantharidiens; mais plusieurs d'entre eux paraissent tenir un peu des mélasomes ou ténébrionites.

NOTOXE. (Notoxus.)

Antennes filiformes, submoniliformes, à - peu - près de la longueur du corselet. Mandibules fortes.

Tête séparée du corselet par un cou. Corselet rétréci postérieurement. Corps oblong; abdomen grand.

Antennæ filiformes, submoniliformes, thoracis longitudine aut circiter. Mandibulæ validæ.

Caput a thorace collo disjunctum. Thorax posticè angustior. Corpus oblongum. Abdomen magnum.

OBSERVATIONS.

Les *notoxes* sont de petits coléoptères, dont une espèce singulière, par la corne de son corselet, a été désignée, comme genre, par Geoffroy, sous le nom de cuculle (*notoxus*). Ils sont agiles, paraissent tenir un peu aux ténébrionites et aux cantharidiens.

ESPÈCES.

1. Notoxe unicorne. *Notoxus monoceros*.

N. ferrugineus; elytris puncto fasciâque nigris; thorace cornu protenso.

Melos monoceros. Lin.

Notoxus. Geoff. 1. p. 356. pl. 6. f. 8.

Oliv. col. 3. n.° 51. pl. 1. f. 2.

Anthicus monoceros. Fab. éleut. 1. p. 288.

Habite en Europe, sur les plantes, et par terre.

2. Notoxe anthérin. *Notoxus antherinus*.

N. niger; elytris fasciis duabus ferrugineis.

Melos antherinus. Lin.

Anthicus antherinus. Fab. él. 1. p. 291.

Panz. fasc. 11. t. 14.

Habite en Europe.

Etc. Ajoutez les *anthicus cornutus*, *a. rhinoceros* de Fabricius.

SCRAPTIE. (Scraptia.)

Antennes filiformes, insérées dans l'échancrure des

yeux. Lèvre supérieure saillante. Palpes à dernier article plus grand.

Tête penchée, séparée du corselet qui est demi-circulaire. Corps ovale-oblong, un peu mou.

Antennæ filiformes, in oculorum sinu insertæ; articulis cylindricis. Labrum exsertum. Palpi articulo ultimo majore.

Caput nutans. Thorax semi-circularis. Corpus ovato-oblongum, molliusculum.

OBSERVATIONS.

La *scraptie* se rapproche des notoxes par ses rapports; elle a aussi le pénultième article des tarses bilobé. C'est un insecte fort petit.

ESPECE

1. *Scraptie* brune. *Scraptia fusca*.

Lat. gen. crust. et ins. 2. p. 199.

Serropalpus fuscus. Illig. coléopt. Bor. 1. p. 52.

Habite en France, dans les prés.

PYROCHRE. (Pyrochroa.)

Antennes filiformes, en scie ou pectinées. Lèvre supérieure saillante, entière. Mandibules fortes. Palpes inégaux.

Corps ovale-oblong, déprimé. Corselet suborbiculé.

Antennæ filiformes, serratæ aut pectinatæ. Labrum exsertum, integrum. Mandibulæ validæ. Palpi inæquales, subfiliformes.

Corpus ovato-oblongum, depressum. Thorax suborbiculatus.

OBSERVATIONS.

Les *pyrochres* sont remarquables par leurs antennes pectinées dans les mâles, en scie dans les femelles, et par leur couleur rouge, ou noire avec des parties rouges. Geoffroy a, le premier, distingué ce genre, et n'en a connu qu'une espèce qu'il a nommée la *cardinale*.

ESPÈCES.

1. *Pyrochre* cardinale. *Pyrochroa rubens*.

P. nigra ; capite thorace elytrisque sanguineis , immaculatis.

Pyrochroa. Geoff. 1. p. 338. pl. 6. f. 4.

Pyrochroa rubens. Fab. fl. 2. p. 109.

Oliv. col. 3. n.° 53. pl. 1. f. 2. a. b. Lat. gen. 2. p. 205.

Habite en Europe.

2. *Pyrochre* écarlate. *Pyrochroa coccinea*.

P. nigra ; thorace elytrisque coccineis immaculatis.

Pyrochroa coccinea. Panz. fasc. 13. t. 11.

Oliv. col. 3. n.° 53. pl. 1. f. 1. a. b.

Cantharis coccinea. Lin.

Habite en Europe. Celle-ci a la tête noire.

Etc.

DENDROCÈRE. (Dendrocera.)

Antennes subrameuses : les articles se prolongeant latéralement en de longs filets.

Corps linéaire ; corselet conique ; pattes longues.

Antennæ subramosæ ; articulis in fila longa lateraliter productis.

Corpus lineare ; thorax conicus ; pedes longi.

OBSERVATIONS.

M. Latreille a indiqué ce genre sous le nom de *dendroïde*, que je crois convenable de changer, et n'a encore donné d'autres détails à son sujet, que ceux que je viens d'exposer. Ce genre paraît très-remarquable.

ESPÈCE.

12. Dendrocère du Canada. *Dendrocera Canadensis*.

Dendroïde. Lat. Considérations générales, etc. p. 212.

Habite au Canada. Collect. de M. Bosc.

RHIPIPHORE. (Rhipiphorus.)

Antennes courtes, en éventail ou en peigne dans les mâles, en scie dans les femelles. Mandibules pointues, sans dents au sommet. Palpes filiformes.

Corps oblong, courbé, presque arqué, comprimé sur les côtés. Tête penchée. Abdomen conique, pointu.

Antennæ breves, masculorum flabellatæ aut pectinatæ, feminarum serratæ. Mandibulæ acutæ, edentulæ. Palpi filiformes.

Corpus oblongum, curvum, subarcuatum, ad latera compressum. Caput cernuum. Abdomen conico-acutum.

OBSERVATIONS.

Les *rhipiphores* ont encore certains rapports avec les ténébrionites et n'offrent que des couleurs sombres ou obscures. Leurs tarses sont à articles entiers, et les crochets qui les terminent, quoique simples, sont bifides ou uni-

dentés. Leurs yeux sont entiers. Leur écusson est rarement apparent ; mais l'angle postérieur de leur corselet en tient lieu ou le cache. Les uns ont des élytres courtes, les autres les ont assez longues, mais terminées en pointe. Ces insectes sont agiles et se trouvent sur les fleurs.

ESPECES.

1. Rhipiphore subdiptère. *Rhipiphorus subdipterus*.

R. elytris brevissimis, ovatis, fornicatis, pallescentibus. F.

Rhipiphorus subdipterus. Fab. éleut. 2. p. 118.

Oliv. col. 3. n.º 65. pl. 1. f. 1. b. c. d. e.

Habite en Provence, et aux environs de Montpellier.

2. Rhipiphore flabellé. *Rhipiphorus flabellatus*.

R. testaceus ; ore, pectore abdominisque dorso atris. F.

Rhipiphorus flabellatus. Fab. él. 2. p. 119.

Oliv. col. 3. n.º 65. pl. 1. f. 2. b. c.

Habite en Italie.

3. Rhipiphore paradoxo. *Rhipiphorus paradoxus*.

R. niger ; thoracis lateribus elytrisque testaceis.

Rhipiphorus paradoxus. Fab. él. 2. p. 119.

Oliv. col. 3. n.º 65. pl. 1. f. 7. Lat. gen. 2. p. 207.

Mordella paradoxa. Lin.

Habite en Europe.

Etc.

MORDELLE. (Mordella.)

Antennes filiformes, un peu en scie d'un côté dans les mâles. Quatre palpes inégaux, les maxillaires plus grands et en massue sécuriforme.

Corps oblong, courbé et comprimé à ses côtés. Tête très-inclinée sur la poitrine. Abdomen des femelles terminé en pointe térébriforme.

Antennæ masculorum serratæ , feminarum simplices , filiformes. Palpi maxillares articulo ultimo majore securiformi.

Corpus oblongum , subarcuatum , ad latera compressiusculum. Caput valdè nutans. Feminarum abdomen caudâ terebriformi terminatum.

OBSERVATIONS.

Les *mordelles* se rapprochent extrêmement des *rhizophores* par leurs rapports, quoiqu'elles en soient très-distinguées par leurs antennes et par leurs palpes.

Ces insectes sont fort petits, ont la tête très-inclinée vers la poitrine, le corps oblong, arqué, terminé en pointe dans les femelles. Les uns se trouvent sur les fleurs, les autres dans les bois, sur les arbres. Leur démarche est assez agile; ils volent très-bien.

ESPÈCES.

1. Mordelle à pointe. *Mordella aculeata*.

M. ano aculeato , corpore atro immaculato.

Mordella aculeata. Lin. Fab. él. 2. p. 121.

Geoff. 1. p. 353. pl. 6. f. 7.

Oliv. col. 3. n.º 64. pl. 1. f. 1. Lat gen. 2. p. 208.

Habite en Europe.

2. Mordelle fasciée. *Mordella fasciata*.

M. nigra ; ano aculeato ; elytris fasciis duabus cinereis.

Oliv. col. 3. n.º 64. pl. 1. f. 2. a. b.

Mordella fasciata; Fab. él. 2. p. 122.

Habite en Europe.

Etc.

ANASPE. (Anaspis.)

Antennes filiformes, grossissant un peu vers le bout. Les yeux un peu en croissant. Le dernier article des palpes maxillaires en hache.

Corps ovale-oblong. Ecusson peu distinct. Tête penchée.

Antennæ filiformes, extrorsum subcrassiores. Oculi sublunati. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi.

Corpus ovato-oblongum. Scutellum subnullum. Caput nutans.

OBSERVATIONS.

Les *anaspes* seraient des mordelles, si les tarses des quatre pattes antérieures n'avaient le pénultième article bilobé. Ces insectes sont très-petits.

ESPÈCES.

1. Anaspe frontale. *Anaspis frontalis*. Latr.

A. atra, fronte pedibusque flavescens.

Mordella frontalis. Fab. él. 2. p. 125. Panz. fasc. 13. t. 13.]

Oliv. col. 3. n.º 64. pl. 1. f. 6. a. b. c.

Habite en Europe, sur les fleurs.

2. Anaspe humérale. *Anaspis humeralis*. Lat.

A. atra; elytris basi flavescens.

Anaspis. Geoff. 1. p. 316. n.º 2.

Mordella humeralis. Fab. él. 2. p. 125.

Oliv. col. 3. n.º 64. pl. 1. f. 7. a. b.

Habite en Europe, et se trouve aux environs de Paris.

Etc.

A P A L E. (Apalus.)

Antennes filiformes , simples dans les deux sexes , plus longues que le corselet. Palpes filiformes. Les yeux oblongs.

Corps ovale-oblong ; tête saillante , penchée ; corselet arrondi ; élytres un peu molles. Tous les tarses à articles entiers.

Antennæ filiformes , in utroque sexu simplices , thorace longiores. Palpi filiformes. Oculi oblongi.

Corpus ovato-oblongum ; caput exsertum , inflexum. Tarsi omnes articulis integris. Elytra molliuscula.

OBSERVATIONS.

Le genre *apale* , établi par Fabricius , paraît se rapprocher plus que les précédens , des cantharidiens ; mais comme il semble aussi tenir un peu aux pyrochres , on présume que l'insecte a les crochets des tarses simples. Fabricius dit qu'il a les mâchoires cornées , unidentées , et la languette membraneuse , tronquée , entière.

E S P È C E.

1. Apale bimaculé. *Apalus bimaculatus.*

A. niger ; elytris testaceis : puncto nigro. F.

Meloe bimaculatus. Lin.

Apalus bimaculatus. Fab. él. 2. p. 24.

Degeer , ins. 5. tab. 1. f. 18.

Oliv. col. 3. n.º 52. f. 1. a ; et f. 2, a. b.

Habite le nord de l'Europe.

H O R I E. (Horia.)

Antennes filiformes , un peu plus longues que le cor-

selet. Mandibules fortes, avancées, pointues, unidentées. Palpes filiformes, à dernier article ovale.

Corps oblong; corselet presque carré. Elytres grandes, flexibles; crochets des tarses dentelés en dessous, avec un appendice sétiforme.

Antennæ filiformes, thorace sublongiores. Mandibulæ validæ, porrectæ, acutæ, unidentatæ. Palpi filiformes: articulo ultimo ovato.

Corpus oblongum; thorax subquadratus; elytra magna, molliuscula. Tarsorum ungues subtus denticulati, cum appendice setiformi.

OBSERVATIONS.

Les *hories* ont, en général, le port et l'aspect des mylabres; mais les crochets qui terminent leurs tarses ne sont point doubles; ils sont seulement dentelés en dessous, avec un appendice en forme de soie. Ce sont des insectes exotiques, qui paraissent vivre dans le bois. Leurs tarses sont à articles entiers.

ESPECE.

1. Horie tachetée. *Horia maculata*.

H. flavescens, elytris maculis septem nigris.

Horia maculata. Fab. él. 2. p. 85.

Oliv. col. 3. n.º 53 bis. pl. 1. f. 1. a. b.

Lat. gen. 2. p. 211.

Habite à Cayenne, Saint-Domingue, etc.

Etc.

LES CANTHARIDIENS.

Crochets des tarses doubles ou profondément divisés et sans dentelures en dessous. Elytres molles.

Les *cantharidiens* ont, en général, des couleurs vives

et variées, ne fuient point la lumière, et, parmi eux, il s'en trouve peu qui soient aptères. Ces insectes ont des antennes filiformes ou moniliformes, des élytres molles, et les crochets des tarses toujours doubles ou bifides. Ils vivent sur les herbes et sur les arbres, et paraissent avoisiner les téléphoriens par leurs rapports.

TÉTRAONYX. (Tetraonyx.)

Antennes subfiliformes, s'épaississant un peu vers leur sommet; à articles oblongs, presque coniques.

Corps oblong. Corselet court, en carré transverse. Pénultième article des tarses bilobé.

Antennæ subfiliformes, extrorsum sensim subcrassiores; articulis oblongo-conicis.

Corpus oblongum. Thorax brevis, transverso-quadratus. Tarsorum articulus penultimus bilobus.

OBSERVATIONS.

Les *tetraonyx* ont le port des mylabres, et, comme eux, ils ont des mandibules simples, et les ongles des tarses bifides; mais le pénultième article de leurs tarses est bilobé, ce qui les en distingue facilement. Ce sont des insectes exotiques,

ESPÈCES.

1. *Tétraonyx* à huit taches. *Tetraonyx octo-maculatum.*

T. nigrum; elytro singulo maculis quatuor rubris. Lat.

Lat. gen. 4. p. 380.

EjUSD. zoolog. et anat. de M. de Humb. p. 237. pl. 16. f. 7.

Habite la Nouvelle-Espagne.

OBSERVATIONS.

Les *cérocomes* sont remarquables en ce qu'ils paraissent n'avoir que neuf articles aux antennes, dont le dernier plus grand est en forme de bouton. Il paraît néanmoins que ce bouton est formé du dixième et du onzième article de l'antenne.

On a nommé plus particulièrement *cérocomes* les espèces dont les antennes des mâles sont irrégulières; et M. Latreille donne le nom d'*hyclées*, à celles dont les antennes sont régulières dans les deux sexes. Les unes et les autres sont terminées par un bouton.

ESPECE.

1. Cérocome de Schoeffer. *Cerocoma Schaefferi*.

C. viridis; antennis pedibusque luteis.

Meloe Schaefferi. Lin.

Cerocoma Schaefferi. Fab. él. 2. p. 74. Lat. gen. 2. p. 214.

Cerocoma. Geoff. 1. p. 358. pl. 6. f. 9.

Oliv. col. 3. n.° 48. pl. 1. f. 1. a. b. c. d.

Habite en Europe, surtout australe.

Etc. Pour les *hyclées*, voyez le *mylabris impunctata* d'Olivier, Encycl. n.° 48, et *mylabris argentata* de Fab. él. 2. p. 85.

OE N A S. (OEnas.)

Antennes filiformes, submoniliformes, coudées, plus courtes que le corselet; à seconde partie allongée en cylindre obconique, neuf articles. Palpes filiformes à dernier article cylindrique.

Corps allongé, étroit, subcylindrique.

Antennæ filiformes, submoniliformes, fractæ, thorace breviores: parte secundâ in caulem novem-articulatam, cylindræco-conicam elongatâ. Palpi filiformes: articulo ultimo cylindrico.

Corpus elongatum, angustum, teretiusculum.

OBSERVATIONS.

Il paraît que ce qui distingue principalement les *œnas* des cantharides, c'est que les premiers ont les antennes coudées après le second article. Ce genre, quoique fort peu remarquable, diffère beaucoup, par ses antennes, des mylabres et des cérocomes, et ne saurait être réuni aux cantharides.

ESPÈCES.

1. *Œnas* Africain. *Œnas afer*.

Œ. niger, punctatus; thorace rubro. Lat.

Meloe afer. Lin.

Litta afra. Fab. *él.* 2. *γ.* 80.

Œnas afer. Lat. *gen.* 1. *tab.* 10, *f.* 10, et *vol.* 2. *p.* 219.

Cantharis afra. Oliv. *col.* 3. *n.º* 46. *pl.* 1. *f.* 4. *a. b.*

Habite la Barbarie.

2. *Œnas* crassicorne. *Œnas crassicornis*.

Œ. niger; thorace elytrisque testaceis; antennis incrassatis.

Litta crassicornis. Fab. *él.* 2. *p.* 80.

Habite en Autriche.

Etc. Voyez l'*œnas luctuosus.* Lat. *gen.* 2. *p.* 220.

MÉLOÉ. (Meloe.)

Antennes moniliformes, droites ou sans coude, de la longueur du corselet, souvent irrégulières dans les mâles. Mandibules cornées. Mâchoires bifides. Palpes filiformes.

Corps oblong, mou. Point d'ailes. Elytres molles, plus courtes que l'abdomen, à bord intérieur arqué, l'un recouvrant l'autre près de sa base. Abdomen souvent très-grand.

Antennæ moniliformes , rectæ aut non fractæ , thoracis longitudine , in masculis sæpè irregulares. Mandibulæ corneæ. Maxillæ bifidæ. Palpi filiformes.

Corpus oblongum , molle. Alæ nullæ. Elytra mollia , abdomine breviora : margine interno arcuato , uno ad basim alterius superposito. Abdomen sæpius maximum.

OBSERVATIONS.

Les *méloës* constituent un genre particulier remarquable, qu'il ne faut point altérer en y associant d'autres insectes, quoique de la même famille. Ce sont des insectes sans ailes, à élytres qui ne couvrent point entièrement l'abdomen, et qui, par leur bord interne, ne forment point une suture droite. Ils se traînent à terre ou sur les plantes peu élevées, dont ils mangent les feuilles, et font sortir de leurs articulations une liqueur oléagineuse ronsâtre et fétide, dont on fait usage en médecine.

ESPÈCES.

1. Méloë proscarabé. *Meloe proscarabæus.*

M. nigro-cæruleus , punctatissimus ; antennis masculorum irregularibus ; elytris rugosulis.

Meloe proscarabæus. Lin.

Meloe. n.º 1. Geoff. 1. p. 377. pl. 7. f. 4.

Meloe proscarabæus. Fab. él. 2. p. 587.

Habite en Europe.

2. Méloë mélangé. *Meloe majalis.*

M. corpore rubro cupreoque vario , abdominis segmentis dorsalibus cupreis ; antennis in utroque sexu regularibus.

Meloe majalis. Lin. Fab. él. 2. p. 588.

Oliv. col. 3. n.º 45. pl. 1. f. 4.

Panz. fasc. 10. f. 13.

Habite l'Europe tempérée et australe;
Etc.

CANTHARIDE. (Cantharis.)

Antennes filiformes, droites, de la longueur du corselet ou plus longues. Mâchoires bifides. Palpes maxillaires plus gros à leur extrémité.

Corps allongé, subcylindrique. Elytres molles, de la longueur de l'abdomen, à dos convexe, un peu infléchies sur les côtés.

Antennae filiformes, rectae aut non fractae, thoracis longitudine, vel thorace longiores. Maxillae bifidae. Palpi maxillares ad apicem crassiores.

Corpus elongatum, subcylindricum. Elytra mollia, abdominis longitudine, dorso convexa, lateribus subinflata.

OBSERVATIONS.

Le nom de ce genre, changé par Linné et Fabricius, a dû être rétabli, comme l'ont fait M. Latreille et Olivier. Les cantharides sont distinguées des méloès, par la présence de leurs ailes et par leurs élytres aussi longues que l'abdomen. Elles n'ont point les antennes coudées comme les cœnas, et les palpes tout-à-fait filiformes, comme les zonites. Je n'en sépare point les *sitaris* de M. Latreille qui ont les antennes un peu plus longues, et les élytres rétrécies en pointe vers leur extrémité. On sait que la *cantharide vésicatoire* est très-employée en médecine.

ESPECES.

1. Cantharide vésicatoire. *Cantharis vesicatoria*.

C. aurato-viridis, nuda; antennis nigris.

Meloë vesicatorius. Lin.

Cantharide, n.º 1. Geoff. 1. p. 341. pl. 6. f. 5.

Cantharide vésicatoire. Oliv. col. 3. n.º 46. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Lat. hist. nat., etc. 10. p. 401. pl. 90. f. 7.

Litta vesicatoria. Fab. él. 2. p. 76.

Panz. fasc. 41. t. 4.

Habite en Europe, sur le frêne, le lilas, etc. dans l'été.

2. Cantharide érythrocéphale. *Cantharis erythrocephala*.

C. atra; capite testaceo, thorace elytrisque cinereo-lineatis.

Litta erythrocephala. Fab. él. 2. p. 80.

Cantharis erythrocephala. Oliv. col. 3. n.º 46. pl. 2. f. 16.

Habite l'Autriche, le midi de l'Europe.

3. Cantharide humérale. *Cantharis humeralis*.

C. nigra; elytris basi flavescens, ab humeris attenuato-subulatis.*

Cantharis, n.º 2. Geoff. 1. p. 342.

Cantharis humeralis. Oliv. col. 3. n.º 46. p. 19.

Necydalis humeralis. Fab. él. 2. p. 371.

Sitaris humeralis. Lat. gen. 2. p. 222.

Habite en Europe.

Etc.

ZONITE. (Zonitis.)

Antennes sétacées, longues, menues, insérées dans l'échancrure des yeux. Mandibules pointues. Palpes filiformes. Mâchoires allongées, presque linéaires, souvent saillantes.

Corps oblong. Tête penchée. Elytres molles, de la longueur de l'abdomen.

Antennæ setaceæ, longæ, exiles, in oculorum sinu insertæ. Mandibulæ acutæ. Palpi filiformes. Maxillæ elongatæ, sublineares, sæpè exsertæ.

Corpus oblongum. Caput inflexum. Elytra molliuscula, abdominis longitudine.

OBSERVATIONS.

Les *zonites* sont à peine distinctes des *cantharides* ; néanmoins , des deux divisions de leurs mâchoires , l'intérieure est très-peu saillante, tandis que l'autre se prolonge en une pièce longue, filiforme , qui fait paraître la mâchoire simple. D'ailleurs , leurs palpes sont tout-à-fait filiformes.

ESPECES.

1. Zonite bout brûlé. *Zonitis præusta.*

Z. testacea ; thorace mutico ; antennis elytrorumque apicibus nigris.

Zonitis præusta. Fab. *El.* 2. p. 23.

Lat. gen. 2. p. 223. et *hist. nat.* vol. 10. p. 406. pl. 90 . f. 8.

Panz. fasc. 36. t. 7.

Habite le midi de la France, l'Italie.

2. Zonite à six taches. *Zonitis sex-maculata.*

Z. rufa ; elytris flavescenti-rufis : singulis maculis tribus nigris. *Lat.*

Apale taqueté. *Oliv. col.* 3. n.º 52. pl. 1. f. 3.

Zonitis sex-maculata. *Lat. gen.* 2. p. 224.

Habite en Provence et près de Montpellier.

CINQUIÈME SECTION.

[Cinq articles à tous les tarsea.]

LES PENTAMÈRES.

Les *coléoptères pentamères* constituent la cinquième et dernière section de l'ordre qui les comprend, et terminent même la classe des insectes. En effet , dans les

insectes de cet ordre , la nature étant parvenue à donner cinq articles à tous les tarses de ces animaux , ne dépassé point ce terme , et ne fait plus que diversifier les espèces, dans une étendue vraiment admirable. Aussi les coléoptères pentamères sont-ils bien plus nombreux en espèces que ceux des sections précédentes , et probablement ce sont ceux qui sont les plus avancés en organisation , car ce sont eux qui ont les tégumens les plus solides; et c'est parmi eux que M. Cuvier a observé des trachées vésiculeuses , ce qui semble les rapprocher plus que les autres des arachnides trachéales.

Les uns vivent de matières végétales ; d'autres ne se nourrissent que de substance animale , au moins dans leur état de larve ; enfin , il y en a qui vivent habituellement dans les fumiers , les ordures.

A raison des diverses habitudes que les circonstances ont , depuis long-temps , fait contracter aux différentes races , les uns craignent et fuient la lumière , tandis que les autres s'y exposent sans en paraître incommodées. Aussi en voit-on qui ne volent jamais , et d'autres qui volent très-bien ; et il se trouve ici , comme dans presque tous les autres ordres des insectes , des races constamment aptères , quoiqu'ayant des élytres , et d'autres toujours ailées.

Comme on a établi un grand nombre de genres parmi ces coléoptères , il est nécessaire de les partager d'abord en coupes principales , et ces coupes doivent être simples , grandes , peu nombreuses. En conséquence , je conserverai celles dont j'ai déjà fait usage , ainsi que leur disposition entre elles , et je partagerai les coléoptères pentamères en trois grandes sections , de la manière suivante,

1.^{re} SECT. Pentamères *filicornes*.

Les antennes sont filiformes ou moniliformes ou sétacées, rarement épaissies vers le bout.

2.^o SECT. Pentamères *clavicornes*.

Les antennes sont terminées en massue le plus souvent perforée ou presque solide.

3.^o SECT. Pentamères *lamellicornes*.

Les antennes sont en massue lamellée ou feuilletée.

PREMIÈRE SECTION.

PENTAMÈRES FILICORNES.

Les antennes sont filiformes ou moniliformes ou sétacées, rarement épaissies vers le bout.

Les coléoptères de cette section sont des pentamères dont les antennes ne forment point à leur extrémité une massue bien distincte. C'est à-peu-près là tout ce qu'ils ont de commun entre eux.

On sait que ces coléoptères offrent cinq ou six familles très-distinctes ; mais l'on n'est point d'accord sur l'ordre de leur distribution. En effet, tant que l'on n'aura point de principes convenus pour la détermination des rapports généraux, l'arbitraire décidera toujours, et chacun aura son ordre particulier pour la disposition de ces familles.

Relativement au mien, j'ai cru qu'à la suite des *cantharidiens*, qui terminent les coléoptères hétéromères,

dans ma distribution , je devais commencer les coléoptères pentamères par les *téléphoriens*. Or , en suivant toujours les caractères indiqués par M. *Latreille* , il en est résulté la division suivante pour les pentamères filicornes.

DIVISION DES PENTAMÈRES FILICORNES.

§. *Quatre palpes seulement : deux maxillaires et deux labiaux.*

(1) Elytres recouvrant en totalité ou en majeure partie l'abdomen.

(a) Sternum antérieur de forme ordinaire ; ne s'avancant point sous la tête.

(b) Mandibules entières à leur pointe et sans dentelure au-dessous. Le corps mou.

Les téléphoriens.

(bb) Mandibules fendues à leur pointe ou munies d'une dent au-dessous.

(+). Le corps mou.

Les mélyrides.

(++). Le corps dur.

Les ptiniens.

(aa) Sternum antérieur s'avancant sous la tête , presque sous la bouche , et sa partie postérieure se prolongeant en pointe ou en corne.

Les buprestiens.

(2) Elytres raccourcies , laissant la majeure partie de l'abdomen à découvert.

Les staphyliniens.

§§. *Six palpes : quatre maxillaires et deux labiaux.*

Les carabiens.

LES TÉLÉPHORIENS.

Mandibules entières à leur pointe et sans dentelure au-dessous. Le corps mou.

Sous cette dénomination, je rassemble les cébrions, les lampyres, les téléphores, ainsi que les coléoptères à mandibules simples qui y tiennent par leurs rapports. Ce que ces insectes ont de commun avec les mélyrides qui viennent ensuite, c'est d'avoir des élytres molles, flexibles. Les uns et les autres nous paraissent donc devoir commencer la première section des coléoptères pentamères, afin de suivre immédiatement les *cantharidiens*, qui terminent les coléoptères hétéromères et qui ont aussi les élytres molles.

Ces insectes ont, en général, le corps allongé, mou; la tête plus ou moins enfoncée, abaissée, ou cachée sous le corselet; des élytres longues, flexibles, souvent ornées de couleurs assez brillantes. La plupart sont agiles, volent très-bien, et se nourrissent de substance végétale, dans l'état parfait; mais on soupçonne que, dans l'état de larve, plusieurs sont carnassiers. Je les divise de la manière suivante.

DIVISION DES TÉLÉPHORIENS.

(1) Palpes filiformes : ils ne sont pas plus gros à leur extrémité.

(2) Tous les articles des tarses entiers.

Cébrion.

OBSERVATIONS.

Les *dascilles*, que l'on confondait avec les *cistèles* avant que M. Latreille les ait distingués, ont des rapports avec les *cébrions* ; mais ils ont le corps un peu court, et n'ont pas les articles des tarses tous entiers. Leurs mandibules ne sont point cachées sous le labre.

ESPECES.

1. Dascille cerf. *Dascillus cervinus*.

D. niger, cinereo-pubescent ; *antennis pedibus clytrisque pallido-testaceis*. Lat.

Chrysomela cervina. Lin.

Atopa cervina. Fab. él. 2. p. 15.

Cistela cervina. Oliv. col. 3. n.º 54. pl. 1. f. 2. a.

Dascillus cervinus. Lat. gen. 1. p. 252. pl. 8. f. 1.

Habite en Europe.

2. Dascille cendré. *Dascillus cinereus*.

D. lividus ; *clytris pedibusque fuscis*.

Atopa cinerea. Fab. él. 2. p. 15.

Habite l'Allemagne ; l'Italie. Collect. du Muséum.

Etc.

E L O D E. (Elodes.)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet. Mandibules en partie cachées sous le labre. Palpes labiaux fourchus.

Corps elliptique, mou. Corselet transvers. Le pénultième article des tarses bilobé.

Antennæ filiformes, thorace paulò longiores. Mandibulæ infra labrum partim occultatæ. Palpi labiales furcati.

Corpus ovato-ellipticum, molle. Thorax transversus. Tarsorum articulus penultimus bilobus.

OBSERVATIONS.

Les *élodes* sont de petits coléoptères pentamères que l'on angeait parmi les cistèles. Ils sont distingués des scirtes, parce qu'ils n'ont point de pattes propres à sauter. Leur tête est en grande partie cachée sous le corselet.

ESPECES.

1. Elode pâle. *Elodes pallida*.

E. pallida; capite elytrorumque apicibus fuscis.

Elodes pallida. Lat. gen. 1. p. 253. pl. 7. f. 12.

Cyphon pallidus. Fab. él. 1. p. 501.

Habite en France, en Angleterre.

2. Elode brunâtre. *Elodes fuscens*.

E. nigricans vel castaneo-fusca; antennarum basi pedibusque rufescentibus.

Elodes fuscens. Lat. gen. 1. p. 253.

Cyphon griseus? Fab. él. 1. p. 502.

Habite aux environs de Paris. ●

Etc.

SCIRTE. (Scirtes.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet.
Palpes labiaux bifides.

Corps ovale-orbiculaire. Pattes postérieures à cuisses très-grosses et propres à sauter.

Antennæ filiformes, thorace longiores. Palpi labiales apice bifidi.

Corpus ovato-orbiculatum. Elytra molliuscula. Pedes postici femoribus incrassatis, saltatoriis.

OBSERVATIONS.

Les *scirtes* sont, en quelque sorte, aux *élodes* ce que les *altises* sont aux *chrysomèles*. Au reste, ce sont de très-

petits coléoptères pentamères qui ne sont guères différens des élodes que parce qu'ils ont des pattes propres à sauter. Fabricius en compose la deuxième division de ses *cyphons*.

ESPECE.

1. Scirte hémisphérique. *Scirtes hemisphaerica*.

Sc. suborbiculata, depressa, nigra.

Cyphon hemisphaericus. Fab. él. 1. p. 502.

Chrysomela hemisphaerica. Lin.

Habite en Europe, sur le noisetier. On le trouve aux environs de Paris.

Etc.

RHIPICÈRE. (*Rhipicera*.)

Antennes un peu courtes, en panache. Mandibules simples. Palpes filiformes.

Corps ovale-oblong. Pénultième article des tarses bilobé. Des pelottes membraneuses sous les articles intermédiaires des tarses.

Antennæ brevisculæ, flabellatæ. Mandibulæ simplices. Palpi filiformes.

Corpus ovato-oblongum. Tarsorum articulus penultimus bilobus, eorundem articulis intermediis subtus pulvillis membranaceis.

OBSERVATIONS.

Le genre *rhipicère* est encore inédit et n'est qu'indiqué par M. Latreille. Il comprend des insectes exotiques dont on a dans les collections plusieurs espèces, les unes de la Nouvelle-Hollande, et les autres du Brésil. Je ne puis citer que la suivante.

E S P E C E.

1. Rhipicère à moustaches. *Rhipicera mystacina*.*R. testacea albo-punctata.**Ptilinus mystacinus*. Fab. éleut. 1. p. 328.

Drury, ins. 3. tab. 48. f. 7.

Habite la Nouvelle-Hollande.

L A M P Y R E. (Lampyris.)

Antennes filiformes, quelquefois dentées, subpectinées. Mâchoires bifides. Palpes à dernier article plus gros, terminé en pointe. Bóuche très-petite.

Corps allongé, mou. Corselet aplati, semi-circulaire, débordant, cachant la tête.

Antennæ filiformes, interdum serrulatæ, subpectinatae. Maxillæ bifidæ. Palpi articulo ultimo crassiore, apice acuto. Os parvum.

Corpus oblongum, molle. Thorax semi-circularis, planus, marginatus, caput obtegens.

OBSERVATIONS.

Les *lampyres*, qui tiennent de très-près aux *lycus* par leurs rapports, n'ont pas, comme ces derniers, la partie antérieure de la tête avancée en museau, ni le dernier article des palpes tronqué. Les uns et les autres ont le corselet plat, débordant, recouvrant et cachant la tête. Ils ont peu d'agilité dans leurs mouvemens ambulatoires.

Ces insectes sont célèbres par la faculté singulière qu'offrent plusieurs de leurs espèces, surtout les individus femelles, de répandre, en certains temps, une lumière phosphorique, qui a beaucoup d'éclat dans l'obscurité. Parmi les

deux espèces qui se trouvent en France, celle dont la femelle n'a point d'ailes est la plus connue et est singulièrement lumineuse. On lui a donné le nom de *ver-luisant*, parce qu'elle ne peut que ramper comme un ver, et que le soir la lumière qu'elle jette lui donne l'apparence d'un charbon ardent. Mais en Italie et dans le midi de la France, ainsi que dans les pays chauds de l'Amérique, plusieurs espèces connues sont lumineuses et ailées dans les deux sexes; et, comme c'est le soir qu'elles volent, elles offrent des espèces d'étincelles qui sillonnent de tous côtés dans les airs avec beaucoup d'éclat, ce qui forme un spectacle singulier et admirable. A l'égard des espèces lumineuses, ce ne sont pas seulement les femelles qui ont cette faculté : les mâles l'ont aussi, mais moins fortement. On a observé que la partie lumineuse de ces insectes est placée au-dessous des deux ou trois derniers anneaux de l'abdomen, qui sont d'une couleur plus pâle que les autres, et qu'elle y forme une tache jaunâtre ou blanchâtre.

ESPECES.

1. Lampyre ver-luisant. *Lampyris noctiluca*.

L. oblonga, fusca; clypeo cinereo. F.

Lampyris noctiluca. Lin. Fab. él. 2. p. 99.

Panz. fasc. 41. t. 7.

Oliv. col. 2. n.º 28. pl. 1. f. 2.

Habite le nord de la France et de l'Europe. Femelle aptère.

2. Lampyre splendidule. *Lampyris splendidula*.

L. oblonga, fusca; clypeo apice hyalino. F.

Lampyris splendidula. Lin. Fab. él. 2. p. 99.

Panz. fasc. 41. t. 8.

Oliv. col. 2. n.º 28. pl. 1. f. 1. a. b. c. d.

Habite en Europe. La femelle est encore aptère.

3. Lampyre d'Italie. *Lampyris Italica*.

L. nigra; thorace transverso pedibusque rufis; abdominis apice albissimo.

Lampyris italica. Lin. Fab. él. 2. p. 104.

Oliv. col. 2. n.º 28. pl. 2. f. 12. a. b. c. d.

Lat. gen. 1. p. 259.

Habite l'Italie et le midi de la France. Les mâles et les femelles ailés.

4. Lampyre hémiptère. *Lampyris hemiptera*.

L. nigra ; *elytris brevissimis*. F.

Lampyris hemiptera. Fab. él. 2. p. 106.

Oliv. col. 2. n.º 28. pl. 3. f. 25. a. b. Geoff. 1. p. 168. n.º 2.

Habite en France. Rare aux environs de Paris.

c. Voyez les espèces exotiques, dans Fabricius et Olivier.

LYCUS. (Lycus.)

Antennes filiformes, comprimées, subdentées, plus longues que le corselet. Mandibules simples. Dernier article des palpes plus gros et tronqué. Bouche avancée en museau.

Tête cachée sous le corselet. Corps allongé. Corselet plat, débordant sur les côtés et antérieurement. Elytres molles, grandes, dilatées postérieurement.

Antennæ filiformes, compressæ, subserratæ, thorace longiores. Mandibulæ simplices. Palporum articulus ultimus crassior, truncatus. Os in rostrum antice productum.

Caput sub thorace occultatum. Corpus oblongum. Thorax planus, marginatus, caput obtegens. Elytra mollia, magna, posticè latiora.

OBSERVATIONS.

Les *lycus* constituent un beau genre, dont les espèces sont nombreuses, et variées d'assez belles couleurs. Ce sont des insectes très-voisins des lampyres par leurs rapports, ayant de même le corselet plane, débordant au-

dessus de la tête ; mais dont la partie antérieure de cette tête se prolonge en un museau rostriforme , qui s'incline en dessous. Ces insectes ont des mouvemens lents ; leur tête est petite ; leurs antennes sont rapprochées à leur base ; le pénultième article des tarses est bilobé ; enfin , dans plusieurs espèces, les élytres sont en partie transparentes, maculées , et dilatées à leur extrémité , surtout dans les mâles.

ESPECES.

1. *Lycus sanguin.* *Lycus sanguineus.*

L. niger ; *thoracis lateribus elytrisque sanguineis.*

Lampyris sanguinea. Lin.

Lampyris. Geoff. 1. p. 168. n.º 3.

Lycus sanguineus. Fab. él. 2. p. 116.

Panz. fasc. 41. t. 9.

Oliv. col. 2. n.º 29. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Latr. gen. 1. p. 257.

Habite en Europe. Commun dans le midi de la France.

2. *Lycus large.* *Lycus latissimus.*

L. flavus ; *elytris macula marginali posticæque nigris : marginis laterali maximo dilatato.*

Lampyris latissima. Lin.

Lycus latissimus. Fab. él. 2. p. 110.

Oliv. col. 2. n.º 29. pl. 1. f. 2.

Habite l'Afrique équinoxiale.

3. *Lycus fascié.* *Lycus fasciatus.*

L. ater ; *thoracis marginis flavescens ; elytris fasciis latis albis.*

Cantharis tropica. Lin.

Lycus fasciatus. Fab. él. 2. p. 111.

Oliv. col. 2. n.º 29. pl. 1. f. 3.

Habite à Cayenne.

OMALYSE. (Omalysus.)

Antennes filiformes , rapprochées à leur base , un peu

plus longues que le corselet. Mandibules simples. Dernier article des palpes maxillaires tronqué.

Corps allongé, déprimé. Tête saillante. Corselet presque carré, à angles postérieurs saillans et pointus.

Antennæ filiformes, basi approximatae, thorace paulo longiores. Mandibulae simplices. Palpi maxillares articulo ultimo truncato.

Corpus oblongum, depressum. Caput exsertum. Thorax subquadratus, ad latera submarginatus: angulis posticis productis, acutis.

OBSERVATIONS.

L'*Omalyse*, distinguée comme genre par Geoffroy, est voisine des *lycus* par ses rapports; mais son corselet ne débord pas antérieurement. Les élytres de cet insecte recouvrent tout l'abdomen et sont un peu fermes. Le pénultième article des tarses est bilobé.

ESPECE.

1. *Omalyse suturale. Omalysus suturalis.*

Omalyse. Geoff. 1. p. 180. tab. 2. f. 2.

Oliv. col. 2. n.º 24. pl. 1. f. 1.

Omalyse suturalis. Fab. él. 2. p. 108. Lat. gen. 1. p. 257.

Panz. fasc. 35. t. 12.

Habite en Europe, dans les bois.

TÉLÉPHORE. (Telephorus.)

Antennes filiformes, longues, écartées à leur base. Mandibules simples. Palpes en hache à leur extrémité.

Corps allongé, un peu déprimé, mou. Elytres de la longueur de l'abdomen, très-flexibles.

Antennæ filiformes , longæ , ad basim distantes. Mandibulæ simplices. Palpi articulo ultimo securiformi.

Corpus elongatum , subdepressum , molle. Elytra abdominis longitudine , mollia.

OBSERVATIONS.

Le nom de *cantharis* que Linné et Fabricius ont donné aux insectes dont il est ici question , doit être réservé pour le genre qui comprend l'insecte connu depuis si long-temps en médecine , sous le nom de *cantharide*. Ainsi nous suivrons les entomologistes qui ont appelé *téléphores* les insectes dont il s'agit ici.

Les *téléphores* ont la tête saillante, large , courte ; le corps allongé, ordinairement mou, ainsi que les élytres. Les palpes maxillaires ne sont pas beaucoup plus longs que les labiaux. Le pénultième article des tarses est bilobé. Ces insectes sont carnassiers et vivent de proie. Dans l'état parfait , on les trouve sur les plantes et sur les fleurs , dans les prairies , vers la fin du printemps. Il paraît que leur larve vit dans la terre humide.

ESPÈCES.

1. Téléphore ardoisé. *Telephorus fuscus*.

T. thorace marginato rubro : macula nigra ; elytris fuscis.

Cantharis fusca. Lin. Fab. é. 1. p. 294.

Cicindela. Geoff. 1. p. 170. pl. 2. f. 8.

Telephorus fuscus. Oliv. col. 2. n.º 26. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Lat. gen. 1. p. 260.

Habite en Europe , dans les haies , les jardins , au printemps.

2. Téléphore livide. *Telephorus lividus*.

T. thorace marginato , rufo ; elytris testaceis.



SANS VERTÈBRES.

453

Cantharis livida. Lin. Fab. él. 1. p. 295.

Cicindela. Geoff. 1. p. 171. n.º 2.

Telephorus lividus. Oliv. col. 2. n.º 26. pl. 1. f. 8.

Habite en Europe. Élytres d'un jaune d'ocre.

Etc.

MALTHINE. (Malthinus.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet. Palpes à dernier article ovale, pointu.

Corps allongé. Tête saillante, un peu rétrécie postérieurement. Élytres plus courtes que l'abdomen dans plusieurs.

Antennæ filiformes, thorace longiores. Palpi articulo ultimo ovato, subacuto.

Corpus oblongum. Caput exsertum, posticè subattenuatum. Elytra in pluribus abdomine breviora.

OBSERVATIONS.

Les *malthines* avoisinent de très-près les téléphores, par des rapports nombreux; néanmoins, ayant les palpes presque filiformes, la tête moins large postérieurement, et souvent les élytres plus courtes que l'abdomen, on peut les en distinguer.

ESPÈCE.

1. Malthine à points jaunes. *Malthinus biguttatus*.

M. thorace marginato, medio atro; elytris abbreviatis, apice flavis.

Cantharis biguttata. Lin. Fab. él. 1. p. 304;

Panz. fasc. 11. t. 15.

Necydalis. Geoff. 1. p. 372. pl. 7. f. 2.

Malthinus marginatus. Lat. gen. 1. p. 26r.

Habite en Europe.

Etc.

LES MÉLYRIDES.

Mandibules fendues à leur pointe, ou munies d'une dentelure au-dessous. Le corps mou et les élytres flexibles dans un grand nombre.

Sous le nom de *mélyrides*, je réunis différens coléoptères pentamères qui tiennent un peu aux téléphoriens, parce que, parmi eux, la plupart ont encore des élytres flexibles : ils doivent donc être placés à leur suite. Plusieurs néanmoins ont des élytres assez dures, et semblent annoncer le voisinage des ptines.

Dans les uns, la tête est dégagée et séparée du corselet par un étranglement ou un cou. Leurs mandibules sont courtes et épaisses. Ce sont les lime-bois de M. Latreille.

Dans les autres, la tête est enfoncée postérieurement dans le corselet, et souvent même se rétrécit en devant. Leurs mandibules sont étroites et allongées. Ceux-ci constituent les mélyrides de M. Latreille.

L'association des divers genres qu'embrassent nos mélyrides, n'est pas probablement à l'abri de justes reproches ; mais elle a pour but de simplifier la méthode : ce qui, selon moi, n'est pas sans intérêt. Je divise cette coupe de la manière suivante.

DIVISION DES MÉLYRIDES.

(1) Tête dégagée et séparée du corselet par un étranglement ou un cou.

(2) Élytres n'embrassant point l'abdomen par les côtés.

(→) Elytres très-courtes.

Atractocère.

(++) Elytres couvrant une grande partie de l'abdomen.

Lymexyle.

Cupès.

(b) Elytres embrassant l'abdomen. Palpes maxillaires plus longs que la tête.

Mastige.

Scydmanè.

(2) Tête enfoncée postérieurement dans le corselet. Palpes maxillaires avancés au-delà de la bouche.

(a) Des vésicules rétractiles sur les côtés du corps.

Malachie.

(b) Point de vésicules sur les côtés du corps.

(+) Antennes, soit simples, soit en scie.

Mélyre.

Clairon.

Tille.

(++) Antennes pectinées.

Drile.

ATRACTOCÈRE. (Atractocerus.)

Antennes simples, subfusiformes, insérées devant les yeux. Palpes maxillaires longs, subpectinés.

Corps allongé, linéaire. Corselet oblong, convexe. Elytres très-courtes.

Antennæ simplices, subfusiformes, antè oculos insertæ. Palpi maxillares longi, ad latera subpectinati.

Corpus elongato-lineare. Thorax oblongus, convexus. Elytra brevissima.

OBSERVATIONS.

L'*Atractocère* ne paraît différer des *lymexyles* que parce qu'il a des élytres très-courtes, comme celles des *staphylins*. On ne connaît que l'espèce suivante.

ESPECE.

1. *Atractocère nécydalolde. Atractocerus necydaloides.*

A. rufescens : thorace lined longitudinali flavâ notato.

Necydalis brevicornis. Lin.

Lymexylon abbreviatum. Fab. él. 2. p. 87.

Atractocerus. Lat. gen. 1. p. 268.

Habite en Guinée. Sa larve vit dans le bois.

LYMEXYLE. (Lymexylon.)

Antennes filiformes, écartées à leur base. Mandibules courtes. Palpes maxillaires longs, presque en massue.

Corps allongé, subcylindrique. Les élytres un peu molles, recouvrant presque entièrement l'abdomen.

Antennæ filiformes, basi distantes. Mandibulæ breves. Palpi maxillares longi, subclavati.

Corpus elongatum, subcylindricum. Elytra molliuscula, abdominis dorsum ferè omninò tegentia.

OBSERVATIONS.

Les *lymexyles*, ou lime-bois, ont la tête grosse, presque de la largeur du corselet dont elle est séparée par un

étranglement plus ou moins profond. Leur corps est allongé presque comme celui des taupins ; mais il en est distingué par la forme du corselet et par des élytres plus molles. Les larves de ces insectes vivent dans le bois , le rongent , le percent et causent de grands dommages , surtout aux chênes.

ESPECES.

1. Lymexyle dermestoiïde. *Lymexylon dermestoides*.

L. testaceum ; oculis , alis pectoreque nigris. F.

Cantharis dermestoides. Linn.

Lymexylon dermestoides. Fab. él. 2. p. 87.

Oliv. col. 2. n.º 25. pl. 1. f. 1. a. b. c. d. femina , et f. 2. mas.

Hylecatus. Latr. gen. 1. p. 266.

Habite le nord de l'Europe , dans le bois. Ses antennes sont un peu en scie.

2. Lymexyle naval. *Lymexylon navale*.

L. luteum ; capite , item elytrorum margine apiceque nigris. F.

Cantharis navalis. Lin.

Lymexylon navale. Fab. él. 2. p. 88. Lat. gen. 1. p. 267.

Oliv. col. 2. n.º 25. pl. 1. f. 4. a. b.

Habite en Europe , dans le bois de chêne qu'il détruit.

Etc.

CUPÈS. (Cupes.)

Antennes cylindriques , un peu plus longues que le corselet. Palpes égaux : à dernier article tronqué.

Corps allongé , sublinéaire. Tête saillante, Elytres fermes , couvrant tout l'abdomen. Pattes courtes.

Antennæ cylindricæ , thorace paulò longiores. Palpi æquales , articulo ultimo truncato.

Corpus elongatum , sublineare. Caput exsertum. Elytra rigida , abdomen totum tegentia. Pedes breves.

OBSERVATIONS.

Ce genre, encore peu connu, ne peut être placé près des lymexyles que provisoirement. L'insecte qui en est le type a des élytres d'une consistance assez solide; les antennes dirigées en avant et des pattes courtes. Ses habitudes ne sont pas connues.

ESPECE.

1. Cupès à tête jaune. *Cupes capitata*.

Cupes capitata. F. fl. 2. p. 66.

Latr. gen. 1. p. 255. pl. 8. f. 2.

Coqueb. Ill. ic. dec. 3. t. 30. f. 1.

Habite la Caroline. Boïc.

MASTIGE. (Mastigus.)

Antennes subfiliformes, brisées : les deux premiers articles fort longs. Palpes maxillaires saillans, presque aussi longs que la tête; le dernier article en massue.

Corps allongé. Tête et corselet plus étroits que l'abdomen. Abdomen ovale, convexe. Elytres connées, embrassant l'abdomen.

Antennæ subfiliformes, fractæ : articulis duobus primis prælongis. Palpi maxillares exserti, capitis ferè longitudine : articulo ultimo clavato.

Corpus elongatum. Caput thoraxque abdomine angustiora. Abdomen ovatum, convexum. Elytra connata, abdomen obvolvencia.

OBSERVATIONS.

Les mastiges sont la plupart exotiques, et semblent avoisiner les ptines. Ils ont néanmoins un aspect différent, et

sont remarquables par leurs palpes maxillaires. On les trouve à terre, soit sous les pierres, soit parmi des débris.

ESPÈCES.

1. Mastige palpeur. *Mastigus palpalis*.

M. niger ; *antennis infernè glabris*.

Mastigus palpalis. Latr. gen. 1. p. 281. tab. 8. f. 5.

Et hist. nat. vol. 9. p. 186.

Habite en Portugal.

2. Mastige spinicorne. *Mastigus spinicornis*.

M. fusco-castaneus ; *antennis infernè spinuloso-hirtis*.

Ptinus spinicornis. Fab. 61. 1. p. 327.

Oliv. col. 2. n.º 17. pl. 1. f. 5. a. b.

Habite les îles de Sandwich.

SCYDMÈNE. (Scydmaenus.)

Antennes submoniliformes, droites, de la longueur du corselet. Palpes maxillaires saillans, presque aussi longs que la tête.

Corps oblong; corselet subovale, plus long que large. Abdomen ovale, embrassé par les élytres.

Antennæ submoniliformes, rectæ, thoracis longitudine. Palpi maxillares exserti, capitis ferè longitudine.

Corpus oblongum. Thorax longitudinalis, subovatus. Abdomen ovale, elytris obvolutum.

OBSERVATIONS.

Les scydmanes n'ont pas les antennes coudées comme celles des mastiges; ces antennes sont un peu grenues et souvent grossissent vers leur sommet. Les palpes maxillaires

ont leur dernier article très-petit , terminé en pointe. On trouve ces insectes sur la terre.

ESPECES.

1. Scydmanène d'Helwig. *Scydmanus Helwigii*.

S. fusco-castaneus, pubescens ; thorace subgloboso ; elytri connatis.

Pselaphus Helwigii. Herbat. col. 4. 111. 3. tab. 3g. f. 12.

Antherinus Helwigii. Fab. él. 1. p. 292.

Scydmanus Helwigii. Lat. gen. 1. p. 282.

Habite en Europe , au pied des arbres.

2. Scydmanène de Godart. *Scydmanus Godarti*.

S. castaneus , pubescens ; thorace subelongato-quadr.

Scydmanus Godarti. Latr. gen. 1. p. 282. tab. 8. f. 6.

Habite la France.

Ajoutez, comme troisième espèce, l'*antherinus minutus* Fabricius.

MALACHIE. (Malachius.)

Antennes filiformes, un peu en scie , aussi long que le corselet ou plus longues. Palpes filiformes.

Corps ovale , un peu mou. Corselet large , déprimé. Elytres flexibles. Quatre papilles vésiculeuses lobées rétractiles aux côtés de la poitrine et de l'abdomen.

Antennæ filiformes , subserratæ , thoracis longidine aut thorace longiores. Palpi filiformes.

Corpus ovale, molliusculum. Thorax latus , rotundatus , depressus. Elytra flexilia. Papillæ quatuor vesiculares lobatæ, retractiles ; pectoris abdominis lateribus erumpentes.

OBSERVATIONS.

Les *malachies* ont des couleurs assez brillantes, et passent pour aux téléphores par leurs rapports, quoiqu'elles ont des mandibules moins simples. Elles sont, en général, petites, et ont le corps moins allongé. Néanmoins leurs tarses ne sont point en hache, et le pénultième article de ces tarses n'est point bilobé.

Les insectes présentent une singularité remarquable; celle de voir sur les côtés, des vésicules rouges, charnues, irrégulières, subtrilobées, qu'ils font sortir et rentrer à volonté, et qu'ils enflent lorsqu'on les touche. On ignore l'usage de ces parties.

Les *malachies* se trouvent sur les fleurs, et la plupart sont indigènes de l'Europe.

ESPÈCES.

Malachie bronzée. *Malachius æneus*.

M. corpore viridi-æneo, elytris extrorsum sanguineis.

Cantharis ænea. Lin. *Cicindela*. Geoff. 1. p. 174. n.º 7.

Malachius æneus. Fab. él. 1. p. 306. Latr. gen. 1. p. 265.

Oliv. col. 2. n.º 27. pl. 2. f. 6.

Panz. fasc. 10. t. 2.

Habite en Europe, sur les fleurs.

Malachie bipustulée. *Malachius bipustulatus*.

M. æneo-viridis; elytris apice rubris.

Cantharis bipustulata. Lin. *Cicindela*. n.º 8. Geoff.

Malachius bipustulatus. Fab. él. 1. p. 306.

Oliv. col. 2. n.º 27. pl. 1. f. 1.

Panz. fasc. 10. t. 3.

Habite en Europe.

Etc.

MÉLYRE. (Melyris.)

Antennes filiformes, un peu en scie, à peine de la longueur du corselet. Palpes filiformes.

Corps ovale, ou ovale-oblong. Corselet rétréci antérieurement. Tête inclinée, en partie cachée sous le corselet. Elytres grandes, recouvrant tout l'abdomen.

Antennae filiformes, subserratae, thoracis vix longitudine. Palpi filiformes.

Corpus ovatum, vel ovato-elongatum. Thorax antice angustior. Caput inflexum, sub thorace parum absconditum. Elytra magna, abdomen penitus obtegunt.

OBSERVATIONS.

Les *mélyres*, auxquels nous croyons pouvoir réunir les *zygies* et même les *dasytes*, se rapprochent des *malachies* par leurs rapports; mais ils n'ont point de vésicules rétractiles. Ces insectes ont, les uns, d'assez belles couleurs, les autres, des couleurs sombres. Leurs mouvemens sont lents, mais ils volent avec facilité. On les trouve sur les plantes et sur les fleurs.

ESPECES.

1. Mélyre vert. *Melyris viridis*.

M. viridis; elytris lineis elevatis tribus. F.

Melyris viridis. Fab. él. 1. p. 311.

Oliv. col. 2. n.º 21. pl. 1. f. 1. et pl. 2. f. 1.

Latr. gen. 1. p. 263.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

2. Mélyre du Levant. *Melyris oblongus*.

M. rufus; capite elytrisq. cyaneo-viridibus.

Zygia oblonga. Fab. él. 2. p. 22.

Lat. gen. 1. p. 264. pl. 8. f. 3.

Habite dans le Levant.

3. Mélyre noir. *Melyris ater*.

M. oblongus, niger, hirtus, vagè punctatus.

Dermestes hirtus. Lin.

Dasytes ater. Fab. él. 2. p. 72. Latr. gen. 1. p. 261.

Métyre atre. Oliv. col. 2. n.º 27. pl. 2. f. 8.

An lagria atra? Panz. fasc. 8. t. 9.

Habite l'Europe australe, sur les graminées.

Etc.

CLAIRON. (Clerus.)

Antennes de la longueur du corselet, grossissant insensiblement, formant presque une massue à leur extrémité. Palpes inégaux : les maxillaires subfiliformes ; les labiaux terminés en hache.

Corps oblong, non bordé, velu : corselet oblong, rétréci postérieurement. Tête inclinée, en partie enfoncée dans le corselet. Tarses à quatre articles apparens.

Antennæ thoracis longitudine, sensim extrorsum crassiores, versus extremitatem subclavatæ. Palpi inæqualis : maxillaribus subfiliformibus ; labialibus apice securiformi.

Corpus oblongum, immarginatum, subhirtum. Thorax oblongus, posticè angustior. Caput inflexum, clypeo partim insertum. Tarsi articulis quatuor conspicuis, eorum articulo primo abscondito.

OBSERVATIONS.

Les clairs tiennent encore aux coléoptères à élytres flexibles, et néanmoins, sous d'autres rapports, ils semblent se rapprocher des nécrophages. Leurs antennes grossissent insensiblement ; et quoique leurs trois derniers articles soient les plus gros, ils vont eux-mêmes en grossissant, et ne forment point une massue séparée. On ne connaissait que quatre articles aux tarses de ces insectes ; mais M. Latreille a observé que leur premier article était caché par le second, et qu'ils en ont réellement cinq.

Ces insectes sont allongés, ont des couleurs variées assez brillantes, et souvent des bandes colorées transverses. Leurs yeux sont un peu en croissant. On les trouve sur les fleurs; mais leurs larves sont carnassières, dévorent d'autres insectes vivans, ou rongent des matières animales. Selon ma méthode de simplification, j'y réunis les nécrobies.

ESPECES.

1. Clairon alvéolaire. *Clerus alvearius*.

C. violaceo-ceruleus, hirtus; elytris rubris: macula communi fasciisque tribus ceruleo-nigris.

Trichodes alvearius. Fab. él. 1. p. 284.

Clerus. Geoff. 1. p. 304. pl. 5. f. 4.

Oliv. col. 4. n.º 76. pl. 1. f. 5. a. b.

Latr. gen. 1. p. 273. Panz. fasc. 31. t. 14.

Habite en Europe.

2. Clairon apivore. *Clerus apiarius*.

C. cyaneus; elytris rubris: fasciis tribus cerulescentibus; tertio terminali. F.

Trichodes apiarius. Fab. él. 1. p. 284.

Clerus apiarius. Oliv. *ibid.* pl. 1. f. 4.

Latr. gen. 1. p. 273. Panz. fasc. 31. t. 13.

Attelabus apiarius. Lin.

Habite en Europe, dans les ruches des abeilles.

3. Clairon violet. *Clerus violaceus*.

C. violaceo-ceruleus, subhirtus; antennis nigris.

Dermestes violaceus. Lin.

Corynetes violaceus. Fab. él. 1. p. 285.

Necrobia violacea. Latr. gen. 1. p. 274.

Oliv. col. 4. n.º 76 bis. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Panz. fasc. 5. t. 7.

Habite en Europe, dans les cadavres des animaux.

Etc.

TILLE. (Tillus.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet, plus moins en scie d'un côté. Mandibules subbidentées. Lèvres filiformes : les labiaux quelquefois en hache. Corps allongé, subcylindrique. Corselet plus étroit que les élytres.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine, hinc plus minusve serratæ. Mandibulæ subbidentatæ. Palpi filiformes : labialibus interdum securiformibus.

Corpus elongatum, subcylindricum. Thorax elytris angustior.

OBSERVATIONS.

Les *tilles* ne sont pas des insectes carnassiers, et néanmoins semblent se rapprocher un peu des clairons. Ces insectes ont peu d'agilité, fréquentent les fleurs, et sont peu nombreux en espèces. Ceux parmi eux dont les quatre palpes sont filiformes, sont des énoplies pour M. Latreille; ils n'ont, comme les clairons, que quatre articles apparens aux antennes.

ESPECES.

Tille allongée. *Tillus elongatus*.

T. ater; thorace villosa rufo.

Chrysomela elongata: Lin.

Tillus elongatus. Oliv. col. 2. n.º 22. pl. 1. f. 1. a. b.

c. d. e.

Tillus elongatus. Fab. él. 1. p. 281. Panz. fasc. 43. t. 16.

Latr. gen. 1. p. 269.

Habite en Europe.

Tille serraticorne. *Tillus serraticornis*.

T. ater; elytris testaceis.

Tome IV.

Tillus serraticornis. Oliv. col. 2. n.º 22. pl. 1. f. 2. a. b. c. d.
 Fab. él. 1. p. 282. Panz. fasc. 26. t. 13.

Enoplum serraticorne. Latr. gen. 1. p. 271.
 Habite en Italie.

DRILE. (Drilus.)

Antennes filiformes, pectinées d'un côté, surtout dans les mâles, un peu plus longues que le corselet. Palpes maxillaires longs, avancés.

Corps oblong, un peu déprimé, mon. Corselet transverse. Elytres grandes, flexibles.

Antennæ filiformes, hinc pectinatæ, præsertim in masculis, thorace paulò longiores. Palpi maxillares longi, porrecti.

Corpus oblongum, subdepressum; molle. Thorax transversus. Elytra magna, molliuscula.

OBSERVATIONS.

Les *driles* tiennent encore aux insectes précédens par leurs rapports ; mais ils semblent offrir une transition des insectes *malacoptères*, ou à élytres molles, à ceux qui ont les élytres dures. Les *driles* ressemblent en effet au *pülin* par leurs antennes, et néanmoins ils appartiennent encore aux *mélyrides*.

ESPÈCE.

1. Drile jaunâtre. *Drilus flavescens*.

Drilus flavescens. Oliv. col. 2. n.º 23. pl. 1. f. 1.

Ptilinus. Geoff. 1. pl. 1. f. 2. Le panache jaune.

Ptilinus flavescens. Fab. él. 1. p. 329.

Panz. fasc. 3. t. 8.

Drilus flavescens. Latr. gen. 1. p. 255.

Habite en France, sur les plantes. Son corps est un peu velu.

LES PTINIENS.

*Antennes filiformes , quelquefois en scie ou pectinées.
Mandibules courtes , fortes , échancrées à leur extrémité ou offrant une dentelure au-dessous. Tête en grande partie enfoncée dans le corselet. Elytres dures , recouvrant entièrement l'abdomen.*

Les *ptiniens* sont de petits coléoptères pentamères à corps dur, destructeurs des bois et des collections d'histoire naturelle. Ils ont le corps ovale, subcylindrique, et, en général, le corselet renflé. Leurs palpes sont courts, avec le dernier article plus gros. Ces insectes habitent, la plupart, l'intérieur des maisons, contrefont le mort lorsqu'on les touche, et ont des couleurs sombres. Voici leurs divisions.

(1) Antennes beaucoup plus courtes que le corps.

(a) Antennes pectinées dans les mâles, en scie dans les femelles.

Ptilin.

(b) Antennes simples, non pectinées, ni en scie.

Vrillette.

(a) Antennes presque aussi longues que le corps, très-peu en scie.
Le corselet plus étroit que l'abdomen.

Ptine.

Gibbie.

PTILIN. (Ptilinus.)

Antennes pectinées dans les mâles, en scie dans les

femelles, un peu plus longues que le corselet. Mandibules bidentées au sommet.

Corps oblong, subcylindrique. Corselet large, subglobuleux. Tête saillante, inclinée.

Antennæ in maribus pectinatæ, in feminis serratæ, thorace paulò longiores. Mandibulæ apice bidentatæ.

Corpus oblongum, subcylindricum. Thorax latus, convexus, subglobosus. Caput prominulum, inflexum.

OBSERVATIONS.

Le *ptilin* est un petit coléoptère très-rapproché des virilletes par ses habitudes, et qui ne ressemble au drile que par ses antennes. La larve de cet insecte vit dans les bois morts, y forme de petits trous ronds et profonds, et n'en sort que dans l'état parfait.

E S P È C E S.

1. *Ptilin pectinicorné. Ptilinus pectinicornis.*

Pt. corpore nigricante; elytris fuscis, subcastaneis; antennis pedibusque rufescentibus.

Ptinus pectinicornis. Lin. *EjUSD. dermestes pectinicornis*

Le panache brun. Geoff. 1. p. 65. n.º 1.

Ptilinus pectinicornis. Fab. él. 1. p. 329.

Oliv. col. 2. n.º 17 bis. pl. 1. f. 1.

Latr. gen. 1. p. 277.

Panz. fasc. 3. t. 7.

Habite en Europe, sur le bois mort.

2. *Ptilin pectiné. Ptilinus pectinatus.*

Pt. niger; antennis pedibusque flavis. F.

Ptilinus pectinatus. Fab. él. 1. p. 329.

Panz. fasc. 6. t. 9.

Habite en Allemagne. Il a les élytres striées,

Etc.

Observ. Ici doit être placé le genre *dorcatoma* de Fabricius (él. 1. p. 330), dont les antennes très-courtes n'ont, selon M. Latreille, que neuf articles. Voyez le *dermestes murinus*. Panz. fasc. 26. t. 10.

VRILLETTE. (Anobium.)

Antennes filiformes, simples, de la longueur du corselet, les trois derniers articles plus longs. Mandibules courtes, dentées au sommet.

Corps oblong, convexe, subcylindrique. Corselet large, transverse, un peu en capuchon. Tête inclinée sous le corselet.

Antennæ filiformes, simplices, thoracis longitudo : articulis tribus ultimis longioribus. Mandibulæ breves, apice dentatæ.

Corpus oblongum, convexum, subcylindricum. Thorax latus, transversus, subcucullatus. Caput inclinatum sub thoracem inflexum.

OBSERVATIONS.

Les *vrillettes* tiennent aux ptilins par leurs habitudes et par plusieurs caractères; mais leurs antennes ne sont ni pectinées, ni en scie. Elles ont le corselet élevé, plus ou moins en capuchon, recevant et cachant en partie la tête. Leurs élytres sont dures, couvrant entièrement l'abdomen. Ces petits coléoptères sont très-nuisibles. Plusieurs espèces vivent dans l'intérieur des maisons. Leurs larves vivent dans les boiseries, les meubles en bois, les poutres, les solives, etc. Elles percent le bois, s'en nourrissent, et y font une infinité de petits trous ronds comme ferait une vrille, qui le rendent vermoulu. C'est à une espèce de

ce genre qu'on attribue ce petit bruit singulier qu'on entend souvent, le soir, dans un appartement; et qui ressemble au bruit d'une montre qui serait de temps en temps interrompu.

ES P È C E S.

1. Vrillette marquée. *Anobium tessellatum*.

A. fuscum; thorace æquali; elytris subtessellatis. F.

Anobium tessellatum. Fab. éleut. 1. p. 321.

Oliv. col. 2. n.º 16. pl. 1. f. 1. Latr. gen. 1. p. 275.

Panz. fasc. 66. t. 3. *Byrrhus*. Geoff. 1. p. 112. n.º 4.

Habite en France, en Allemagne, dans les maisons.

2. Vrillette striée. *Anobium striatum*.

A. fuscum, immaculatum; thorace compresso; elytris striatis.

Anobium striatum. Oliv. col. 2. n.º 16. pl. 2. f. 7.

Latr. gen. 1. p. 276.

La vrillette des tables. Geoff. 1. p. 112. n.º 1. pl. 1. f. 6.

Anobium pertinax. Fab. él. 1. p. 322.

Habite en Europe. Commune dans les maisons: C'est elle, probablement, qui fait ce bruit singulier qu'on entend le soir dans les appartemens.

Etc.

P T I N E. (Ptinus.)

Antennes filiformes, longues, simples, insérées entre les yeux. Palpes subfiliformes.

Corps ovale-oblong; corselet plus étroit que les élytres, renflé, en capuchon, souvent muni d'un étranglement. Un écusson. Abdomen presque ovale.

Antennæ filiformes, longæ, simplices, intra oculos insertæ. Palpi subfiliformes.

Corpus ovato-oblongum. Thorax elytris angustior, surgidulus, cucullatus, sæpè coarctatus. Scutellum. Abdomen subovale.

OBSERVATIONS.

Les *ptines* ont les antennes beaucoup plus longues que celles des *vrillettes*; le corselet plus étroit que les *élytres* et en capuchon. Ils ont la tête petite, le dos convexe, les *élytres* dures, aussi longues que l'abdomen. Ces insectes sont petits, ont la démarche lente, et vivent particulièrement dans les herbiers; les collections d'insectes, les feuilles sèches, la farine, etc. Ils sont une peste dans les cabinets d'histoire naturelle; ils n'épargnent même pas les papiers; les livres.

ESPECES.

1. Ptine impérial. *Ptinus imperialis*.

Pt. fuscus; thorace subcarinato; clytris maculâ lobatâ alba.

Ptinus imperialis. Fab. *él.* 1. p. 326. Panz. fasc. 5. t. 7.

Oliv. col. 2. n.º 17. pl. 1. f. 4.

Habite en Europe, sur le bois mort.

2. Ptine voleur. *Ptinus fur*.

Pt. testaceus; thorace quadridentato; clytris fasciis duabus albis.

Ptinus fur. Lin. Fab. *él.* 1. p. 323.

Oliv. col. 2. n.º 17. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Latr. gen. 1. p. 279. Bruchus. Geoff. 1. pl. 2. f. 6.

Habite en Europe. Il dévaste les herbiers, les collections d'insectes, etc.

GIBBIE. (Gibbium.)

Antennes subsétacées, insérées devant les yeux; à articles cylindriques. Les yeux très-petits, presque aplatis.

Corselet court; abdomen grand, renflé, presque globuleux. Elytres soudées. Point d'écusson distinct.

Antennae subbaccæ, ante oculos insertæ, articulis cylindricis. Oculi parvi, subdepressi.

Thorax brevis; abdomen magnum, turgidum, subglobosum. Elytra connata. Scutellum nullum distinctum.

OBSERVATIONS.

La *Gibbie* est très-voisine des ptines par ses rapports et ses habitudes; mais elle a une forme particulière, n'a point d'ailes, et offre plusieurs caractères qui semblent autoriser sa distinction. Elle attaque aussi les collections d'histoire naturelle.

E S P E C E S.

1. *Gibbie* marron. *Gibbium scotias*.

G. castaneum, nitidum, laeve; antennarum pedibusque pubescentibus.

Gibbium. Scop. Latr. gen. 1. p. 278. t. 8. f. 4.

Bruche sans ailes. Geoff. 1. p. 164. n.º 2.

Ptinus scotias. Oliv. col. 2. n.º 17. pl. 1. f. 2. a. b.

Ptinus scotias. Fab. el. 1. p. 327. Panz. fasc. 5. t. 8.

Habite l'Europe australe, dans les cabinets d'histoire naturelle.

2. *Gibbie* sillonnée. *Gibbium sulcatum*.

G. thorace quadrisulcato villosa; albidum; elytris fusco-testaceis, nitidis.

Ptinus sulcatus. Fab. el. 1. p. 327.

Habite aux Canaries. Trouvée dans l'envoi de plantes sèches.

LES BUPRESTIENS.

Sternum antérieur s'avancant sous la tête, presque sous la bouche, et sa partie postérieure se prolongeant en une pointe, soit aiguë, soit émoussée.

Les *buprestiens* peuvent être aussi nommés *sternoxiens*, parce qu'ils sont distingués des autres *penta-*

ières filicornes par leur *sternum antérieur*, c'est-à-dire, par cette partie de la poitrine qui est située entre la première paire de pattes; cette partie, ici très-remarquable, avançant jusque sous la bouche, et son extrémité opposée se prolongeant en arrière en une pointe bien découverte.

Ces insectes ont des antennes filiformes, le plus souvent en scie ou pectinées, jamais longues, dépassant à peine le corselet par leur longueur. Leur corps est ferme, allongé ou en ellipse oblongue, et leur tête est enfoncée jusqu'aux yeux dans le corselet. Ils ne vivent que de matières végétales, et offrent souvent des couleurs assez brillantes. On ne les divise qu'en très-peu de genres, mais deux de ces genres embrassent chacun un grand nombre d'espèces : voici leurs divisions.

(1) Mandibules entières à leur pointe, sans échancrure ni dent particulière.

(a) Palpes filiformes. Le pénultième article des tarses bilobé.

Buprèste.

Cérophyte.

(b) Palpes à dernier article plus gros. Tous les articles des tarses entiers.

Mélasis.

(2) Mandibules échancrées ou bifides à leur extrémité. Tous les articles des tarses entiers.

Taupin.

BUPRÊSTE. (Buprestis.)

Antennes filiformes, le plus souvent en scie, à peine égale à la longueur du corselet. Mandibules simples; mâ-

choires à deux lobes. Palpes courts, filiformes ou à peine plus gros au bout.

Corps elliptique-oblong. Corselet large, à angles postérieurs non prolongés.

Antennæ filiformes, sæpius serratæ, thorace breviores, aut thoracis vix longitudine. Mandibulæ simplices; maxillæ lobis duobus; palpi breves, filiformes, aut vix apice crassiores.

Corpus elliptico-oblongum. Thorax subtransversus, angulis posticis non extrorsum prominulis.

OBSERVATIONS.

Les *buprestes* constituent un très-beau genre, nombreux en espèces, parmi lesquelles il s'en trouve qui sont ornées de couleurs si riches, si brillantes, qu'elles font partie des plus beaux coléoptères connus. Aussi Geoffroy les a-t-il nommées *richards* en français. C'est surtout parmi les *buprestes* exotiques, que l'on voit les plus grandes et les plus belles espèces.

Ces insectes ont beaucoup de rapports, par leur forme générale, avec les taupins; mais ils n'ont point la faculté de sauter, et ils ont le pénultième article des tarses bilobé. Ils marchent assez lentement; mais leur vol est facile, surtout lorsqu'il fait beau et que le temps est chaud. Leurs élytres sont fermes, et souvent dentées à leur extrémité postérieure. La larve des *buprestes* n'est point connue, mais on présume qu'elle vit dans le bois. L'insecte parfait se rencontre sur les fleurs, sur les feuilles, dans les chantiers, etc.

ESPÈCES.

1. Bupreste géant. *Buprestis gigas*.

B. viridi-ænea, nitida; thorace laevi; elytris rugosis, bi-dentatis.

Buprestis gigas. Lin. *Buprestis gigantea*. Fab. él. 2. p. 187.
Oliv. col. 2. n.º 32. pl. 1. f. 1. a. b.

Habite à Cayenne.

2. Bupreste bande-dorée. *Buprestis vittata*.

B. viridi-cerulea ; *elytris bidentatis punctatis* : *lineis quatuor elevatis viridi-cæneis* ; *vittâ latâ aured.*

Buprestis vittata. Fab. él. 2. p. 187.

Oliv. col. 2. n.º 32. pl. 3. f. 17. a.

Habite aux Indes orientales.

3. Bupreste à faisceaux. *Buprestis fascicularis*.

B. viridi-aurea , *interdum obscura* , *scabra* ; *elytris integris* : *punctis fasciculato-pilosis*.

Buprestis fascicularis. Lin. Fab. él. 2. p. 201.

Oliv. col. 2. n.º 32. pl. 4. f. 38.

Habite le Cap de Bonne-Espérance.

4. Bupreste ocellé. *Buprestis ocellata*.

B. viridi-nitens ; *elytris tridentatis* : *maculis duabus aureis ocellarique flavâ.*

Buprestis ocellata. Fab. él. 2. p. 193.

Oliv. col. 2. n.º 32. pl. 1. f. 3.

Habite les Indes orientales.

Etc.

CÉROPHYTE. (Cerophytum.)

Antennes très-pectinées ou branchues d'un côté dans les mâles, en scie dans les femelles. Mâchoires à deux lobes. Palpes en massue.

Corps ovale, déprimé. Pénultième article des tarses bifide.

Antennæ valdè pectinatæ, vel hinc ramosæ in maribus, in feminis serratæ. Maxillæ lobis duobus. Palpi clavati.

Corpus ovale, depressum. Tarsi articulo penultimo bifido.

OBSERVATIONS.

Le type de ce genre est encore peu connu. C'est un insecte qui, quoique voisin du *mélasis*, en paraît très-distingué.

E S P È C E.

1. Cérrophyte élatéroïde. *Cerophytum elateroides*.

Melasis elateroides. Latr. hist. nat., etc. vol. 9. p. 78.

Cérrophyte. Latr. Considérations gén., etc., p. 169.

Habite aux environs de Paris. Il est noir, strié.

M É L A S I S. (Melasis.)

Antennes pectinées dans les mâles, en scie dans les femelles, de la longueur du corselet. Mandibules entières. Mâchoires simples. Palpes en massue.

Corps cylindrique; corselet un peu écarté de l'abdomen postérieurement: à angles postérieurs prolongés de chaque côté en une dent pointue. Tous les articles des tarses entiers.

Antennæ in maribus pectinatae, in feminis serratae, thoracis longitudine. Mandibulae maxillæque integerrimæ. Palpi clavati.

Corpus cylindricum. Thorax posticè ab abdomine remotiusculus: angulis posticis utroque latere in dentem acutam productis. Tarsorum articuli omnes integri.

OBSERVATIONS.

Les *mélasis* tiennent aux taupins par les angles postérieurs de leur corselet et par leurs tarses à articles entiers;

mais ils ne sautent point. On n'en connaît qu'une espèce.
Elle vit dans le bois mort.

ESPECE.

1. Mélasis flabellicorne. *Melasis flabellicornis*.

Elater buprestoides. Linn.

Melasis flabellicornis. Fab. él. 1. p. 331. Latr. gen. 1. p. 247.

Oliv. col. 2. n.º 30. pl. 1. f. 1.

Panz. fasc. 3. t. 9.

Habite en Europe.

TAUPIN. (Elater.)

Antennes filiformes, en scie, à peine de la longueur du corselet. Mandibules bifides ou bidentées au sommet. Palpes maxillaires subsécouriformes.

Corps allongé, un peu déprimé. Angles postérieurs du corselet pointus, saillans. Pointe postérieure de l'avant-sternum s'enfonçant dans une cavité de la poitrine et servant de ressort pour faire sauter le corps.

Antennæ filiformes, serratæ, thoracis vix longitudine. Mandibulæ apice bifidæ aut bidentatæ. Palpi maxillares subsecuriformes.

Corpus elongatum, depressiusculum. Thoracis anguli posteriores acuti, prominuli. Sterni antici acumen posticale in cavitatem pectoris deprimens corporis saltum edit.

OBSERVATIONS.

Les taupins ont beaucoup de rapports avec les buprestes, et leur ressemblent par leur forme générale; mais ils s'en dis-

tinguent par leurs mandibules , par les angles postérieurs de leur corselet , par leur faculté de sauter lorsqu'on les met sur le dos , et parce que leurs tarses sont à articles entiers. On voit au-dessous de leur tête et sur la partie inférieure de leur corselet, deux rainures, une de chaque côté, dans lesquelles se logent les antennes lorsqu'elles sont abaissées.

Ces insectes constituent un genre fort nombreux en espèces, parmi lesquelles on en connaît qui sont phosphoriques et lumineuses dans l'obscurité. Leurs larves vivent dans les troncs d'arbres pourris, dans les racines des plantes et dans les vieilles souches. D'après celle d'une espèce observée par Degeer, elles sont peut-être pourvues de petites antennes.

ESPECES. .

[Quelques-unes des exotiques.]

1. Taupin flabelllicorne. *Elater flabellicornis*.
E. fuscus ; *antennarum fasciculo flabelliformi*. F.
Elater flabelliformis. Lin. Fab. él. 2. p. 221.
Oliv. col. 2. n.º 31. pl. 3. f. 28.
Habite aux Indes orientales.
2. Taupin tacheté. *Elater speciosus*.
E. albidus , *nigro-maculatus*.
Elater speciosus. Fab. él. 2. p. 222.
Oliv. col. 2. n.º 31. pl. 7. f. 70.
Habite aux Indes orientales.
3. Taupin lumineux. *Elater noctilucus*.
E. thoracis lateribus maculâ flavâ glabrâ. F.
Elater noctilucus. Lin. Fab. él. 2. p. 223.
Oliv. col. 2. n.º 31. pl. 2. f. 14.
Habite l'Amérique méridionale , les Antilles.
4. Taupin phosphorique. *Elater phosphoreus*.
E. thorace posticè maculis duabus glâbris flavis. F.
Elater phosphoreus. Lin. Fab. él. 2. p. 223.

Oliv. col. 2. n.° 31. pl. 2. f. 20. et f. 14. b.

Habite à Cayenne, Surinam.

Etc. Parmi les espèces indigènes de l'Europe, voyez dans Fabricius les *E. ferrugineus*, *ruficollis*, *castaneus*, *aterimus*, *murinus*, *tessellatus*, *marginatus*, etc.

LES STAPHYLINIENS.

Antennes filiformes ou moniliformes, souvent subperfoliées, grossissant quelquefois vers le bout. Mandibules fortes, arquées, aiguës. Corps allongé, étroit. Élytres très-courtes, laissant, en général, une grande partie du dos de l'abdomen à nu.

Les *staphyliniens* sont assurément très-reconnaissables par les caractères que je viens de citer et surtout par leur corps allongé et leurs élytres courtes, qui laissent à nu une grande partie du dos de l'abdomen. Les hanches et deux paires antérieures de ces insectes sont grandes; deux vésicules coniques pointues, que l'animal fait sortir et rentrer à son gré, sont situées près de l'anus à l'extrémité de l'abdomen qui se termine en pointe.

Ces insectes courent avec agilité et volent facilement. Lorsqu'on les touche, ils relèvent leur queue ou la partie postérieure de leur abdomen, comme s'ils voulaient piquer et se défendre. Ils fréquentent les lieux où se trouvent des matières en putréfaction, soit végétales ou animales. On les rencontre souvent par terre, dans les fumiers, autour des excréments, sous les pierres. On les trouve aussi dans les lieux humides, les plaies des arbres, et sous leurs écorces.

Linné en avait formé un seul genre sous le nom de *aphyllinus*; on le partagea ensuite en trois genres par-

ticuliers, et dès lors ces insectes furent considérés comme formant une famille.

Les entomologistes, reconnaissant, avec raison, que les staphyliniens constituaient une famille naturelle, qu'il fallait partager en plusieurs genres, portèrent peut-être trop loin leur art des distinctions; car ils formèrent, aux dépens du genre *staphylinus* de Linné, un grand nombre de genres particuliers auxquels il serait difficile de trouver l'importance qui convient à des distinctions génériques. C'est-là, toujours, que se trouve le danger de l'abus.

Quant au nombre des genres, m'efforçant de les réduire à celui qui me paraît indispensable, et employant toujours les observations intéressantes qu'on doit à M. Latreille, je divise les staphyliniens de la manière suivante.

Ceux qui voudront faire une étude particulière de cette famille, pourront recourir à la monographie des *microptères* qu'a publiée M. Gravenhorst, en 2 vol. in-8.º

DIVISION DES STAPHYLINIENS.

(1) Tête découverte, entièrement séparée du corselet par un cou ou par un étranglement.


(a) Labre divisé profondément en deux lobes,

(-+) Tous les palpes filiformes.

Staphylin.

(+-+) Les quatre palpes terminés par un article plus grand; ou seulement les labiaux.

Oxypore.



SANS VERTÈBRES.

481

(b) Labre entier.

(→) Palpes maxillaires presque aussi longs que la tête.

Pédère.

a (←→) Palpes maxillaires beaucoup plus courts que la tête.

(*) Antennes insérées devant les yeux sous un rebord.

Oxytèle.

(**) Antennes insérées à nu entre les yeux ou près de leur bord interne.

Aléochare.

(a) Tête enfoncée postérieurement dans le corselet jusques auprès des yeux.

Lométhuse.

Tachine.

STAPHYLIN. (Staphylinus.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet, insérées entre les yeux ou devant les yeux. Labre bilobé. Palpes filiformes.

Tête entièrement saillante. Corps allongé, étroit. Elytres très-courtes.

Antennæ filiformes, submoniliformes, thoracis longitudine, intra oculos, vel ante oculos insertæ. Labrum bilobum. Palpi filiformes.

Caput penitus exsertum. Corpus elongatum, angustum. Elytra abbreviata.

OBSERVATIONS.

Les *staphylins* sont faciles à reconnaître, ayant la tête tout-à-fait dégagée du corselet, le labre bilobé, et les quatre palpes filiformes. C'est par le caractère de leurs palpes qu'on les distingue de nos oxypores. Ces insectes sont carnassiers, se nourrissent des autres insectes qu'ils peuvent

attraper, ou vivent autour des cadavres et des fumiers. Ils ne piquent point, mais ils mordent ou pincent avec leurs mandibules. Je réunis à ce genre les pinophiles et les lathrobies, quoique ceux-ci aient les antennes insérées devant les yeux.

ESPÈCES.

1. Staphylin bourdon. *Staphylinus hirtus*.

St. hirsutus, niger; thorace abdomineque postice flavis.

Staphylinus hirtus. Lin. Fab. él. 2. p. 589.

Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 1. f. 6.

Latr. gen. 1. p. 286. Panz. fasc. 4. t. 19.

Habite en Europe, autour des cadavres.

2. Staphylin odorant. *Staphylinus olens*.

St. niger, opacus; immaculatus, capite thorace latiore.

Staphylinus olens. Fab. él. 2. p. 591.

Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 1. f. 6. Panz. fasc. 4. t. 19.

Habite en Europe, autour des cadavres. Commun près de Paris.

3. Staphylin érythroptère. *Staphylinus erythropterus*.

St. ater; elytris antennarum basi pedibusque rubris.

Staphylinus erythropterus. Lin. Fab. él. 2. p. 593.


Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 2. f. 14. Panz. fasc. 27. t. 4.

Habite en Europe, dans les fumiers.

Etc. Ajoutez-y les *St. murinus, aureus, aeneus, haemorrhoidalis, oculatus, erythrocephalus, similis, cyaneus, pubescens, cupreus, stercorarius, brunnipes, fulgidus, elegans, pilosus, politus, amoenus*, d'Olivier; et pour la lathrobie, voyez *St. elongatus* de Fabricius (*poderus*, Panz. fasc. 9. t. 12.)

OXYPORE. (Oxyporus.)

Antennes courtes, épaisses, moniliformes, perforliées. Labre bilobé. Palpes labiaux terminés par un article plus grand, sécuriforme.



SANS VERTÈBRES.

483

Tête saillante; Corps allongé. Elytres très-courtes.
*Antennae breves, crassiusculae, moliformes, per-
 liatae. Labrum bilobum. Palpi labiales articulo ul-
 mo majore, securiformi.*
*Caput exsertum. Corpus elongatum. Elytra abbrevi-
 ata.*

OBSERVATIONS.

Les oxypores, dont il s'agit ici, sont ceux de M. La-
 me, auxquels je réunis soit astrapées, quoiqu'elle ait
 quatre palpes terminées par un article plus grand, et les
 autres plus grêles. Ainsi les staphylinus ont les quatre
 lpes filiformes; et mes oxypores ont au moins deux
 lpes terminées par un article plus grand, ce qui peut suf-
 e pour les séparer. En général, leurs mandibules sont
 andes, avancées.

ESPECES

[Celles qui ont les palpes maxillaires filiformes.]

Oxypore roux. *Oxyporus rufus*.

O. rufus; capite elytrorum abdominisque postico nigris.

Staphylinus rufus. Lin. Oxyporus rufus. Fab. el. 3. p. 604.

Oliv. col. 3. n.º 43. pl. 1. f. 1. Panz. fasc. 16. t. 19.

Latr. gen. 1. p. 284.

Habite en Europe, dans les bolets, les agarics.

Oxypore grandes-dents. *Oxyporus maxillosus*.

*O. ater; elytris pallidis: angulo postico nigro; abdomina-
 ribus f. albo fuscis.*

Oxyporus maxillosus. Fab. el. 3. p. 605.

Reun. fasc. 16. t. 19.

Habite en Allemagne.

[Les quatre palpes à dernier article plus grand.]

Oxypore de l'orme. *Oxyporus ulmi*.

*O. ater, nitidus; antennarum articulo primo, elytris ab-
 dominisque segmento penultimo rufis.*

Staphylæus ulmi. Ross. f. utr. 1. t. 5. f. 6.

Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 4. f. 37.

Staphylinus ulmæus. Fab. él. 2. p. 595.

Fanz. fasc. 86. t. 4.

Astraperus ulmi. Latr. gen. 1. p. 284.

Habite l'Italie, la France australe, sous l'écorce de l'orme!

P É D È R E. (Pæderus.)

Antennes moniliformes, grossissant insensiblement, ou se terminant en une massue de deux ou trois articles. Labre entier. Palpes maxillaires presque aussi longs que la tête.

Tête saillante. Corps allongé, étroit. Elytres très-courtes.

Antennæ moniliformes, extrorsum sensim crassiores, vel in clavam bi seu triarticulatam terminatæ. Labrum integrum. Palpi maxillares longi, capitis fere longitudine.

Caput exsertum. Corpus elongatum, angustum. Elytra abbreviata.

OBSERVATIONS.

Les *pédères* sont bien distingués des staphylins et des oxyptores par leur labre entier. Dans les *pédères* de Fabricius de M. Latreille, les antennes sont insérées devant les yeux et vont seulement en grossissant; dans les stènes, les antennes s'insèrent près du bord interne des yeux et sont terminées en massue. L'insertion des antennes n'est point en accord avec la forme en massue de ces parties, puisque dans l'évoasthète de Gravenhorst, les antennes en massue, sont insérées devant les yeux.

Nos *pédères*, distingués par la tête saillante entièrement,

le labre entier, et les palpes maxillaires presque aussi longs que la tête, sont des insectes qui aiment les lieux humides, et qui vivent effectivement sur le bord des eaux.

ESPECES.

[*Celles dont les antennes sont insérées devant les yeux.*]

1. Pédère des rivages. *Pæderus riparius*.

P. rufus; *elytris cæruleis*; *capite abdominisque apice nigris*.

Staphylinus riparius. Lin. Geoff. 1. p. 369. n.º 21.

Pæderus riparius. Fab. el. 2. p. 608.

Oliv. col. 3. n.º 44. pl. 1. f. 2. Panz. fasc. 9. t. 11.

Habite en Europe, près des eaux.

2. Pédère ruficolle. *Pæderus ruficollis*.

P. niger; *thorace rufo*, *elytris cyanæis*.

Pæderus ruficollis. Fab. el. 2. p. 608. Panz. fasc. 27. t. 20.

Oliv. col. 3. n.º 44. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Staphylinus. Geoff. 1. p. 370. n.º 23.

Habite en Europe, près des eaux.

[*Celles dont les antennes s'insèrent près du bord interne des yeux.*]

3. Pédère à deux points. *Pæderus biguttatus*.

P. niger; *elytris punctis albido*; *oculis prominentis*.

Staphylinus biguttatus. Lin. Geoff. 1. p. 371. n.º 24. Panz. fasc. 11. t. 17.

Stenus biguttatus. Fab. el. 2. p. 602. Latr. gen. 1. p. 294.

Pæderus biguttatus. Oliv. 3. n.º 44. pl. 1. f. 3. a. b.

Habite en Europe, sur le bord des eaux.

Est. Veyen *stenus junco* de Fabricius.

OXYTELE. (*Oxytelus*.)

Antennes filiformes, insérées devant les yeux sous un rebord, grossissant quelquefois vers leur extrémité. La-

labre entier. Palpes subulées ou filiformes : les maxillaires beaucoup plus courts que la tête.

Tête saillante. Corps allongé, déprimé. Elytres raccourcies. Pattes antérieures à jambes souvent épineuses.

Antennæ filiformes, ante oculos sub margine prominulo insertæ, versùs extremitatem interdum crassescentes. Labrum integrum. Palpi subulati aut filiformes & maxillaribus capite multò brevioribus.

Caput penitus detectum. Corpus oblongum aut elongatum, depressum. Elytra abbreviata. Pedes antici sæpè spinosi.

OBSERVATIONS.

Sous le nom d'*Oxytèle*, je réduis les oxytèles, les omalies, les protéines et les lestèves de M. Latreille; ces insectes ayant tous, selon ce savant, les antennes insérées sous un rebord devant les yeux. Leur tête est découverte, et leur labre est comme dans les pédécres; mais leurs palpes maxillaires, beaucoup plus courts que la tête, les en distinguent.

ESPECES.

1. Oxytèle jayet. *Oxytelus piceus*.

O. niger; thorace trisulcato, pedibus pallidis, testaceis.

Oliv. Staphylinus piceus. Lin. Fab. el. 2. p. 691. Pans. fasc. 27.

Oxytelus piceus. Oliv. Encycl. no. 1.

Habite en Europe, dans les fientes des animaux.

2. Oxytèle tricorne. *Oxytelus tricornis*.

O. niger; capite bicorni, thoracis cornu porrecto acuto; elytris rufis. Oliv.

Oxytelus tricornis. Oliv. Encycl. no. 13.

Staphylinus tricornis ejusd. col. 3. no. 42. pl. 6. f. 56.

Staphylinus armatus. Pans. fasc. 66. t. 17.

Habite en Europe, sous les pierres.

3. Oxytèle rivulaire. *Oxytelus rivularis*.

O. niger, nitidus; elytris fuscis; thorace sulcato.

Omalium rivulare. Grav. Lat. gen. 1. p. 298. Oliv. Encycl.

Staphylinus rivularis. Oliv. col. 3. n.° 42. pl. 3. f. 27.

Panz. fasc. 27. t. 13.

Habite en Europe.

Etc. Voyez *proteinus*, Lat. gen. 1. p. 298, et *lestova*, gen.

1. p. 297.

ALÉOCHARE. (*Aleochara*.)

Antennes moniliformes, subperfoliées, insérées entre les yeux, à insertion découverte. Labre entier. Palpes terminés en alène : les maxillaires plus courts que la tête.

Tête saillante. Corps allongé. Elytres très-courtes. Point de jambes épineuses.

Antennae moniliformes, subperfoliatae, intra oculos insertae : insertione detecta. Labrum integrum. Palpi apice subulati : maxillaribus capite brevioribus.

Caput exsertum. Corpus elongatum. Elytra perbrevia. Pedes tibiis spinosis nullis.

OBSERVATIONS.

Les aléochares tiennent de très-près à notre genre oxytèle ; mais leurs antennes ne s'insèrent point sous un rebord ; leur insertion se fait à nu, entre les yeux. Leur corselet est en carré arrondi aux angles. Ces insectes sont fort agiles ; leurs espèces connues sont assez nombreuses.

ESPÈCES.

1. Aléochare cannelé. *Aleochara canaliculata*.

A. flava; capite abdominisque cingulo atris; thorace canaliculato.

Staphylinus canaliculatus. Fab. Gl. 2. p. 599.

Panz. fasc. 27. t. 10. Oliv. col. 3. n.º 42. t. 3. f. 32.

Aleochara canaliculata. Grav. Lat. ges. 1. p. 302.

Habite en Europe, sous les pierres.

2. Aléochare du bolet. *Aleochara boleti*.

A. fusco-nigra ; *elytris pedibusque pallidioribus*.

Staphylinus boleti. Lin. f. succ. Gmel. 3. p. 2031.

An staphylinus socialis? Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 3. f. 25
a b.

Habite en Europe, dans les bolets, les agarics.

Etc.

LOMÉCHUSE. (Lomechusa.)

Antennes à peine de la longueur du corselet, se terminant en massue perfoliée, oblongue ou en fuseau. Mandibules simples, pointues, arquées à leur pointe. Palpes terminés en alène.

Tête étroite, enfoncée postérieurement dans le corselet. Corps oblong, subelliptique. Point de jambes épineuses.

Antennæ vix thoracis longitudine, in clavam perfoliatam oblongam subfusiformem terminatæ. Mandibulæ simplices, acutæ : acumine arcuato. Palpi apice subulati.

Caput angustum, in thoracem posticè intrusum. Corpus oblongum, subellipticum. Pedes tibiis non spinosis.

OBSERVATIONS.

Les loméchuses seraient des aléochares si leur tête était entièrement découverte ; mais elle est enfoncée jusque près des yeux dans le corselet. Ce corselet va ordinairement en se rétrécissant d'arrière en avant. Les élytres sont raccourcies.

ESPECES.

1. Loméchuse bipoctnée. *Lomechusa bipunctata*.

L. nigra; *elytris maculâ posticâ rufo-sanguineâ*; *thorace convexo*.

Aleochara bipunctata. Latr. gen. 1. p. 361.

Staphylinus bipunctatus? Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 5. f. 44. a, b.

Habite aux environs de Paris, dans les fientes des animaux.

2. Loméchuse paradoxale. *Lomechusa paradoxa*.

L. depressa, brunnea; *elytris pallidioribus*; *thoracis marginis reflexo*.

Staphylinus emarginatus. Fab. el. 2. p. 600.

Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 2. f. 12. a. b. c. d.

Habite aux environs de Paris, sous les pierres.

TACHINE. (Tachinus.)

Antennes submoniliformes, grossissant vers leur sommet, insérées devant les yeux. Mandibules simples. Palpes, soit filiformes, soit terminés en alène.

Tête enfoncée postérieurement dans le corselet. Corps oblong. Elytres raccourcies, mais un peu grandes. Jambes épineuses.

Antennæ submoniliformes, versus apicem crassiores, antè oculos insertæ. Mandibulæ simplices. Palpi vel filiformes, vel apice subulati.

Caput in thoracem posticè intrusum. Corpus oblongum. Elytra abbreviata, majuscula. Pedes tibis spinosis.

OBSERVATIONS.

Les tachines, auxquelles nous réunissons les tachypores, ont les antennes plus écartées à leur insertion que les lo-

inéchusea, et moins en masse. Elles s'en distinguent d'ailleurs par leurs jambes épineuses, et par leurs élytres qui, quoique raccourcis, recouvrent souvent la moitié de l'abdomen, quelquefois un peu plus. Dans les tachines de Gravenhorst, les palpes sont filiformes; ils sont terminés en alène dans ses tachypores.

ESPECES.

1. Tachine rufipède. *Tachinus rufipes*.

T. ater, nitidus; pedibus rufis.

Oxyporus rufipes. Fab. él. 2. p. 607.

Staphylinus rufipes. Oliv. col. 3. n.º 42. pl. 4. f. 35. a. b. c. d.

Staphylinus. Geoff. 1. p. 367. p.º 15.

Tachinus rufipes. Grav. Latr. gen. 1. p. 299. (*Nunc oxyporus*.)

Habite en Europe, dans les excréments des bœufs.

2. Tachine bipustulée. *Tachinus bipustulatus*.

T. ater, nitidus; elytris maculâ baseos anoque rufis.

Oxyporus bipustulatus. Fab. él. 2. p. 606.

Panz. fasc. 16. t. 21.

Habite en France, en Allemagne, etc.

3. Tachine marginée. *Tachinus marginatus*.

T. ater, nitidus; thoracis marginis pedibus elytrisque rufis: his sutura maculâque marginali nigris.

Oxyporus marginatus. Fab. él. 2. p. 605.

Panz. fasc. 27. t. 17.

Habite en Allemagne.

Etc.

LES CARABIENS.

Six palpes articulés : quatre maxillaires et deux labiaux.

Aucune famille, dans les coléoptères, n'est plus éminemment caractérisée que celle des carabiens, puisque

ces insectes ont tous six palpes, et qu'ils sont les seuls coléoptères qui soient dans ce cas.

Ils ont, en effet, deux palpes sur la lèvre inférieure, et quatre palpes maxillaires, c'est-à-dire deux sur chaque mâchoire : l'un externe, plus grand, quadriarticulé; et l'autre interne, plus petit, n'ayant que deux articles. Tous les autres coléoptères n'ont à la bouche que quatre palpes. Tous les *carabiens* sont carnassiers, soit dans l'état de larve, soit dans celui d'insecte parfait. Ils courent, en général, avec beaucoup de célérité; parmi eux, les uns sont ailés et volent facilement, tandis que les autres sont aptères.

Les antennes de ces insectes sont filiformes et presque toujours simples. Leur lèvre inférieure est reçue dans une échancrure du menton. Les deux paires antérieures sont rapprochées à leur origine, insérées sur les côtés d'un sternum comprimé, et portées sur une grande rostre. Les deux postérieures ont un grand trochanter à leur naissance.

Comme cette famille est très-diversifiée, très-nombreuse en espèces, on a dû la diviser en plusieurs genres pour en faciliter l'étude; et, probablement, vingt-huit à trente genres pourront amplement suffire pour la faire connaître, lorsque l'on aura des moyens convenables de les établir. Mais les entomologistes, croyant devoir employer à des coupes génériques, toutes les distinctions qu'ils ont pu saisir, en ont déjà présenté un nombre si considérable, que l'étude des carabiens n'est maintenant praticable qu'à très-peu de personnes.

Tel est, comme je l'ai dit en parlant des staphyliniens, le danger de l'abus, même des meilleures choses. Et ici l'abus naît de ce qu'on oublie de considérer que,

dans toute famille quelconque, la nature exécute toujours une diversité croissante parmi les races, qui n'a guère de terme qu'à l'espèce même. Jusqu'à elle, des distinctions peuvent donc être possibles, si l'on descend jusqu'aux plus petites particularités de détail qu'on peut apercevoir.

C'est une erreur de croire que toutes les espèces d'un genre doivent se ressembler dans toutes les particularités dont je viens de parler. Je réponds, d'après mon expérience dans l'étude des productions de la nature, que cela est impossible; et que toutes les fois que deux insectes ne seront pas deux individus de la même espèce, on trouvera presque toujours en eux des différences dans les objets de détail en question.

Obligé de suivre, à l'égard des carabiens, comme à celui des autres familles d'insectes, les principaux caractères indiqués par les entomologistes et surtout ceux de M. Latreille, je crois avoir donné une extension suffisante au nombre des genres à admettre, en divisant cette grande famille de la manière suivante.

DIVISION DES CARABIENS.

§. *Point de pattes en nageoires : toutes sont propres à la course.* [Carabiens coureurs.]

(1) *Mâchoires ayant à leur sommet un englet qui s'articule avec elles.*

(a) *Corselet presque aussi large que long. Tous les articles des tarses entiers.*

Manticore.

Cicindèle.

- (b) Corcelet étroit, allongé. Le pénultième article des tarses bilobé.

Colliure.

- (a) Mâchoires terminées en pointe ou en crochet, sans articulation à leur sommet.

- (a) Palpes extérieures (les maxillaires externes et les labiaux) non subulés ni aciculés à leur extrémité, mais terminés par un article de la grosseur du précédent ou plus gros, plus dilaté.

- (c) Une forte échancrure au côté intérieur des deux premières jambes.

- Les élytres tronquées ou très-obtuses au bout.

- (-+) Languette de la lèvre inférieure entière.

Anthie.

Graphiptère.

Brachine.

Lébie.

- (-+-) Languette de la lèvre subtrilobée, ayant, de chaque côté, une division en forme d'oreillette.

- ☐ Corcelet en forme de cœur. Un cou.

Zuphie.

- ☐ ☐ Corcelet subcylindrique. Point de cou.

Drypte.

- Elytres non tronquées à leur extrémité. Point de suture à la base de la lèvre inférieure.

Siagone.

- (-+) Lèvre inférieure articulée à sa base, et sa languette presque toujours trilobée.

- ☐ Jambes antérieures dentées au côté externe ou terminées par deux longues épines.

Scarite.

Clivine.

- ☐ ☐ Jambes antérieures non dentées au côté externe mais terminées par deux épines courtes ou moyennes.

- (y) Point de nez. (z) Mandibules se terminant en pointe. (a) Mandibules tronquées ou très-obtuses.

Morion.

- (z) Mandibules tronquées ou très-obtuses.

Licéne.

- (y) Un cou distinct.

Ranagée.

- (a) Point d'articulation notable au côté interne des deux jambes inférieures.

Loricère.

- * Labre divisé en deux ou trois lobes.

Cyclare.

Carabes.

- ** Labre entier ou faiblement fimbrié.

- (-+) Antennes filiformes et cylindriques, longs et articulés. Les mâchoires ciliées ou barbuées au côté extérieur.

Nébie.

Pogonophore.

Omophron.

- (-+) Antennes grossissant un peu vers le bout, à articles courts, obconiques. Les mâchoires non ciliées au côté extérieur.

Elaphe.

- (aa) Palpes entières dont deux au moins sont ciliées en alène, ou aciculées à leur extrémité.

Bembidion.

- §§. Pattes postérieures en nageoires : elles sont comprimées et ciliées. [Carabiens nageurs.]

Dytique.

Notère.

Haliple.

MANTICORE. (Manticora.)

Antennes filiformes, à articles subcylindriques. Mandibules grandes, saillantes, dentées inférieurement au côté interne

Tête grande; corps oblong; corselet divisé en deux segmens inégaux. Abdomen presque en cœur. Elytres aptères, carénées sur les côtés, embrassant l'abdomen.

Antennæ filiformes; articulis subcylindricis. Mandibulæ magnæ, exsertæ, infernè latere interno dentatæ.

Caput magnum; corpus oblongum, depressum; thorax segmentis duobus inæqualibus. Elytra aptera, lateribus carinata; abdomenque obvolvenda. Abdomen subcordatum.

OBSERVATIONS.

La *manticore* tient aux cicindèles par l'onglet qui s'articule à l'extrémité de ses mâchoires. Sa bouche est armée de deux grandes mandibules très-saillantes, arquées et aiguës. Ses mâchoires sont ciliées au côté interne. Tous les articles de ses tarses sont entiers.

E. S. P. È C E S.

1. Manticore maxillaire. *Manticora maxillosa*.

M. atra; elytris connatis scabris. F.

Manticora maxillosa. Fab. él. 1. p. 167.

Oliv. col. 3. n.º 37. pl. 1. f. 1. Latr. gen. V. p. 173.

Habite au Cap de Bonne-Espérance. Grande, noire. Pattes très-longues.

2. Manticore pâle. *Manticora pallida*.*M. laevis*, *pallida*; *mandibulis basi bidentatis*. F.*Manticora pallida*. Fab. é. 1. p. 187.

Habite au Cap de Bonne-Espérance. Il est moins grand que celui qui précède.

CICINDELE. (Cicindela.)

Antennes filiformes , plus longues que le corselet. Mandibules saillantes , dentées. Palpes filiformes , velus.

Tête large ; les yeux globuleux , saillans sur les côtés. Corselet court , subcylindrique , non bordé. Elytres recouvrant des ailes.

Antennæ filiformes, *thorace longiores*. *Mandibulae exsertæ*, *dentatæ*. *Palpi filiformes*, *pilosi*.

Caput thorax latius ; *oculis globosis*, *ad latera prominulis*. *Thorax brevis*, *subcylindricus*, *non marginatus*. *Elytra alas obtegentia*.

OBSERVATIONS.

Les *cicindèles*, par l'onglet qui s'articule à l'extrémité de leurs mâchoires, sont très-distinguées des élaphres et des autres carabiens, sauf les manticores et les colliures qui s'en rapprochent par le même caractère. Ce sont des coléoptères carnassiers, voraces, très-agiles. Ils sont pourvus d'ailes, et presque tous sont ornés de couleurs assez belles, variées selon les espèces. Les tarses sont à articles entiers.

Les larves des cicindèles vivent dans la terre ou dans le sable, se tenant dans des trous qu'elles se sont pratiqués. En embuscade, à l'embouchure de ces trous, elles saisissent les autres insectes qui passent auprès, les entraînent et les

précipitent dans leur retraite, et les y dévorent. C'est dans les lieux secs, arides et sablonneux, principalement dans les temps chauds, que l'on trouve ces insectes.

ESPECES.

1. Cicindèle champêtre. *Cicindela campestris*.

C. viridis; *elytris punctis quinque albis*.

Cicindela campestris. Linn. Fab. é. 1. p. 233. Panz. fasc. 85. t. 3.

Oliv. col. 2. n.º 33. pl. 1. f. a. b. c. Latr. gen. 1. p. 176.

Buprestis. Geoff. 1. p. 153. n.º 27.

Habite en Europe. Commune aux environs de Paris.

2. Cicindèle hybride. *Cicindela hybrida*.

C. subpurpurascens; *elytris fasciâ lunulisque duabus albis*; *corpore aureo nitido*.

Cicindela hybrida. Lin. Fab. é. 1. p. 234.

Oliv. col. 2. n.º 33. pl. 1. f. 7. Panz. fasc. 85. t. 4.

Buprestis. Geoff. 1. p. 155. n.º 28.

Habite en Europe. Commune près Paris.

Etc. Obs. Dans le *cicindela megalocéphala*, les palpes labiaux sont plus longs que les maxillaires extérieurs.

COLLIURE. (Colliuris.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet. Chaperon avancé, voûté, arrondi au sommet.

Corps allongé, étroit. Corselet long, plus étroit que les élytres, colliforme, atténué en avant. Pénultième article des tarses bilobé.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine. Clypeus porrectus, fornicatus, apice rotundatus.

Corpus elongatum, angustum. Thorax longus, elytris angustior, colliformis, cylindricus, anticè attenuatus. Tarsi articulo penultimo bilobo.

OBSERVATIONS.

Les *colliures* se distinguent aisément des *cicindèles* par leur corselet allongé en forme de cou et par leurs tarses. Ce sont des insectes exotiques, dont on ne connaît point les habitudes.

ESPÈCES.

1. Colliure longicolle. *Colliuris longicollis*.

C. cyanea; *femoribus ferrugineis*; *elytris punctatis*, *apice emarginatis*.

Colliuris longicollis. Latr. gen. 1. p. 174.

Cicindela longicollis. Oliv. col. 2. n.º 33. pl. 2. f. 17.

Collyris longicollis. Fab. él. 1. p. 226.

Habite aux Indes orientales.

2. Colliure aptère. *Colliuris aptera*.

C. atra; *femoribus ferrugineis*, *connatis*, *in medio rugosis*.

Collyris aptera. Fab. él. 1. p. 226.

Habite dans l'Inde.

3. Colliure connée. *Colliuris connata*.

C. aptera, *atra*, *immaculata*.

Cicindela aptera. Oliv. col. 2. n.º 33, pl. 1. f. 1.

Habite aux Indes orientales.

ANTHIE. (*Anthia*.)

Antennes filiformes, plus courtes que le corps. Mandibules non dentées. Lèvre inférieure tout-à-fait cornée, entière, saillante en languette ovale.

Corps allongé; corselet presque en cœur, rétréci postérieurement. Abdomen ovale, convexe. Elytres aptères dans presque tous.

Antennæ filiformes, *corpore breviores*. *Mandibula*

*aplices. Labium penitus corneum, integrum, in
lam ovalem productum.*

*Corpus oblongum; thorax obcordatus, posticè at-
tuatus. Abdomen ovale, convexum. Elytra sæpius
tera,*

OBSERVATIONS.

Les *anthies* sont des carabiens exotiques, tous ou pres-
que tous aptères, la plupart noirâtres et souvent parsemés
quelques taches blanchâtres, pubescentes. Elles tiennent
très-près aux graphiptères, dont elles diffèrent princi-
alement parce que la languette de leur lèvre inférieure est
à-peu-près cornée. Par cette languette, qui est entière et très-
incisée entre les palpes, elles diffèrent de la plupart des
autres carabiens. Leurs jambes antérieures sont échancrées
côté interne.

ESPECES.

Anthie à six taches. *Anthia sexguttata.*

*A. nigra; thorace bimaculato; elytris lævibus: maculis
duabus villosis-albidis.*

Carabus sexguttatus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 1. f. 6.

Anthia sexguttata Fab. él. 1. p. 221.

Latr. gen. 1. p. 185.

Habite aux Indes orientales. Grand et bel insecte.

Anthie à dix taches. *Anthia decemguttata.*

A. atra; elytris novem-sulcatis punctisque decem albis.

Carabus decemguttatus. Lin.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 2. f. 15. a, et pl. 9. f. 15. c.

Anthia decemguttata Fab. él. 1. p. 221.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

Anthie maxillaire. *Anthia maxillosa.*

*A. atra; mandibulis exsertis, longitudine capitis; thorace
posticè producto bilobo.*

Anthia maxillosa. Fab. él. 1. p. 220.

Carabus maxillosus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 1. f. 10. et pl. 8.
f. 90.

Habite au Cap de Bonne-Espérance. Grand insecte tout noir.
Etc. Ajoutez *a. thoracica*, *a. venator*, *a. sulcata*, *a. nimbros*,
a. 4-guttata, *a. labida* de Fabricius et d'Oliv.

GRAPHIPTÈRE. (Graphipterus.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet. Mandibules simples. Lèvre inférieure entière, à languette saillante, presque carrée, membraneuse sur les côtés.

Corps oblong; corselet presque en cœur. Abdomen presque orbiculaire, aplati.

Antennæ filiformes, thorace longiores. Mandibule simplices. Labium integrum, subquadratum, productum, medio coriaceum: lateribus membranaceis.

Corpus oblongum. Thorax obcordatus. Abdomen suborbiculare, depressum.

OBSERVATIONS.

Les *graphiptères* sont très-voisins des anthies par leurs rapports, et tous, ou presque tous, sont pareillement aptères. Mais, outre que ces insectes sont plus petits, plus aplatis et moins allongés que les anthies, la languette de leur lèvre inférieure n'est cornée ou coriace que dans sa partie moyenne.

ESPECES.

1. Graphiptère moncheté. *Graphipterus multiguttatus*.
G. ater, apterus; elytris planis: margins sinuato punctis que disci albis.
Graphipterus multiguttatus. Latr. gen. 1. p. 186.
Carabus multiguttatus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 6. f. 66.
Anthia variegata. Fab. el. 1. p. 223. Var ?
Habite en Egypte.

2. Graphiptère triliné. *Graphipterus trilineatus*.

G. ater, *apterus*; *thoracis marginibus albis*; *elytris albidis*: *suturâ linedque nigris*.

Carabus trilineatus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 9. f. 101.

Graphipterus trilineatus. Latr. gen. 1. p. 187.

Anthia trilineata. Fab. él. 1. p. 223.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

Etc. Ajoutez *a. exclamatoris* de Fab., et *a. obsoleta* du même.

(*carabus obsoletus*. Oliv. pl. 5. f. 60).

BRACHINE. (Brachinus.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet. Lèvre inférieure entière, avancée, presque carrée : les deux angles de son sommet un peu en pointe.

Corps oblong ; corselet presque en cœur. Abdomen épais, ovoïde ou en carré long. Des glandes à l'anus, lançant une vapeur détonnante et caustique lorsqu'on touche l'animal.

Antennæ filiformes, *thorace longiores*. *Labium integrum, productum, subquadratum*: *angulis apicis subacutis*.

Corpus oblongum; *thorax subcordatus*. *Abdomen crassum, obovatum aut elongato quadratum*. *Glandulæ ad anum, tactu crepitantes, vaporem urentem emittentes*.

OBSERVATIONS.

Les *brachines*, ainsi que les *lébies*, ont la languette de la lèvre inférieure entière et avancée entre les palpes labiaux ; comme dans les *graphiptères*. Cette languette est un peu anguleuse au sommet dans les *brachines*, et elle est à sommet plus arrondi dans les *lébies*. Au reste, les *brachines* sont très-singulières par la faculté qu'elles ont de lan-

cer une vapeur détonnante lorsqu'on les touche ou qu'elles se trouvent dans quelque danger; faculté que les lébies ne possèdent point.

ESPECES.

1. Brachine pétard. *Brachinus crepitans*.

B. capite, thorace pedibusque ferrugineis; elytris nigris.

Carabus crepitans. Lin. Bupreste. Geoff. 1. p. 151. n.º 19.

Brachinus crepitans. Fab. él. 1. p. 221.

Panz. fasc. 30. t. 5.

Habite en Europe; se trouve aux environs de Paris.

2. Brachine pistolet. *Brachinus scolpeta*.

B. ferrugineus; elytris cyaneis: sutura baseos ferruginea.

Brachinus scolpeta. Fab. él. 1. p. 220.

Latr. hist. nat., etc. 8. p. 244. pl. 72. f. 4. et gen. 1. p. 188.

Habite aux environs de Paris, sous les pierres.

3. Brachine bimaculée. *Brachinus bimaculatus*.

B. niger; capite elytrorumque puncto baseos, fasciâque mediâ ferrugineis.

Brachinus bimaculatus. Fab. él. 1. p. 217.

Carabus bimaculatus. Lin.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 2. f. 16. a. b. c.

Habite aux Indes orientales.


Etc.

L É B I E. (Lebia.)

Antennes filiformes, plus longues que le corselet. Palpes filiformes, ayant souvent le dernier article plus grand. Languette sans angles au bout.

Corps ovale-oblong, très-aplati. Corselet un peu en cœur. Pénultième article des tarses bifide dans la plupart.

Antennæ filiformes, thorace longiores. Palpi fili-



*mes : articulo ultimo sæpiùs crassiore. Ligula
bii margine supero integro , recto aut rotundato.
Corpus ovato-oblongum , valdè depressum. Tho-
x subcordatus. Tarsorum articulus penultimus bifi-
is in plurimis.*

OBSERVATIONS.

Les *lébies* sont des carabiens de petite taille, qui ont, comme ceux des trois genres précédens, la lèvre inférieure tière, et une forme approchant de celle des brachines. Mais on les en distingue facilement, parce que leur corps est très-aplati, et qu'il ne fait point d'explosion vaporeuse. On les trouve sous les pierres, et sur les arbres, sous les orces ou dans leurs fissures.

ESPECES.

Lébie tête bleue. *Lebia cyanocephala.*

L. alata ; thorace pedibusque ferrugineis ; capite elytrisque cyaneis.

Carabus cyanocephalus. Lin. Fab. él. 1. p. 200.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 3. f. 24. Panz. fasc. 75. t. 5.

Lebia cyano-cephala. Latr. hist. nat. , etc. , 8. p. 247. pl. 72. f. 5.

Buprestis. Geoff. 1. p. 149. n.º. 16.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Lébie petite-croix. *Lebia cruz-minor.*

L. alata ; thorace orbiculato rufo ; elytris truncatis rufis : cruce nigra.

Carabus cruz-minor. Lin. Fab. él. 1. p. 202.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 4. f. 41. Panz. fasc. 16. t. 2.

Lebia cruz-minor. Lat. gen. 1. p. 192.

Buprestis. Geoff. 1. p. 150. n.º 18.

Habite en Europe. Commune près Paris.

Etc.

ZUPHIE. (Zuphium.)

Antennes filiformes , à articles un peu longs. Palpes terminés par un article plus grand. Lèvre inférieure subtrilobée.

Corps oblong. Tête rétrécie postérieurement en forme de cou. Corselet presque en cœur.

Antennæ filiformes ; articulis longiusculis . Palpi articulo majore terminati . Labium subtrilobum : marginis superi lateribus auriculatis .

Corpus oblongum . Caput in collum posticè angustatum . Thorax subcordatus ,

OBSERVATIONS.

Les *zuphies*, auxquelles je réunis les galérites de M. Latreille, ont une espèce de cou, et sont distinguées des genres précédens parce que leur lèvre inférieure n'est plus simple et entière. Dans les *zuphies* de M. Latreille, tous les articles des tarse sont entiers; mais le pénultième article est bilobé dans ses galérites.

ESPECES.

1. Zuphie odorante. *Zuphium olens*.

Z. alatum; thorace rufo; elytris fuscis : maculis tribus rufis.

Carabus olens. Ross. fn. etr. tab. 5. f. 2.

Galerita olens. Fab. el. 1. p. 215.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 11. f. 126. *Carabus*.

Zuphium olens. Latr. gen. 1. p. 198.

Habite l'Italie, le midi de la France.

2. Zuphie fasciolée. *Zuphium fasciolatum*. Latr.

Z. nigrum; elytrorum vittâ abbreviatâ, abdomine pedibusque ferrugineis.

Carabus fasciolatus. Ross. fn. etr. 1. t. 2. f. 8.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 13. f. 155. a. b.

Galerita fasciolata. Fab. él. 1. p. 216.

Habite en Italie, et au midi de la France.

3. Zuphie américaine. *Zuphium americanum*.

Z. nigrum; thorace ferrugineo; elytris cyaneis.

Galerita americana. Fab. él. 1. p. 214.

Latr. gen. 1. p. 197.

Carabus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 6. f. 72.

Habite l'Amérique septentrionale.

DRYPTE. (Drypta.)

Antennes filiformes. Palpes, soit filiformes, soit terminés par un article plus grand. Languette de la lèvre biauriculée au bout.

Corps allongé. Corselet subcylindrique, allongé en forme de cou. Abdomen large, en carré long, tronqué au bout.

Antennæ filiformes. Palpi vel filiformes, vel articulo majore terminati. Labii ligula apice biauriculata.

Corpus oblongum. Thorax subcylindricus, angustus, in collum elongatus. Abdomen latiusculum, elongato-quadratum, apice subtruncatum.

OBSERVATIONS.

Sous cette coupe, je réunis des carabiens remarquables par leur corselet allongé, subcylindrique, colliforme, et qui ont la languette biauriculée à son sommet. On les a distingués en plusieurs petits genres, savoir : les *dryptes* de M. Latreille, qui ont les mandibules avancées, très-étroites, la languette linéaire, et les palpes terminés par un

article plus grand ; les *odacanthés* et les *agres* de Fabricius , qui ont les palpes filiformes , la tête rétrécie postérieurement , etc. Qu'on les réunisse ou qu'on les divise , ces carabiens doivent toujours s'avoirsiner.

ESPECES.

2. Drypte échancrée. *Drypta emarginata*.

D. carulea; ore antennis pedibusque nigris; elytris apice emarginatis.

Drypta emarginata. Latr. gen. 1. p. 197. tab. 7. f. 3.

Fab. él. 1. p. 230.

Cicindela. Oliv. col. 2. n.° 33. pl. 2. f. 32. a. b.

Habite en France, en Italie.

3. Drypte mélanure. *Drypta melanura*.

D. thorace cyaneo; elytris testaceis; apice nigris.

Odacantha melanura. Fab. él. 1. p. 228.

Latr. hist. nat., etc., 8. p. 255. pl. 72. f. 6. et gen. 1. p. 194.

Atelabus melanurus. Lin.

Carabus angustatus. Oliv. col. 3. n.° 35. pl. 1. f. 7. a. b.

Habite en Europe.

3. Drypte cayennaise. *Drypta cayennensis*.

D. ænea, rugosa, alata; thorace lineari punctato.

Carabus cayennensis. Oliv. col. 3. n.° 35. pl. 12. f. 133.

Agra ænea. Fab. él. 1. p. 224.

Agra cayennensis. Latr. gen. 1. p. 195.

Habite l'Amérique méridionale.

Etc.

SIAGONE. (Siagona.)

Antennes presque sétacées , de la longueur du corselet. Mandibules pointues , dentées. Palpes extérieurs terminés par un article plus grand : sécuriforme dans les labiaux. Lèvre inférieure entière , continue avec le menton , sans articulation distincte.

Corps oblong , aplati. Corselet séparé de l'abdomen par un étranglement. Abdomen ovale.

Antennæ subsetaceæ , thoracis longitudine. Mandibulæ acutæ , dentatæ. Palpi exteriores articulo majore terminati ; in labialibus securiformi. Labium integrum , cum mento continuum , absque articulatione distinctâ.

Corpus oblongum , depressum. Thorax ab abdomine strangulatione remotus. Abdomen ovale.

OBSERVATIONS.

Ce qui distingue particulièrement les *siagones*, c'est que, dans ces carabiens ; la lèvre inférieure n'a point d'articulation à sa base , et semble n'être qu'une continuité du menton. Ici l'abdomen n'est plus tronqué à son extrémité , comme dans les six genres précédens. Les *siagones* sont des carabiens exotiques , propres aux pays chauds.

ESPECES.

1. Siagone rufipède. *Siagona rufipes*.

S. brunneo-nigra , punctata ; thorace subsulcato ; antennis pedibusque rufis. Lat.

Siagona rufipes. Latr. gen. 1. p. 209. tab. 1. f. 9.

Cucujus rufipes. Fab. él. 2. p. 93.

Habite la côte de la Barbarie.

2. Siagone aplatie. *Siagona depressa*.

S. alata , punctata , nigra ; thorace sulcato.

Galerita depressa. Fab. él. 1. p. 215.

Habite dans l'Inde.

Etc. Ajoutez *Galerita plura ; Flesus*, et *Bubo* de Fabricius.

Lat.

SCARITE. (Scarites.)

Antennes submoniliformes, à peine de la longueur du corselet. Labre corné, denté. Mandibules très-grandes, avancées; le plus souvent dentées au côté interne. Lèvre inférieure courte, large, évasée au bord supérieur; à oreillettes nulles.

Corps allongé; un peu aplati. Corselet séparé de l'abdomen par un étranglement. Jambes antérieures dentées, subdigitées ou palmées.

Antennæ submoniliformes, thoracis vix longiorum. Labrum corneum, dentatum. Mandibulæ maximæ, perfectæ, latere interno sæpius dentatæ. Labium breve, latum; margine supero dilatato obsolete emarginato; auriculis nullis.

Corpus elongatum, depressiusculum. Thorax ab abdomine postice intervallo disjunctus. Pedes antici tibiis extus dentatis, subdigitatis aut palmatis.

OBSERVATIONS.

Les *scarites*, que Linné a confondues avec les *ténébrions*, sont des carabiens singuliers par leurs grandes mandibules, leur corselet large, en croissant, séparé des élytres par un écartement remarquable. Ces insectes ont des couleurs sombres, noirâtres, sont carnassiers, courent avec célérité, vivent dans les terrains sablonneux, s'y creusent des retraites, et la plupart ont les élytres connées, et sont aptères.

ESPECES.

1. Scarite géante. *Scarites gigas*.

S. ater; pedibus anticis palmato digitatis; mandibulis sulcatis; thorace postice dentato. F.

Scarites gigas. Fab. él. 1. p. 123.

Oliv. col. 3. n.º 36. pl. 1. f. 1. a. b. c.

Habite en Afrique, et au midi de la France.

2. Scarite des sables. *Scarites sabulosus*:

S. niger, nitidus; thorace lunato, posticè utrinque subundentato; elytris obsolete striatis.

Scarites sabulosus. Oliv. col. 3. n.º 36. pl. 1. f. 8.

Latr. gen. 1. p. 210.

Scarites lævigatus. Fab. él. 1. p. 124.

Panz. fasc. 63. t. 1.

Habite le midi de la France, l'Italie, l'Espagne.

3. Scarite indienne. *Scarites indus*.

S. ater; thorace cordato canaliculato; elytris striatis.

Oliv.

Scarites indus. Oliv. col. 3. n.º 36. pl. 1. f. 2.

Habite au Bengale. Massé.

Etc.

CLIVINE. (Clivina.)

Antennes submoniliformes, à peine de la longueur du corselet. Labre sans dents. Mandibules simples, plus courtes que la tête. Lèvre inférieure saillante, ayant deux oreillettes à son sommet.

Corps oblong; corselet orbiculaire ou carré, séparé des élytres par un espace. Jambes antérieures, soit dentées, soit terminées par deux longues épines.

Antennæ submoniliformes, thoracis vix longitudine. Labrum indivisum. Mandibulæ capite breviores; dentibus internis nullis conspicuis. Labium exsertum, marginis superi utroque latere auriculato.

Corpus oblongum; thorax orbicularis aut subquadratus, ab elytris intervallo remotus. Pedes antici tibiis vel extis dentatis, vel spinis longis duabus terminatis.

OBSERVATIONS.

Les *clivines* ressemblent aux *scarites* par leur aspect ou leur forme extérieure; mais elles en diffèrent par les caractères des parties de leur bouche. Ces insectes se plaisent plus dans les lieux humides que dans ceux qui sont secs et arides.

ESPÈCES.

1. Clivine arénaire. *Clivina arenaria*.

C. nigricans vel brunnea; thorace subquadrato; frontis medio impresso; elytrorum striis punctatis. Latr.

Tenebrio fossor. Lin.

Scarites Wehertus. Fab. él. 1. p. 125.

Oliv. col. 3. n.º 36. pl. 1. f. 6. a. b.

Clivina arenaria. Latr. gen. 1. p. 211.

Habite en Europe, dans les lieux sablonneux et humides.

2. Clivine thoracique. *Clivina thoracica*.

C. nigro-ænea; thorace subgloboso; elytris punctato-striatis.

Scarites thoracicus. Ross. Fab. él. 1. p. 125.

Oliv. col. 3. n.º 36. pl. 2. f. 14.

Panz. fasc. 83. t. 2.

Habite en Europe, aux lieux humides et sablonneux.

Etc.

MORION. (Morio.)

Antennes moniliformes, un peu plus longues que le corselet. Mandibules pointues. Palpes filiformes, à dernier article obtus ou tronqué. Languette de la lèvre en carré long, bidentée au sommet.

Corps allongé. Corselet carré ou presque en cœur.

Antennæ moniliformes, thorace paulò longiores. Mandibulæ acutæ. Palpi filiformes; articulo ultimo

truncato. Labii ligula elongato-quadrata, apice biariculata.

Corpus elongatum. Thorax quadratus vel obcordatus.

OBSERVATIONS.

Les morions sont des carabiens exotiques qui ont des rapports avec les scarites et les clivines, par leurs antennes grenues, et qui, par ce caractère des antennes, se distinguent des harpales. Dans le morion de M. Latreille, les antennes sont grenues et de même grosseur partout; dans l'ozène d'Olivier, les antennes, pareillement grenues, ont le dernier article plus gros.

ESPECES.

1. Morion monilicorne. *Morio monilicornis.*

M. planus, aterrimus, nitidus; thorace utrinque ad angulos posticos impresso; elytris striatis.

Harpalus monilicornis. Lat. gen. 1. p. 206.

Habite l'île de Porto-Rico. Maugé.

2. Morion dentipède. *Morio dentipes.*

M. niger, nitidus; elytris striatis; tibiis anticis denticulo instructis.

Ozæna dentipes. Oliv. Encycl.

Habite à Cayenne.

HARPALE. (*Harpalus.*)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet; à articles subcylindriques. Mandibules pointues, sans dent notable au côté interne. Languette de la lèvre en carré long, biariculée au sommet.

Corps allongé; corselet arrondi ou presque en cœur. Jambes antérieures non dentées au côté externe.

Antennæ filiformes , thorace paulò longiores ; articulis subcylindricis. Mandibulæ acutæ , interno latere dente notabili nullo. Labii ligula elongato-quadrata, apice biauriculata.

Corpus elongatum ; thorax suborbiculatus , obcordatus aut subquadratus. Tibiæ antioæ extus non dentatæ.

OBSERVATIONS.

Le genre *harpale* est très-nombreux en espèces, et embrasse quantité de carabiens que l'on distingue des carabes en ce qu'ils ont les jambes antérieures échancrées au côté interne. Leur tête n'a point de cou distinct; leurs palpes sont filiformes, sans être subulées au bout. Leurs élytres ne sont point tronquées à leur extrémité. Ces insectes ont, en général, des couleurs sombres, brunes ou noirâtres; plusieurs néanmoins sont bronzées ou cuivreuses. Je n'en distingue point les aristes, les féronies et bien d'autres genres que l'on a établis avec ces insectes.

ESPECES.

1. Harpale leucophthalme. *Harpalus leucophthalmus*.

H. alatus, depressus, ater; elytris substriatis.

Carabus leucophthalmus. Lin.

Harpalus leucophthalmus. Lat. gen. 1. p. 201.

Carabus planus. Fab. él. 1. p. 179. Panz. fasc. 11. t. 4.

Carabus spinifer. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 5. f. 58, et pl. 12. f. 58. b.

Habite en France, en Allemagne; sous les pierres.

2. Harpale ruficorne. *Harpalus ruficornis*.

H. ater, alatus; elytris sulcatis subtomentosis; antennis pedibusque rufis.

Carabus ruficornis. Fab. él. 1. p. 180. Panz. fasc. 30. t. 2.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 3. f. 9.

Harpalus ruficornis. Lat. gen. 1. p. 203.
Habite en Europe. Commun près de Paris.
Etc.

L I C I N E. (Licinus.)

Antennes filiformes , à articles cylindriques. Labre très-court. Mandibules tronquées ou très-obtuses. Palpes à dernier article , soit plus gros , soit en forme de hache.

Corps oblong, aplati. Corselet large , arrondi ou presque carré.

Antennæ filiformes ; articulis cylindricis. Labrum brevissimum. Mandibulæ apice truncatæ vel retusæ. Palporum articulus ultimus major , vel securiformis.

Corpus oblongum , depressum. Thorax latiusculus , rotundatus aut subquadratus.

OBSERVATIONS.

Les *licines* , dont je ne sépare point les *badistes* , se distinguent facilement par leurs mandibules très-obtuses et comme tronquées à leur sommet. Ce sont des insectes aplatis , noirâtres , ayant les jambes antérieures échancrées comme dans les précédens. La languette de leur lèvre inférieure est biauriculée à son sommet.

ESPÈCES.

1. Licine échancrée. *Licinus emarginatus*.

L. ater , *apterus* ; *thorace orbiculato ; elytris lævibus*.

Carabus cassidius. Fab. él. 1. p. 190.

Carabus emarginatus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 13. f. 150.

Carabus depressus. Panz. fasc. 31. t. 8.

Licinus emarginatus. Lat. gen. 1. p. 199.

Habite en Allemagne , et se trouve plus rarement près de Paris.

2. Licine silphoïde. *Licinus silphoides*. Latr.

L. ater, depressus, apterus; thorace orbiculato; elytris striatis punctisque impressis majoribus.

Carabus silphoides. Fab. él. 1. p. 190.

Panz. fasc. 92. t. 2.

Habite l'Italie, le midi de la France.

3. Licine bipustulée. *Licinus bipustulatus*.

L. alatus, niger; thorace elytrisque rufis; elytrorum macula postica, lunata, nigra.

Carabus bipustulatus. Fab. él. 1. p. 203.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 8. f. 96. a. b. Panz. fasc. 16. t. 3.

Habite en Europe. (Badiste, Latr.)

P A N A G É E. (Panagæus.)

Antennes filiformes, plus courtes que le corps. Mandibules petites, simples. Palpes extérieurs terminés par un article presque sécuriforme. Languette de la lèvre inférieure très-courte.

Corps ovale-oblong; tête petite, portée sur un cou distinct. Corselet orbiculaire. Abdomen grand.

Antennæ filiformes, corpore breviores. Mandibulæ parvæ, simplices. Palpi exteriores articulo subsecuriformi terminati. Labii ligula brevissima.

Corpus ovato-oblongum; caput parvum, collo distincto elevatum. Thorax orbicularis. Abdomen magnum.

OBSERVATIONS.

Les panagées, comme les loricères qui viennent ensuite, ayant un cou distinct, et les jambes antérieures échancrées, ont autorisé à les séparer des carabes. Olivier dit que ces insectes se tiennent dans les lieux humides [Encyclopédie]. Sous ce rapport, ils se rapprocheraient encore des loricères et des élaphres.

ESPECES.

1. Panagée grande-croix. *Panagæus crux major*.

P. niger; *elytris striatis, punctatis*; *maculis quatuor rufis*; *thorace orbiculato scabro*.

Carabus crux major. Lin. Fab. él. 1. p. 202.

Panv. fasc. 16. t. 1. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 8 f. 95. a. b.

Panagæus crux major. Lat. gen. 1. p. 220. Oliv. Encycl. n.º 5.

Habite en Europe.

2. Panagée recourbée. *Panagæus reflexus*.

P. ater; *elytris sulcatis*; *maculis duabus flavis*; *thoracis margine reflexo*.

Carabus reflexus. Fab. ent. *Cychrus reflexus* ejusd. él. 1. p. 166.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 7. f. 77.

Habite dans l'Inde, à la côte de Coromandel.

Etc.

LORICÈRE. (Loricera.)

Antennes filiformes, à peine de la longueur du corselet, hispides; à articles inégaux. Mandibules courtes.

Corps oblong. Tête portée par un cou distinct. Corselet suborbiculé. Jambes antérieures fortement échancrées au côté interne.

Antennæ filiformes, thoracis vix longitudine, hispidae; articulis inæqualibus. Mandibulæ breves.

Corpus oblongum. Caput collo distincto elevatum. Thorax suborbiculatus. Tibiæ anticæ ad latus internum valdè emarginatæ.

OBSERVATIONS.

La loricère est un carabien remarquable par ses antennes, par l'espèce de cou en forme de nœud qui soutient sa

tête, et par la forte échancrure de ses jambes antérieures. Elle se plaît au bord des eaux.

ES P E C E.

1. Loricère bronzée. *Loricera ænea*.

Carabus pilicornis. Fab. *El.* 1. p. 193. *Panz. fasc.* 11. t. 10.

Oliv. col. 3. n.° 35. *pl.* 11. f. 119.

Buprèste. Geoff. 1. p. 147. n.° 10.

Loricera ænea. Lat. *gen.* 1. p. 224. *tab.* 7. f. 5.

Habite en France, en Allemagne, sur les bords des mares.

C Y C H R E. (Cychrus.)

Antennes filiformes, à peine plus longues que le corselet. Labre profondément échancré. Mandibules étroites, fort longues, bidentées sous leur sommet. Dernier article des palpes extérieurs dilaté en forme de cuiller. Lèvre inférieure courte.

Tête plus étroite que le corselet. Abdomen ovale. Elytres connées, embrassant l'abdomen sur les côtés.

Antennæ filiformes, thorace vix longiores. Labrum profundè emarginatum. Mandibulæ angustæ, prælongæ, sub apice bidentatæ. Palporum exteriorum articulo ultimo dilatato cochleariformi. Labium breve.

Caput thorace angustius. Abdomen ovale. Elytra connata, lateribus abdomen involventia.

O B S E R V A T I O N S.

Les cychres tiennent de très-près aux carabes; mais ils s'en distinguent par leurs mandibules qui sont étroites, fort longues et bidentées sous leur extrémité; par le dernier article de leurs palpes en cuilleron; et par leur tête étroite.

ESPECES.

1. Cychre muselier. *Cychrus rostratus*.

C. niger; *elytris argutè punctato-rugosis*. Lat.

Tenebrio rostratus. Lin. *Cychrus rostratus*. Fab. él. 1. p. 165.

Cychrus rostratus. Latr. gen. 1. p. 272. Panz. fasc. 74. t. 6.

Carabus rostratus. Oliv. 3. n.º 35. pl. 4. f. 37.

Habite en Europe, dans les bois, sous les pierres.

2. Cychre rétréci. *Cychrus attenuatus*.

C. niger; *elytris subcupreis : punctis elevatis triplici serie*; *capite angustissimo*. F.

Cychrus attenuatus. Fab. él. 1. p. 166. Panz. fasc. 2. t. 3.

Carabus proboscideus. Oliv. 3. n.º 35. pl. 11. f. 128.

Habite en France, en Allemagne.

Etc. Ajoutez *C. elevatus*, *C. unicolor* de Fabricius.

CARABE. (Carabus.)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet. Mandibules grandes, fortes, entières dans leur moitié supérieure. Mâchoires arquées, soit insensiblement, soit brusquement. Lèvre inférieure courte.

Corps allongé-ovale. Tête un peu large. Corselet sub-orbiculaire ou presque carré. Abdomen grand, ovale.

Antennæ filiformes, thoracæ sæpius paulò longiores. Mandibulæ magnæ, validæ; parte dimidiâ superiore non dentatæ. Maxillæ sensim aut abruptè arcuatæ. Labium breve.

Corpus elongato-ovatum. Caput latiusculum. Thorax suborbiculatus aut subquadratus. Abdomen magnum, ovale.

OBSERVATIONS.

Les *carabes*, auxquels je réunis les *calosomes*, sont faciles à distinguer de tous les carabiens précédens, 1.^o parce qu'ils n'ont point d'échancrure au côté interne des deux jambes antérieures; 2.^o parce que leur labre ou lèvre supérieure a deux ou trois lobes, ce qui les distingue des genres suivans; 3.^o parce que leurs mandibules ne sont point bidentées sous leur extrémité, comme dans les cycchres. Leurs palpes extérieurs ont le dernier article, soit à peine plus large que le précédent, soit un peu plus large et presque en hache. Leur lèvre inférieure est petite, munie de deux petites dents aux angles latéraux de son extrémité.

Ces insectes sont agiles, carnassiers, et ordinairement ornés de couleurs métalliques, brillantes. Lorsqu'on les prend, ils répandent par la bouche et par l'anus, une liqueur caustique, d'une odeur fétide. Ceux qu'on a nommés *calosomes*, grimpent sur les arbres pour y chercher des chenilles et d'autres insectes qui deviennent leur proie; les autres restent par terre. Ces derniers n'ont point d'ailes.

ESPECES.

[*Mâchoires brusquement courbées. Calosomes.*]

1. Carabe sycophante. *Carabus sycophanta*.

C. alatus; violaceus, nitens; elytris striatis aureis.

Carabus sycophanta. Lin. Bupreste. n.° 5. Geoff. 1. p. 144.

Oliv. col. 3. n.° 35. pl. 3. f. 31. Panz fasc. 81. t. 7.

Calosoma sycophanta. Fab. él. 1. p. 212.

Latr. gen. 1. p. 213. et hist. nat. 8. p. 301. pl. 73. f. 8.

Habite en Europe, dans les bois.

2. Carabe inquisiteur. *Carabus inquisitor*.

C. alatus; elytris viridi-aeneis: punctis triplici ordine.

Carabus inquisitor. Lin. Bupreste. n.° 6. Geoff. 1. p. 145.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 1. f. 3. Panz. fasc. 81. t. 8.

Calosoma inquisitor. Fab. *ibid.* Latr. gen. 1. p. 214.

Habite en Europe.

4. Carabe soyeux. *Carabus sericeus*.

C. alatus, *ator* ; thorace puncto baseos utrinque impresso ;
elytris substriatis punctisque æneis triplici serie.

Calosoma sericeum. Fab. Lat. gen. 1. p. 214.

Carabus indagator. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 8. f. 88.

Habite en Europe, dans les bois.

Etc.

[*Mâchoires insensiblement arquées*. Carabes. Lat.]

5. Carabe chagriné. *Carabus coriaceus*.

C. apterus, *ater*, *opacus* ; *elytris connatis : punctis elevatis concatenatis*.

Carabus coriaceus. Lin. Fab. el. 1. p. 168.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 1. f. 1. Panz. fasc. 81. t. 1.

Lat. gen. 1. p. 215. Bupreste. n.º 1. Geoff. p. 141.

Habite en Europe, sous les pierres.

6. Carabe doré. *Carabus auratus*.

C. apterus ; *elytris auratis sulcatis* ; *antennis pedibusque rufis*.

C. auratus. Lin. Fab. el. 1. p. 175. Panz. fasc. 81. t. 4.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 5. f. 51, et pl. 11. f. 51.

Bupreste. n.º 2. Geoff. 1. p. 142. pl. 2. f. 5.

Habite en Europe. Très-commun dans les jardins.

7. Carabe violet. *Carabus violaceus*.

C. apterus, *niger* ; *thoracis elytrorumque marginibus violaceis* ; *elytris lævibus*. F.

Carabus violaceus. Fab. el. 1. p. 170. Latr. gen. 1. p. 216.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 4. f. 39. Panz. fasc. 4. t. 4.

Habite en Europe.

Etc.

N É B R I E. (Nebria.)

Antennes filiformes, à peine plus longues que le

corselet. Labre presque entier. Mâchoires barbuës à leur base externe. Lèvre presque carrée, courte.

Corps allongé, aplati. Corselet en cœur, tronqué postérieurement.

Antennæ filiformes, thorace vix longiores, articulis cylindricis. Labrum subintegrum. Maxillæ ad basim externam barbatæ. Labium subquadratum, breve.

Corpus oblongum, depressum. Thorax brevis, cordatus, posticè truncatus.

OBSERVATIONS.

Sous le nom de *nébrie*, M. Latreille réunit des carabien's qui appartiennent à la division de ceux dont les jambes antérieures n'ont point de profonde échancrure à leur bord interne. Ils diffèrent des carabes et des calosomes en ce que leur labre n'est pas profondément échancré ou lobé, et en ce que leurs mâchoires sont barbuës ou ciliées à leur base externe. Ce genre est médiocrement remarquable.

ESPECES.

1. Nébrie arénaire. *Nebria arenaria*.

N. pallido-flavescens; elytris dilutioribus, striatis: fasciis duabus maculosis, transversis, nigris. Lat.

Carabus complanatus. Lin. *Carabus arenarius.* Fab. éd. 1. p. 179.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 5. f. 54. a. b. c.

Nebria arenaria. Lat. hist. nat., etc., 8. p. 275. pl. 73. f. 3.

Habite les lieux maritimes et sablonneux de la France, l'Angleterre, etc.

2. Nébrie brévicolle. *Nebria brevicollis*.

N. nigra, nitida; antennis palpis tibiis tarsisque brunneis. Lat.

Carabus brevicollis. Fab. étl. 1. p. 191.

Panz. fasc. 11. t. 8. et *carabus depressus* ejusd. fasc. 31. t. 8.

Nebria brevicollis. Latr. gen. 1. p. 222.

Habite en Europe, sous les pierres et sous l'écorce des arbres.
Etc.

POGONOPHORE. (Pogonophorus.)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet. Labre presque entier. Mandibules très-dilatées à leur base. Palpes maxillaires plus longs que la tête. Mâchoires barbues, pectinées, subépineuses. Languette de la lèvre allongée, triépineuse à son sommet.

Corps oblong, déprimé.

Antennæ filiformes, thorace paulò longiores. Labrum subintegrum. Mandibulæ basi valdè dilatatae. Palpi maxillares capite longiores. Maxillæ barbatae, pectinato-spinulosæ. Labii ligula elongata; apice trispinoso.

Corpus oblongum, depressum.

OBSERVATIONS.

Les *pogonophores* ne diffèrent presque point des nébries par leur port; mais comme la languette de leur lèvre inférieure est étroite, allongée, et triépineuse à son sommet, que d'ailleurs ils ont les mâchoires comme pectinées et épineuses à leur côté extérieur, on peut les distinguer.

ESPÈCES.

1. Pogonophore bleu. *Pogonophorus cæruleus*.

P. supra cyaneus; antennis, ore, tibiis tarsisque rufobrunneis. Lat.

Carabus spinilabris. Fab. étl. 1. p. 181.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 3. f. 22. *a. b. c.*

Panz. fasc. 30. t. 6. *ejusd. manticora*, fasc. 89. t. 2.

Pogonophorus cœruleus. Latr. gen. 1. p. 223. t. 7. f. 4.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

2. Pogonophore roussâtre. *Pogonophorus rufescens*.
Latr.

P. rufescens; *vertice anoque nigris*. Lat.

Carabus rufescens Fab. él. 1. p. 205.

Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 12. f. 146.

(B) var. *Carabus spinilabris*. Fab. él. 1. p. 204.

Panz. fasc. 39. t. 11.

Habite en France, en Allemagne.

OMOPHRON. (Omophon.)

Antennes filiformes, un peu plus longues que le corselet. Labre presque entier, transverse un peu cilié. Mandibules simples. Palpes labiaux rapprochés à leur base. Lèvre inférieure courte.

Corps elliptique ou en ovale court, un peu convexe. Corselet court, transverse. Tête postérieurement enfoncée dans le corselet.

Antennæ filiformes, thoracè paulò longiores. Labrum subintegrum, transversum, subciliatum. Mandibulæ simplices. Palpi labiales, ad basim approximati. Labium breve.

Corpus ellipticum seu abbreviato-ovatum, convexiusculum. Thorax brevis, transversus. Caput posticè thorace intrusum.

OBSERVATIONS.

Les *omophrons*, que M. Latreille range avec les carabiens barbus, près de ses pogonophores et de ses nébries,

En sont distingués par leur port ou leur forme externe. Ils sont moins aplatis, et ont leur corps en ovale court, presque hémisphérique. Ces insectes se plaisent dans le voisinage des eaux, sous les pierres ou dans le sable.

ESPÈCE.

1. Omophron bordé. *Omophron limbatum*.

O. supra ferrugineum; thorace macula, elytris fasciis undatis viridi-æneis.

Scolytus limbatus. Fab. El. 1. p. 247. Panz. fasc. 2. t. 9.

Carabus limbatus. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 4. f. 43. a. b.

Omophron limbatum. Lat. gen. 1. p. 225. tab. 7. f. 7.

Habite en Europe; près des eaux.

Etc. Voyez Olivier, Encycl. pour trois autres espèces.

É L A P H R E. (Elaphrus.)

Antennes filiformes, de la longueur du corselet : à articles courts, en cône renversé. Labre arrondi en avant. Mandibules simples, arquées. Palpes filiformes, à dernier article cylindrique. Lèvre inférieure acuminée au milieu avec une oreillette de chaque côté.

Corps oblong. Tête et corselet plus étroits que les élytres. Les yeux globuleux, saillans sur les côtés.

Antennæ filiformes, thoracis longitudine : articulis brevibus, inverso-conicis. Labrum anticè rotundatum seu semi-circulare. Mandibule simplices, arcuatae. Palpi filiformes : articulo ultimo cylindrico. Labium medio acuminatum; lateribus rotundatis, auriculatis.

Corpus oblongum. Caput thoraxque elytris angustiores. Oculi globosi; ad latera prominuli.

OBSERVATIONS.

Les *élaphres* ressemblent aux cicindèles par leur forme extérieure ; mais ils en sont très-distingués par les caractères des parties de leur bouche , et parce qu'ils ne se tiennent que dans les lieux humides , le voisinage des eaux. En effet, leurs mandibules très-simples et leurs mâchoires n'ayant point d'onglet qui s'articule à leur sommet , ne permettent point de les confondre avec les cicindèles. Ces insectes ont ordinairement une couleur bronzée , métallique , et sont très-agiles.

ESPECES.

1. Elaphre des rivages. *Elaphrus riparius*.

E. viridi-æneus ; *elytris punctis latise excavatis*.

Cicindela riparia. Lin.

Elaphrus riparius. Fab. él. 1. p. 245.

Oliv. col. 2. n.º 34. pl. 1. f. 4. a. b.

Latr. gen. 1. p. 181. Panz. fasc. 30. t. 1.

Habite en Europe , près des mares , des étangs.

2. Elaphre uligineux. *Elaphrus uliginosus*.

E. viridi-æneus ; *elytris striatis : punctis impressis caruleis*.

Elaphrus uliginosus. Fal. él. 1. p. 245.

Oliv. col. 2. n.º 34. pl. 1 f. 1. a. b. c. d. e.

Elaphrus uliginosus. Lat. gen. 1. p. 182.

Habite en Europe , aux lieux humides.

Etc. Ajoutez *elaphrus aquaticus*, et *elaph. semi-punctatus* de Fabricius ; *carabus multipunctatus* et *car. borealis* du même (él. 1. p. 182.) Lat.

B E M B I D I O N. (Bembidion.)

Antennes filiformes , de la longueur du corselet ; à

articles cylindriques. Mandibules simples. Palpes extérieurs terminés par un article subulé, pointu.

Corps oblong ; tête grosse ; corselet presque en cœur tronqué. Jambes antérieures échancrées au côté interne.

Antennæ filiformes , thoracis longitudine ; articulis cylindricis. Mandibulæ simplices. Palpi exteriores articulo acuto vel subulato terminati.

Corpus oblongum , capite magno. Thorax obcordato-truncatus. Pedes antici tibiis latere interno emarginatis.

OBSERVATIONS.

Les *bembidions* ont le port et la manière de vivre , ou les habitudes des élaphres ; mais leurs palpes extérieurs , soit labiaux , soit maxillaires , ont le dernier article pointu ou subulé. Cet article est plus court et moins renflé que le pénultième. Les jambes antérieures de ces insectes sont plus notablement échancrées au côté interne que dans les élaphres.

ESPÈCES.

1. *Bembidion flavipède. Bembidion flavipes.*

B. obscurè æneum ; elytris subnebulosis ; pedibus luteis.

Cicindela flavipes. Lin. *Elaphrus flavipes.* Fab. él. 1. p. 246.

Panz. fasc. 20. t. 2. Oliv. col. 2. n.º 34. pl. 1. f. 2. a. b.

Bembidion flavipes. Lat. gen. 1. p. 183.

Habite en Europe , sur les riyages sablonneux.

2. *Bembidion littoral. Bembidion littorale.* Latr.

B. æneo-nigrum ; elytris punctato-striatis : maculis duabus ferrugineis ; pedibus rufis.

Cicindela rupestris. Lin. *Elaphrus rupestris.* Fab. él. 1. p. 246.

Carabe littoral. Oliv. col. 3. n.º 35. pl. 9. f. 103. et pl. 14. f. 103.

Habite en France, en Allemagne, près des eaux.

Etc. Voyez, pour d'autres espèces, l'hist. nat., etc., de M. Latreille, vol. 8. p. 222.

CARABIENS NAGEURS.

Les quatre pattes postérieures comprimées, ciliées et propres à nager.

Cette division des carabiens est fort petite comparativement à la précédente, et n'embrasse que les races qui vivent dans le sein des eaux, soit dans l'état de larve, soit dans celui d'insecte parfait. Leur corps est toujours ovale-elliptique, leur corselet plus large que long, et leurs yeux sont peu saillans. Ils ont les pattes postérieures aplaties en forme de lames. Comme les autres, ces carabiens sont carnassiers et très-voraces. On les a presque tous réunis dans le genre *dytiscus*; mais, depuis, les entomologistes en ont distingué plusieurs comme genres particuliers. Je me bornerai à la citation des trois genres suivans.

(a) Antennes de onze articles distincts. Le dernier article des palpes non terminé en pointe.

(+) Dernier article des palpes labiaux obtus et sans échancrure à son extrémité.

Dytique.

(+++) Dernier article des palpes labiaux échancré et comme fourchu à son extrémité.

Notère.

(b) Antennes de dix articles distincts. Le dernier article des palpes terminé en pointe.

Haliple.

D Y T I Q U E. (Dytiscus.)

Antennes filiformes - sétacées , de la longueur du corselet. Mandibules un peu courtes , arquées , voûtées , échancrées et bidentées à leur sommet. Palpes extérieurs filiformes ; à dernier article cylindrée.

Corps elliptique , plus ou moins déprimé. Corselet transverse. Elytres dures , couvrant tout l'abdomen. Pattes postérieures natatoires , à tarse comprimé , cilié.

Antennæ filiformi-setaceæ , thoracis longitudine. Mandibulæ breviusculæ , arcuatæ , infrà apicem latere interno subexcavatæ , apice emarginatæ bidentatæ. Palpi exteriores filiformes , articulo ultimo cylindræeo.

Corpus ellipticum , plus minusve depressum. Thorax transversus. Elytra rigida , abdomen totum obtegentia. Pedes postici natatorii ; tarso compresso , ciliato.

OBSERVATIONS.

Les *dytiques* constituent un genre très-naturel , fort nombreux en espèces , et qu'on aurait tort de mutiler ou démembrer , pour former , à ses dépens , de petites coupes , dites génériques , peu tranchées , difficilement reconnaissables. Ces insectes ressemblent tout-à-fait , par la forme de leur corps , c'est-à-dire , par celle de leurs élytres , de leur corselet et de leur tête , aux hydrophiles ; mais , quoiqu'ils y tiennent par plusieurs rapports , ils ne sont pas de la même famille. Ce sont , en effet , de véritables carabiens , ayant six palpes distincts et des antennes filiformes. Conjointement avec le notère et l'haliple , ces insectes ter-

minent la famille des carabiens , et forment une transition aux *gyrins* , aux *hydrophiles* et autres coléoptères pentamères carnassiers qui ont des antennes en massue , et qui n'ont que quatre palpes.

Le corps des dytiques présente une ellipse , soit raccourcie , soit oblongue , déprimée ou légèrement convexe , tant en dessus qu'en dessous , quelquefois assez fortement bombée sur le dos. Leur tête est un peu enfoncée dans le corselet. Leurs pattes postérieures , surtout les deux dernières , sont plus longues , et ont le tarse élargi , aplati , cilié , à articles peu distincts. Souvent , dans ces insectes , les élytres sont lisses dans les mâles et striées ou sillonnées dans les femelles.

Les *dytiques* vivent dans les eaux douces des rivières , des lacs , des étangs et des marais ; ils restent presque continuellement dans l'eau , venant de temps en temps respirer l'air à sa surface. Ils ont néanmoins la faculté d'aller sur la terre , et de voler. Ces insectes sont carnassiers , très-voraces , et dévorent tous ceux qu'ils peuvent attraper.

Les larves des dytiques ont le corps allongé , composé de onze ou douze anneaux , et sont munies de six pattes. Les derniers anneaux ont des rangées de poils sur les côtés , et l'abdomen se termine par deux panaches ou franges de poils qui imitent des branchies et qui ne sont que des trachées saillantes et capilliformes.

Ces particularités qui distinguent les dytiques du notère , sont-elles communes à plusieurs races ? on ne le sait pas encore ; et , dans le cas où elles ne le seraient pas , le genre établi par M. Clairville ne ferait que séparer une espèce de son genre naturel.

ESPECES.

1. Dytique large. *Dytiscus latissimus*.

D. niger ; *elytrorum marginibus dilatatis* : *lined flav.*
Dytiscus latissimus. Lin. Fab. éli. 1. p. 157.

Oliv. col. 2. n.º 40. pl. 2. f. 8. a. b.

Lat. gen. 1. p. 229. Panz. fasc. 14. t. 1. mas. et t. 2. femina.

Habite le nord de l'Europe, dans les eaux douces.

1. Dytique marginal. *Dytiscus marginalis*.

D. niger; thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis.

Dytiscus marginalis (mas) Lin. et *D. semistriatus* (femina) ejusdem.

Dytiscus marginalis. Fab. él. 1. p. 258. Latr. gen. 1. p. 230.

Panz. fasc. 14. t. 3. mas, et t. 4. femina.

Oliv. col. 2. n.º 40. pl. 1. f. 1. a. b. c. d. et f. 6. a.

Dytiscus. Geof. 1. p. 186. n.º 2. et p. 187. n.º 3. pl. 3. f. 2.

Habite en Europe, dans les eaux. Il est commun.

2. Dytique costal. *Dytiscus costalis*.

D. niger; capitis fasciæ, thoracis margine, elytrorumque striæ costali posticæ hamato-ferrugineis.

Dytiscus costalis. Oliv. col. 2. n.º 40. pl. 1. f. 7.

Dytiscus costalis. Fab. él. 1. p. 259.

Habite à Cayenne, à Surinam.

3. Dytique pointillé. *Dytiscus punctulatus*.

D. niger; clypeo thoracis elytrorumque margine albis; elytris striis tribus punctatis.

Dytiscus punctulatus. Fab. él. 1. p. 259. *Dytiscus* n.º 1. Geoff.

Oliv. col. 2. n.º 40. pl. 1. f. 6. b. et f. 1. e.

Habite en Europe.

4. Dytique de Roesel. *Dytiscus Roeselii*.

D. virescens; clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori flavis; elytris obsolete striatis.

Dytiscus Roeselii. Fab. él. 1. p. 259.

Roes. ins. 2. aquat. 1. tab. 2. f. 1-5.

Habite en Allemagne et aux environs de Paris

Etc.

NOTÈRE. (*Noterus* .)

Antennes un peu courtes , fusiformes-subulées , plus épaisses vers leur partie moyenne. Palpes labiaux à dernier article échancré et comme fourchu.

Port des dytiques. Corps elliptique , convexe. Point d'écusson.

Antennæ breviusculæ , fusiformi-subulatæ , versus medium crassiores. Palpi labiales articulo ultimo emarginato subfurcata.

Habitus dytiscorum. Corpus ellipticum , convexum. Scutellum nullum.

OBSERVATIONS.

La phrase qui termine les observations sur les dytiques , laquelle concernait le genre *notère* , doit être ici rapportée par le lecteur , n'ayant été imprimée où elle se trouve que par erreur.

E S P È C E .

1. *Notère crassicorne. Noterus crassicornis.*

Noterus. Latr. Considérations gén. , etc. p. 168.

Dytiscus crassicornis. Fab. él. 1. p. 273. Latr. gen. 1. p. 231.

Oliv. col. 3. n.º 40. pl. 4. f. 34. a. b.

Habit en France , en Allemagne , dans les eaux.

H A L I P L E . (*Haliphus* .)

Antennes filiformes , de la longueur du corselet , à dix articles. Palpes extérieurs à dernier article subulé ou pointu.

Port des dytiques. Corps elliptique. Point d'écusson. Cuisses postérieures recouvertes par une lame pectorale, clypéacée.

Antennæ filiformes , thoracis longitudine , decem-articulatæ. Palpi exteriores articulo subulato vel acuto terminati.

Habitus dytiscorum. Corpus ellipticum. Scutellum nullum. Femora postica lamina pectorali clypeacea tecta.

OBSERVATIONS.

Les *haliples* ressemblent encore tout-à-fait aux dytiques par leur port et par leurs habitudes ; néanmoins les caractères particuliers qui les en distinguent , sont communs à plusieurs races et semblent autoriser leur distinction. Le dernier article des palpes, dans les dytiques, ne se termine pas en pointe ; il est au moins obtus.

ESPECES.

1. Haliple oblique. *Haliplus obliquus*.

H. ferrugineus ; elytris maculis quinque obliquis fuscis.

Dytiscus obliquus. Fab. él. 1. p. 270. Panz. fasc. 86. t. 6.

Haliplus obliquus. Latr. gen. 1. p. 234.

Habite en France, en Allemagne, dans les étangs.

2. Haliple enfoncé. *Haliplus impressus*.

H. ovalis, flavescens ; elytris ciperæis : punctis impressis striatis.

Haliplus impressus. Latr. gen. 1. p. 234. tab. 6. f. 6 et 7.

Dytiscus impressus. Fab. él. 1. p. 271.

Oliv. col. 3. n.º 40. pl. 4. f. 40. a. b.

Dytiscus. Geoff. 1. p. 191. n.º 12.

Habite en France, en Allemagne, dans les eaux.

Ajoutez le *dytiscus fulvus* de Fab.

 DEUXIEME SECTION.

PENTAMÈRES CLAVICORNES.

Leurs antennes sont en massue , soit perfoliée , soit presque solide.

Les insectes de cette section viennent naturellement après les pentamères filicornes. Ils s'y lient aux carabiens aquatiques , par les hydrophiliens qui sont aussi des insectes carnassiers , comme les dytiques , et qui offrent une transition aux dermestes , en un mot , aux nécrophages.

Les *pentamères clavicornes* ont effectivement les antennes en massue bien prononcée ; et cette massue qui les termine est régulière , c'est-à-dire , ne se compose point de lames beaucoup plus allongées d'un côté que de l'autre , comme dans les pentamères lamellicornes. Ici , la massue est formée d'articles , en général , courts et plus ou moins serrés : en sorte qu'elle est , soit perfoliée , soit brusque , dense et presque solide. Ces insectes n'ont tous que quatre palpes articulés ; deux maxillaires , et deux labiaux.

 DIVISION DES PENTAM. CLAVICORNES.

(1) Antennes s'insérant dans une cavité ou sous un avancement des bords de la tête. Elles ont rarement plus de neuf articles.

(a) Insectes aquatiques , vivant dans l'eau ou près de l'eau. Corps elliptique ou oblong.

Les hydrophiliens.

(b) Insectes non aquatiques. Corps hémisphérique:

Les sphéridies.

(a) Base des antennes entièrement ou presque entièrement à découvert.

(a) Sternum antérieur s'avancant en mentonnière vers la bouche:

Les byrrhiens.

(b) Point de sternum antérieur avancé en mentonnière vers la bouche.

Les nécrophages.

LES HYDROPHILIENS.

Insectes aquatiques, vivant, soit dans l'eau, soit dans le voisinage des eaux, ayant des antennes courtes, en massue, et qui n'ont pas plus de neuf articles distincts.

Les *hydrophiliens* sont sans doute très-distincts des carabiens, puisque leur bouche n'offre point six palpes articulés, mais quatre seulement. Néanmoins, de quelque manière qu'on veuille les considérer, il nous paraît inconvenable de les en éloigner considérablement. Ce sont, comme les carabiens, des insectes carnassiers, zoophages, dévorant des insectes vivans, ou au moins se nourrissant de matières animales. Comme les carabiens aquatiques [les dytiques, etc.], ils vivent dans les eaux douces, ou dans le voisinage de ces eaux, et leur ressemblent beaucoup par leur forme générale. Mais n'étant point de la même famille, ils doivent en différer par des caractères particuliers, ce qui a effectivement lieu. Ces insectes forment donc une transition des coléoptères pentamères filicornes, aux pentamères clavicornes.

Les uns sont nageurs et ont les pattes postérieures

natatoires; les autres, quoiqu'ils vivent dans l'eau ou près de l'eau, n'ont que des pattes ambulatoires. Dans le plus grand nombre, le premier article des tarses est beaucoup plus court que le second. Si les antennes des hydrophiliens paraissent n'avoir pas plus de neuf articles distincts, c'est que les articles qui forment la massue, étant très-serrés, surtout les derniers, cessent d'être distincts. Je rapporte à cette famille les cinq genres suivans.

DIVISION DES HYDROPHILIENS.

(1) Mandibules bidentées à leur sommet.

(a) Antennes simples, terminées en massue.

Hydrophile.

Sperché.

(b) Antennes ayant un des articles inférieurs très-dilaté, se prolongeant latéralement.

Gyrin.

Dryops.

(2) Mandibules entières à leur sommet.

Elophore.

HYDROPHILE. (Hydrophilus.)

Antennes courtes, insérées devant les yeux sous les bords latéraux du chaperon, se terminant en massue perfoliée. Mandibules bidentées au sommet. Palpes filiformes : les maxillaires aussi longs ou plus longs que les antennes.

Corps elliptique. Corselet subtransverse, un peu plus large postérieurement. Jambes terminées par deux épérons. Pattes postérieures natatoires.

Antennæ breves, antè oculos sub clypei lateribus insertæ, clavæ perfoliatæ terminatæ. Mandibulæ apice bidentatæ. Palpi filiformes : maxillaribus antennarum longitudine vel antennis longioribus.

Corpus ellipticum. Thorax subtransversus, posticè paulò latior. Tibiæ ad apicem bicalcaratæ. Pedes postici natatorii.

OBSERVATIONS.

Les *hydrophiles* ont l'aspect et les habitudes des dytiques, et ont été d'abord confondus dans le même genre. Néanmoins, leurs antennes à peine plus longues que la tête et terminées en massue, les font facilement reconnaître. D'ailleurs, leurs palpes maxillaires aussi longs et quelquefois plus longs que les antennes, les rendent remarquables. Ces insectes ont le corps elliptique et convexe ; le sternum postérieur en épine ; des pattes comprimées, natatoires et dont les tarses semblent n'avoir que quatre articles, quoiqu'ils en aient réellement cinq. Enfin, ils n'offrent que des couleurs sombres. Leurs larves sont allongées - coniques, vermiformes, munies de six pattes, à tête grosse, à bouche armée de deux fortes mandibules. Elles sont carnassières, très-voraces, et respirent par l'extrémité postérieure de leur corps.

Si les *hydrophiles* tiennent encore un peu des carabiens aquatiques par leur forme générale et leurs habitudes, on sent que leurs rapports les rapprochent davantage des insectes zoophages et des nécrophages qui viennent après eux.

ESPECES.

1. Hydrophile brun. *Hydrophilus piceus*.

H. niger; sterno canaliculato, posticè spinoso; elytris substriatis.

Dytiscus piceus. Lin. Le gr. hydrophile. Geoff. 1. p. 182. pl. 3. f. 1.

Hydrophilus piceus. Fab. él. 1. p. 249.

Oliv. col. 3. n.º 39. pl. 1. f. 2. a. b. c. d.

Latr. gen. 2. p. 65.

Habite en Europe, dans les eaux douces.

2. Hydrophile luride. *Hydrophilus luridus*.

H. fusco griseoque flavescens, nigro maculatus; elytris striis punctato-crenatis.

Dytiscus luridus. Lin. *Hydroph. luridus*. Fab. él. 1. p. 253.

Oliv. col. 3. n.º 39. pl. 1. f. 3. a. b. c. f.

Panz. fasc. 7. t. 3. Latr. gen. 2. p. 66.

Habite en Europe, dans les eaux douces.

Etc.

SPERCHÉ. (Spercheus.)

Antennes courtes, de six articles, insérées sous les bords latéraux du chaperon; les cinq derniers articles formant une massue. Mandibules bidentées au sommet.

Corps ovale, subhémisphérique, très-convexe. Corselet échancré antérieurement.

Antennæ breves, sex articulatae, sub clypei lateribus anticis insertae: articulis quinque ultimis clavam formantibus. Mandibulae apice bidentato.

Corpus ovale, subhemisphaericum, valdè convexum. Thorax anticè emarginatus.

OBSERVATIONS.

Le *sperché* tient de très-près aux hydrophiles; mais cet insecte aquatique est moins nageur, ses pattes postérieures paraissent moins propres à la natation, et les cinq articles de ses tarses sont plus distincts. Il est remarquable par ses

antennes à six articles , dont le premier est allongé , et les autres forment la massue.

ESPECE.

γ. Sperché échancré. *Spercheus emarginatus*.

Spercheus emarginatus. Fab. é. 1. p. 248.

Lat. gen. 2. p. 63, et vol. 1. tab. 9. f. 4.

Hydrophilus. Illig. col. Bor. 1. p. 242.

Panz. fasc. 91, t. 4.

Habite en Allemagne , dans les eaux,

GYRIN. (Gyrinus.)

Antennes plus courtes que la tête , et étant insérées chacune dans une fossette latérale ; ayant à leur base un appendice saillant latéralement ; à articles serrés , constituant une massue fusiforme. Quatre palpes articulés. Deux yeux apparens tant en dessus qu'en dessous.

Corps ovale. Tête en partie enfoncée dans le corselet. Pattes postérieures natatoires ; les deux antérieures plus longues.

Antennæ capite breviores , in foveâ laterali insertæ , appendice basilari hinc prominulo instructæ : articulis densè congestis clavam fusiformem formantibus. Palpi articulati quatuor. Oculi duo , supernè infernèque conspicui.

Corpus ovatum. Caput thorace partim insertum. Pedes postici natatorii : antiqui duo aliis longiores.

OBSERVATIONS.

Les *gyrins* n'ont réellement que quatre palpes articulés et

tiennent de très-près aux hydrophiles. Ils leur ressemblent par leur forme générale, et parce qu'ils ont aussi des antennes en massue; mais leurs palpes antérieurs sont plus courts. Leurs yeux étant apparens, tant en dessus qu'en dessous, paraissent au nombre de quatre. L'appendice latéral de la base de leurs antennes, paraît être une expansion de l'un des deux articles inférieurs, et leur donne un rapport avec le dryops.

Ces insectes ont le corps elliptique, légèrement déprimé, à bords tranchans. Ils sont remarquables en ce que leurs pattes antérieures sont plus longues que les autres. Ils le sont aussi par leur manière de nager, car ils font dans l'eau ou à sa surface, des tours et des détours, la plupart circulaires, avec une rapidité surprenante. Leurs larves ressemblent, en quelque sorte, à de petites scolopendres: elles n'ont néanmoins que six pattes attachées aux trois premiers anneaux du corps.

ESPECES.

1. Gyrin nageur. *Gyrinus natator*.

G. cærulescenti-nitidus; *elytris punctato-striatis*; *pedibus ferrugineis*.

Gyrinus natator. Lin. Fab. él. 1. p. 274.

Oliv. col. 3. n.º 41. pl. 1. f. 1.

Le tourniquet. Geoff. 1. p. 194. pl. 3. f. 3.

Gyrinus natator. Latr. gen. 2: p. 60. Panz. fasc. 3. t. 5.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

2. Gyrin strié. *Gyrinus striatus*.

G. viridis, *nitans*; *thoracis elytrorumque margins pallido*; *elytris striatis*.

Gyrinus striatus. Fab. él. 1. p. 275.

Oliv. col. 3. n.º 41. pl. 1. f. 2. a. b.

Habite la côte de Barbarie, l'Espagne, dans les eaux douces. Etc.

DRYOPS. (Dryops.)

Antennes très-courtes, insérées dans une cavité sous les yeux, ayant le premier ou le second article de la base prolongé d'un côté en une palette auriforme : les autres articles serrés, formant une massue oblongue, subfusiforme. Mandibules non saillantes, bidentées au sommet. Quatre palpes courts.

Corps ovale, convexe. Tête enfoncée dans le corselet. Pattes ambulatoires.

Antennæ brevissimæ, infrà oculos in fossulâ insertæ ; articulo baseos primo vel secundo in spatulam auriformem latere producto : articulis aliis congestis, clavam subfusiformem componentibus. Mandibulæ non exsertæ, apice bidentatæ. Palpi quatuor breves.

Corpus ovatum, convexo-cylindraceum. Caput partim thoraci intrusum. Pedes ambulatorii.

OBSERVATIONS.

Le *dryops* est un petit coléoptère vivant dans l'eau ou parmi les plantes aquatiques, et que l'on soupçonne se nourrir des petits insectes aquatiques qu'il peut attraper. Ses antennes lui donnent des rapports avec les gyrins; et, par la forme de son corps, il semble en avoir avec les dermestes.

ESPÈCE.

1. *Dryops auriculé. Dryops auriculatus.*

Dryops auriculé. Oliv. col. 3. n.º 41 bis. pl. 1. f. 1.

Dermeste à oreilles. Geoff. 1. p. 103. n.º 11.

Dryops auriculatus. Latr. gen. 2. p. 55.

Parvus prolificornis. Fab. G. 1. p. 33a.

Panz. fasc. 13. t. 1.

Habite en Europe, sur les plantes aquatiques.

ELOPHORE. (Elophorus.)

Antennes très-courtes, terminées en massue solide, ovoïde, ou allongée. Mandibules simples à leur extrémité. Mâchoires bifides. Le dernier article des palpes, soit plus gros et ovale, soit cylindrique-subulé.

Corps ovale-oblong, aplati en dessous. Corcelet subtransverse ou carré. Pattes ambulatoires.

Antennae brevissimae, clavatae solidae, terminatae : clavatae obovatae, vel elongatae. Mandibulae apice simplices. Maxillae bifidae. Palporum articulus ultimus vel crassior, subovalis, vel cylindrico-subulatus.

Corpus ovato-elongatum, subtilius depressum. Thorax subtransversus aut quadratus. Pedes ambulatorii.

OBSERVATIONS.

Les élophores sont de petits coléoptères que l'on rencontre dans l'eau, et plus souvent sur les plantes aquatiques; qui marchent plus qu'ils ne nagent, qui semblent avoir quelques rapports avec les hydrophiles, et néanmoins qui en ont aussi avec les nécrophages. Ceux qui ont le dernier article des palpes plus gros et ovale, sont les élophores de M. Latreille; et ceux dont le dernier article des palpes est cylindrique-subulé, constituent ses *hydrænes*. Ces derniers ont la massue des antennes plus allongée.

E S P E C E S.

1. Elophore aquatique. *Elophorus aquaticus*.*E. fuscus*; *thorace rugoso elytris fusco-æneis*.*Silpha aquatica*. Lin. *Dermestes*. Geoff. 1. p. 105. n.º 15.*Elophorus aquaticus*. Fab. *él.* 1. p. 277. Panz. fasc. 26. t. 6.

Oliv. col. 3. n.º 38. pl. 1. f. 1.

Elophorus aquaticus. Latr. *gen.* 2. p. 68. *Ejisd.* hist. nat., etc.

10. p. 74. pl. 81. f. 9.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

2. Elophore allongé. *Elophorus elongatus*.*E. thorace punctato aneo*; *elytris porcatis fuscis*.*Elophorus elongatus*. Fab. *él.* 1. p. 277.Oliv. col. 3. n.º 38. pl. 1. f. 4. Latr. *gen.* 2. p. 69.

Panz. fasc. 26. t. 7.

Habite en France, en Allemagne, dans les eaux stagnantes.

3. Elophore des rivages. *Elophorus riparius*.*E. nigro-æneus*, *capite thoraceque impresso-punctatus*;
thorace subsemi-orbiculato.*Hydræna riparia*. Illig. col. Bor. 1. p. 279.Lat. *gen.* 2. p. 79.

Habite en Europe, dans les eaux douces.

SPHÉRIDIE. (Sphæridium.)

Antennes plus courtes que le corselet, de neuf articles : les trois derniers formant une massue perfoliée. Mandibules courtes, simples, pointues. Mâchoires à deux lobes. Palpes filiformes.

Corps hémisphérique, aplati en dessous. Corselet transverse, postérieurement de la largeur des élytres. Jambes épineuses.

Antennæ thorace breviores, novem-articulatæ : articulis tribus ultimis clavam perfoliatam formanti-

bus. Mandibulae breviusculae, simplices, acutae. Maxillae bilobae. Palpi filiformes.

Corpus hemisphaericum, subtus planum. Thorax transversus, postice elytrorum latitudine. Tarsus spinosus.

Le genre des sphéridies est, quant à présent, le seul de sa famille. Il comprend de petits coléoptères terrestres, à corps hémisphérique, glabre et à tête petite, inclinée, en partie enfoncée dans le corselet. Les cinq articles de leurs tarses sont distincts, et le premier est aussi long au moins que le second. Les palpes maxillaires sont fort allongés, et leur second article est très-renflé. On trouve ces insectes dans les bouses et les fientes des animaux.

1. Sphéridie à quatre taches. *Sphaeridium scarabaeoides*.
S. ovatum; atrum; elytris maculis duabus ferrugineis.
Sphaeridium scarabaeoides. Fab. el. 1. p. 92. Latr. gen. 2. p. 71.

Dermestes scarabaeoides. Lin. Geoff. 1. p. 106. n.° 17.

Sph. scarabaeoides. Oliv. col. 2. n.° 15. pl. 1. f. 1.

Panz. fasc. 6. 4. 2.

Habite en Europe. M. Latreille en cite plusieurs variétés.

Etc.

LES BYRRHIENS.

Sternum antérieur s'avancant en mentonnière vers la bouche.

Dans les byrrhiens, le sternum antérieur s'avance toujours d'une manière remarquable, quoiqu'un plus ou moins considérablement, selon les races, et semble for-

mer une mentonnière sous la bouche ou près de la bouche.

Outré ce caractère, reconnu par M. Latreille, les pattes et souvent les antennes en offrent un autre qui est fort remarquable. Lorsqu'on touche ou que l'on saisit l'animal, il fait le mort, et replie ses pattes et ses antennes de manière que ces parties, en quelque sorte, disparaissent. Les pattes se replient et les jambes, souvent même les tarsi, s'appliquent dans des rainures qui les cachent en partie. Il y en a dont les antennes se logent alors dans des rainures pectorales, et d'autres qui logent ces antennes dans des cavités aux angles antérieurs du corselet.

Le corps des byrrhiens est ovoïde, convexe, à abdomen bien recouvert par les élytres. Le corselet est transversal.

DIVISION DES BYRRHIENS.

(1) Antennes coudées : mandibules saillantes, aussi longues, ou presque aussi longues que la tête.

Escarbot.

(2) Antennes non coudées : mandibules peu ou point saillantes.

(a) Antennes en massue allongée, perfoliée.

Byrrhe.

(b) Antennes en massue courte, brusque.

(→) Menton très-grand, en forme de bouclier.

Nosodendre.

(→→) Menton non en forme de bouclier.

* Massue des antennes dentée.

Throsque.

** Massue des antennes non dentée.

Anthrène.

Mégatome.

ESCARBOT. (Hister.)

Antennes plus courtes que le corselet, coudées, terminées en massue solide. Mandibules cornées, avancées. Mâchoires presque membraneuses.

Corps ovale-arrondi, un peu convexe. Corselet large, échancré antérieurement. Tête petite, reçue dans l'échancrure du corselet. Pattes à jambes élargies, comprimées, dentées. Anus à découvert dans la plupart.

Antennæ thorace breviores, fractæ, clavæ solidæ terminatæ. Mandibulæ corneæ, porrectæ. Maxilla submembranaceæ.

Corpus ovato-rotundatum, convexiusculum. Thorax latus, anticè emarginatus. Caput parvum, thorace parùm reconditum. Pedes tibiis dilatato-compressis, dentatis. Elytra sæpius abdomine breviora.

OBSERVATIONS.

Les *escarbots* sont de petits coléoptères à corps dur, ovale, arrondi, médiocrement convexe; remarquables par leur tête petite, en partie cachée sous le corselet, et par leurs élytres qui laissent souvent l'anus à découvert. Leurs antennes sont coudées, leur premier article étant fort long; et les trois derniers, qui sont très-serrés, forment la massue, en bouton presque solide. On trouve ces insectes dans les fumiers, les fientes, les charognes, sous les écorces, etc. Ils contractent leurs pattes et feignent d'être morts lorsqu'on les prend.

ESPECES.

1. Escarbot unicolor. *Hister unicolor.*

H. niger, nitens; elytris substriatis; tibiis anticis multidentatis. Oliv.

Hister unicolor. Lin. Latr. gen. 2. p. 47.

Escarbot noir (*attelabus*). Geoff. 1. p. 94. p. 1. f. 4.

Hister unicolor. Fab. él. 1. p. 84. Panz. fasc. 4. t. 2.

Oliv. col. 1. n.º 8. pl. 1. f. 1.

Habite en Europe.

2. Escarbot quadrimaculé. *Hister quadrimaculatus*.

H. niger; *elytris substriatis*, *maculis duabus rubris*; *in unam interdum connatis*.

Hister quadrimaculatus. Lin. Fab. él. 1. p. 88.

Oliv. col. 1. n.º 8. pl. 3. f. 18. a. b.

2. *Hister reniformis*. Oliv. pl. 1. f. 5. a. b. c.

3. *Hister bipustulatus*. Oliv. pl. 3. f. 19. a. b.

An hister sinuatus? Fab. él. 1. p. 87.

Habite en France, surtout dans les provinces méridionales, etc.

Etc.

BYRRHÉ. (Byrrhus.)

Antennes plus courtes que le corselet ; à massue oblongue, perfoliée. Mandibules courtes. Palpes inégaux, un peu en massue.

Corps ovale, convexe, presque gibbeux. Tête petite, très-inclinée. Pattes contractiles.

Antennæ thorace paulò breviores ; clavæ oblongæ perfoliatæ. Mandibulæ breves. Palpi inæquales , subæquali.

Corpus ovatum , convexum , subgibbum. Caput parvum , valdè deflexum. Pedes contractiles.

OBSERVATIONS.

Les *byrrhes* sont de petits coléoptères noirâtres qui ont beaucoup de rapports avec les anthrènes, les throsques, etc. Leurs antennes ne sont point coudées comme celles des escarbots ; leurs palpes maxillaires ne sont point terminés en hache comme ceux des throsques ; enfin, leurs pattes sont

très-contractiles, comme dans les anthrènes. On trouve les byrrhes à terre, sur le bord des chemins et souvent dans les bois.

ESPECES.

1. Byrrhe pileole. *Byrrhus pileola*.

B. subtilis niger; *stipræ fuliginosus*; *cicada dorsellus atris*, *interruptis*.

Byrrhus pileola. Latr. Fab. d. 1. p. 103.

Oliv. col. 2. n.° 13. pl. 1. f. 1. a. b.

Latr. gen. 2. p. 48. et hist. nat. p. p. 203. pl. 73. f. 1.

Panz. fasc. 4. t. 3.

Habite en Europe, dans les champs.

2. Byrrhe fascié. *Byrrhus fasciatus*.

B. nigricans; *elytris fasciis undatis mediâ rufa*. F.

Cicade à bande. Geoff. 1. p. 116. n.° 2.

Byrrhus fasciatus. Fab. d. 1. p. 103.

Oliv. col. 2. n.° 13. pl. 1. f. 2.

Habite en Europe.

Etc.

NOSODENDRE. (Nosodendron.)

Antennes un peu plus courtes que le corselet; à massue subovale, comprimée, triarticulée. Mâchoires bifides. Palpes courts, filiformes. Menton très-grand, arrondi, clypéacé.

Corps elliptique, subhémisphérique, convexe. Corselet transverse. Pattes courtes.

Antennæ thorace paulò breviores; clavâ subovatâ, compressâ, triarticulatâ. Maxillæ bifidæ. Palpi breves, filiformes. Mentum maximum, rotundatum, clypeaceum.

Corpus ellipticum, subhæmisphæricum, convexum. Thorax transversus. Pedes breves.

OBSERVATIONS.

Les *nosodendres* sont voisins des byrrhes et leur ressemblent par la forme du corps. Ils en sont néanmoins bien distingués par la massue brusque et triarticulée de leurs antennes, et surtout par leur menton clypéacé qui cache une partie de la lèvre inférieure. Leur sternum antérieur, quoique avancé et dilaté, ne s'appuie point contre la bouche.

ESPECE.

1. Nosodendre fasciculé. *Nosodendron fasciculare*.

N. nigrum ; *elytris fasciculis seriatis fusco-ferrugineis*.

Sphæridium fasciculare. Fab. él. 1. p. 94.

Panz. fasc. 24. t. 2.

Byrrhus fascicularis. Oliv. col. 2. n.º 13. tab. 2. f. 7. a. b.

Nosodendron fasciculare. Latr. gen. 2. p. 44. Oliv. Encycl.

Habite près de Paris, dans les ulcères des ormes, que les larves produisent.

Voyez les *N. hirtum* et *striatum* d'Olivier dans l'Encyclopédie.

THROSCUE. (Throscus.)

Antennes de la longueur du corselet, de onze articles : les trois derniers formant une massue dentée. Mandibules à sommet pointu, crochu, entier. Palpes maxillaires à dernier article en hache.

Corps ovale-oblong ou elliptique, déprimé ; corselet postérieurement de la largeur des élytres, à angles postérieurs pointus. Pattes contractiles.

Antennæ thoracis longitudine, undecim-articulatæ : articulis tribus ultimis clavam serratam formantibus. Mandibulæ apice acuto, integro, uncinato. Palpi maxillares, articulo ultimo securiformi.

Corpus ovato - oblongum , aut ellipticum , depressum. Thorax posticè elytrorum latitudine : angustior. Posticis acutis. Pedes contractiles.

OBSERVATIONS.

Le *throsque* a été rapporté, tantôt au genre des taupin tantôt à celui des dermestes. Il paraît, d'après les observations de M. Latreille, qu'il doit constituer un genre particulier qu'il faut rapprocher des byrrhes et des anthrène

ESPEC E.

1. *Throsque dermestode. Throsus dermestoides.*

Elater dermestoides. Lin. *Elater*. Geoff. 1. p. 137. n.° 16.

Elater clavicornis. Oliv. col. 2. n.° 31. pl. 8. f. 85. a. b.

Dermestes adstrictor. Fab. él. 1. p. 316.

Throsus dermestoides. Lat. gen. 2. p. 37. et vol. 1. t. 8. f. 1.

Habite en Europe.


ANTHRÈNE. (Anthrenus.)

Antennes un peu plus courtes que le corselet, terminées en massue solide. Mandibules courtes. Palpes filiformes.

Corps ovale, arrondi, écailleux. Corselet plus étroit antérieurement. Tête petite, inclinée, cachée sous le corselet. Pattes et antennes contractiles. Les jambes repliées sur les cuisses dans la contraction.

Antennæ thorace paulò breviores : clavæ solidæ. Mandibulæ breves. Palpi filiformes.

Corpus ovatum, rotundatum, squamulosum. Thorax anticè angustior. Caput parvum, thoraci intrusum, deflexum. Pedes antennæque contractiles. In contractione, tibiæ ad femora replicatæ.



OBSERVATIONS.

Les *anthrènes* sont de petits coléoptères, la plupart ornés de couleurs variées et agréables, qu'ils doivent à de petites écailles colorées et pulvériformes, qui couvrent leur corps et qui se détachent facilement. Leur corps est un peu convexe en dessous. Au moindre danger, ces insectes replient leurs antennes et leurs pattes, et les logent dans des cavités ou des rainures propres à les recevoir : leurs ailes se replient sur le côté postérieur des cuisses.

Ces insectes se trouvent, en général, sur les fleurs ; mais leurs larves vivent sur les cadavres desséchés, les peleries, et dans les cabinets d'histoire naturelle, où elles font de grands dégâts. Ces larves sont petites et ont des rapports avec celles des dermestes, étant chargées de poils sur les côtés et au derrière, presque de la même manière.

ESPECES.

Anthrène de la scrophulaire. *Anthrenus scrophulariæ*.

A. niger ; *elytris albo-maculatis* : sutura sanguinea.
Byrrhus scrophulariæ. Lin.

Anthrenus scrophulariæ. Fab. él. 1. p. 107.

Oliv. col. 2. n.º 14. pl. 1. f. 5. a. b.

Latr. gen. 2. p. 38. et hist. nat. vol. 9. p. 219. pl. 79. f. 1.

Panz. fasc. 3. t. 11.

Habite en Europe.

Anthrène fasciée. *Anthrenus verbasci*.

A. niger ; *elytris fasciis tribus undatis*, *albis*.

Byrrhus verbasci. Lin.

Anthrenus verbasci. Fab. Latr. gen. 2. p. 39.

Oliv. col. 2. n.º 14. pl. 1. f. 2. a. b. c. d.

Geoff. 1. p. 115. n.º 2. L'Amonette.

Habite en Europe. Sa larve est destructrice des collections d'insectes, etc.

(2) Mandibules allongées, comprimées, et arquées à leur extrémité.

(a) Extrémité des mandibules échancrée, bifide ou munie d'une dent.

(+→) Massue des antennes brusque, courte, ovale ou orbiculaire.

Nitidule.

Dacné.

(+→→) Massue des antennes allongée.

* Palpes, soit filiformes, soit plus gros au bout, mais point terminés en pointe.

Ips.

Scaphidie.

** Palpes se terminant en alène.

Cholève.

(b) Extrémité des mandibules entière.

Bouclier.


Nécrophore.

DERMESTE. (Dermestes.)

Antennes plus courtes que le corselet; à massue ovale, perfoliée, de trois articles. Mandibules courtes, épaisses, presque droites, dentelées sous leur extrémité. Palpes courts, filiformes.

Tête petite, inolinée. Corps épais, ovale-oblong, convexe. Corselet subtransverse, plus large postérieurement.

Antennae thorace breviores : clavæ ovalæ, perfoliatæ, triarticulatæ. Mandibulae breves, crassæ, sub-



ectæ , infra apicem denticulatæ. Palpi breves , filiformes.

Caput parvum , sub thorace inflexum. Corpus obov-oblongum , crassum , convexum. Thorax subtransversus , posticè latior.

OBSERVATIONS.

Les *dermestes* , en général , se nourrissent , dans l'état de larve , de substances animales ; et plusieurs de leurs espèces sont connues , depuis long-tems , par les dégâts que leurs larves causent dans nos habitations , en rongant pelleteries , les animaux préparés que l'on conserve dans les cabinets d'histoire naturelle ; en un mot , tous les objets qui proviennent des animaux , et que nous employons à quelque usage. Ces insectes ont des rapports avec les antrènes , avec les nitidules , etc. Leurs larves sont garnies de longs poils. Dans nos habitations , ces larves , celles des antrènes , et celles des teignes , nous causent les plus grands dommages.

ESPÈCES.

Dermeste du lard. *Dermestes lardarius.*

D. niger ; elytris anticè cinereis , nigro-punctatis.

Dermestes lardarius. Lin. Fab. él. 1. p. 312.

Oliv. col. 2. n.º 9. pl. 1. f. 1. a. b. Geoff. 1. p. 101. n. 5.

Latr. gen. 2. p. 31.

Habite en Europe , dans les maisons.

Dermeste des pelleteries. *Dermestes pellio.*

Derm. niger ; elytris punctis duobus albis.

Dermestes pellio. Lin. Fab. él. 1. p. 313.

Oliv. col. 2. n.º 9. pl. 2. f. 11. Geoff. 1. p. 105. n.º 4.

Latr. gen. 2. p. 32.

Habite en Europe. Attaque les pelleteries , les Musées.

3. Dermeste souris. *Dermestes murinus*.

D. oblongus, tomentosus, nigro alboque nebulosus; abdomine niveo.

Dermestes murinus. Lin. Fab. éf. 1. p. 314.

Oliv. col. 2. n.º 9. pl. 1. f. 3. Panz. fasc. 40. t. 10.

Habite en Europe, à la campagne, dans les cadavres.

Etc.

NITIDULE. (Nitidula.)

Antennes plus courtes que le corselet, terminées en massue brusque, ovale ou oblongue, comprimée, presque solide. Mandibules un peu saillantes, échancrées ou à deux dents. Palpes presque filiformes, un peu plus gros au bout.

Corps elliptique ou ovale-oblong, un peu déprimé. Corselet bordé, aussi large que les élytres postérieurement.

Antennæ thorace breviores, clavæ abruptæ, ovatæ vel rotundatæ, compressæ, subsolidæ terminatæ. Mandibulæ partim exsertæ, apice emarginatæ aut bidentatæ. Palpi subfiliformes; extremitate paulò crassiores.

Corpus ellipticum, vel ovato-oblongum, subdepressum. Thorax marginatus posticè elytrorum latitudine.

OBSERVATIONS.

Les nitidules ne tiennent aux dermestes que par la massue brusque et raccourcie de leurs antennes. Elles se rapprochent davantage des boucliers et genres avoisinans, par leurs mandibules allongées, et parce que la plupart rongent des substances animales desséchées ou l'écorce pourrie des vieux arbres.

Les unes ont les trois premiers articles des tarses courts, larges ou dilatés, et garnis de brosses en dessous : ce sont les nitidules, les bytures et les cerques de M. Latreille.

Les autres ont les quatre premiers articles des tarses presque cylindriques et peu différens des autres articles : elles constituent ses genres thymale, colobique et micropèple.

Dans les insectes de ces coupes diverses, le corselet est plus ou moins bordé, et souvent ses bords latéraux sont minces et tranchans. La tête est petite, en partie cachée dans l'échancrure antérieure du corselet. Ces insectes sont la plupart fort petits.

ESPÈCES.

[Les trois premiers articles des tarses courts et dilatés.]

1. Nitidule obscure. *Nitidula obscura*.

N. ovata, nigra, obscura; pedibus piceis. F.

Nitidula obscura. Fab. él. 1. p. 348.

Oliv. col. 2. n.º 12. pl. 1. f. 3. a. b.

Dermestes. Geoff. 1. p. 108. n.º 21.

Habite en Europe, dans les cadavres.

2. Nitidule bipustulée. *Nitidula bipustulata*.

N. ovata, nigra; elytris puncto rubro. F.

Silpha bipustulata. Lin.

Nitidula bipustulata. Fab. él. 1. p. 347. Latr. gen. 2. p. 11.

Oliv. col. 2. n.º 12. pl. 1. f. 2. a. b.

Dermestes. Geoff. 1. p. 100. n.º 3.

Habite en Europe, dans les cadavres.

3. Nitidule tomenteuse. *Nitidula tomentosa*.

N. ovato-oblonga, nigra, tomento rufo-flavescente vel olivaceo-murino tecta; antennis pedibusque flavo-rufis.

Byturus tomentosus. Lat. gen. 2. p. 18.

Dermestes tomentosus. Fab. cl. 1. p. 316 et *D. fumatus* ejusd.

Oliv. col. 2. n.º 9. suppl. tab. 3. f. 17. a. b. c. d.

Dermestes. Geoff. 1. p. 102. n.º 8. Paüz. fasc. 97. t. 4.
Habite en Europe.

4. Nitidule puce. *Nitidula pulicaria*.

N. oblonga, nigra; elytris abbreviatis; abdomine acuta.

Dermestes pulicarius. Lin.

Spharidium pulicarium. Fab. cl. 1. p. 98.

Nitidula pulicaria. Oliv. col. 2. n.º 12. pl. 3. f. 27. a. b.

Cercus pulicarius. Latr. gen. 2. p. 15.

Habite en Europe, sur les fleurs.

[Les quatre premiers articles des tarses subcylindriques.]

5. Nitidule colobique. *Nitidula colobicus*.

N. elongato-orbits, obscurè nigricans, supernè hirta; elytris punctato-striatis.

Colobicus marginatus. Latr. p. 2. p. 10, et vol. 1. t. 16. f. 1.

Nitidula hirta. Ross. fn. etr. 1. p. 59. t. 3. f. 9.

Habite le midi de la France, sous l'écorce des arbres.

6. Nitidule ferrugineuse. *Nitidula ferruginea*.

N. ferruginea; elytris lineis elevatis senis nigricantibus.

Silpha ferruginea. Lin. *Peltis ferruginea*. Fab. cl. 1. p. 344.

Silpha ferruginea. Oliv. col. 2. n.º 11. pl. 2. f. 13. a. b.

Thymalus ferrugineus. Latr. gen. 2. p. 9.

Peltis. Paüz. fasc. 75. t. 17.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

Etc.

D A C N É. (Dacne.)

Antennes plus courtes que le corselet; à massue brusque, grande, subovale, perfoliée, comprimée. Mandibules à sommet bifide. Le dernier article des palpes plus épais.

Corps oblong, épais, convexe. Corselet presque carré. Tarses courts.

Antennæ thorace breviores; clavâ magnâ, abruptâ, subovatâ perfoliatâ, compressâ. Mandibulæ apicè bifido. Palporum articulus ultimus crassior.

Corpus oblongum, crassum, convexum. Thorax subquadratus. Tarsi breves.

OBSERVATIONS.

Les *dacnès* tiennent aux nitidules par la massue de leurs antennes, et aux ips par leur corps allongé, leurs habitudes, la célérité de leurs mouvemens. Leur corps est plus convexe et à bords latéraux plus inclinés que celui des nitidules.

ESPÈCES.

1. *Dacné huméral. Dacne humeralis.*

D. nigra; capite thorace elytrorum puncto baseos pedibusque rufis.

Dacne humeralis. Latr. hist. nat., etc., 10. p. 13. pl. 81. f. 1.

Ejusd. gen. 2. p. 20. *Dermestes.* Panz. fasc. 4. t. 9.

Engis humeralis. Fab. él. 2. p. 583.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

2. *Dacné à bandes. Dacne fasciata.*

D. atra; elytris fasciis duabus rufis: anteriore nigro-maculatâ.

Dacne fasciata. Latr. *Engis fasciata.* Fab. él. 2. p. 582.

Habite l'Amérique septentrionale.

3. *Dacné cou-rouge. Dacne sanguinicollis.*

D. atra; antennis thorace elytri singuli maculis duabus pedibusque rubro-sanguineis.

Dacne sanguinicollis. Lat.

Engis sanguinicollis. Fab. él. 2. p. 584.

Panz. fasc. 6. t. 6. *Dermestes.*

Habite en France, en Allemagne.

Etc. Ajoutez l'*engis rufifrons* de Fabricius.

I P S. (Ips.)

Antennes de la longueur du corselet ou environ ; à massue oblongue , étroite , de trois articles séparés. Mandibules bifides au sommet.

Corps oblong , convexe. Tous les articles des tarses allongés , grêles.

Antennæ circiter thoracis longitudine : clavus oblongus , angustus ; articulis tribus valde distinctis. Mandibulæ apice bifidæ.

Corpus oblongum , convexum. Tarsorum articuli omnes elongati , graciles.

OBSERVATIONS.

Sous le nom d'*ips*, on avait réuni différens coléoptères très-petits , à corps allongé et étroit ; mais il ne s'agit ici que de ceux qui appartiennent à la division des pentamères. Ils tiennent aux nitidules par leurs rapports , et s'en distinguent par la massue de leurs antennes.

ESPÈCE.

1. *Ips cellerier. Ips cellaris.*

I. testaceo-ferruginea , punctata ; thorace crenulato.

Ips cellaris. Oliv. col. 2. n.º 18 pl. 1. f. 3. a. b.

Latr. gen. 2. p. 21.

Dermestes cellaris. Fab. él. 1. p. 319.

Dermestes. Panz. fasc. 39. t. 14.

Habite en Europe. Ses élytres sont un peu pubescentes.

Etc. Le *dermestes fuscicornis* de Fabr. est de ce genre.

SCAPHIDIE. (Scaphidium.)

Antennes presque de la longueur du corselet ; à massue allongée , formée de cinq articles séparés , sublo-

buleux ou hémisphériques. Mandibules bifides au sommet. Palpes filiformes.

Corps ovale, épais, en pointe aux deux bouts. Elytres subtronquées au bout. Pattes grêles.

Antennæ thoracis sublongitudine ; clavæ elongatæ, quinque articulatæ : articulis globulosis aut hemisphæricis, distinctis. Mandibulæ apice bifidæ. Palpi filiformes.

Corpus ovale, crassum, utraq. extremitate acutum. Elytra apice truncata. Pedes graciles.

OBSERVATIONS.

Les *scaphidies* avoisinent les cholèvres par leurs rapports ; mais leurs palpes, quoique filiformes, ne se terminent point en alène. Ces insectes vivent dans les champignons, les feuilles mortes, le bois pourri. Leur corps est un peu convexe ; leurs élytres, tronquées au bout, laissent la pointe de l'abdomen à découvert.

ESPECE.

1. Scaphidie quadrimaculée. *Scaphidium quadrimaculatum*.

S. nigrum, punctulatum ; elytro singulo maculis duabus rubris.

Scaphidium quadrimaculatum. Oliv. col. 2. n.º 20. pl. 1. f. 1.

Latr. hist. nat., etc., 9. p. 247. pl. 78. f. 5. et gen. 2. p. 23.

Scaphidium 4 maculatum. Fab. 61. 2. p. 575.

Panz. fasc. 12. t. 11.

Habite en Europe, sur les champignons, les vieux troncs d'arbres.

2. Scaphidie immaculée. *Scaphidium immaculatum*.

S. atrum, nitidum ; elytris immaculatis, punctato - striatis. F.

Scaphidium immutatum Oliv. col. a. n. 90. pl. t. f. 3. a. b.
Fab. el. 3. p. 576. Latr. gen. 2. p. 24.

Habite en France, parmi les feuilles pourries et sur les champignons.

3. Scaphidie agarinée. *Scaphidium agaricinum*.

S. atrum, *nigrum*; antennis pedibusque rufis.

Silpha agaricina Lin.

Scaphid. agaricinum Oliv. col. a. n. 90. pl. t. f. 4. d. 2.

Fab. el. 3. p. 576. Latr. gen. 2. p. 24.

Panz. fasc. 12. t. 16.

Habite en Europe, sur le boletus *perficulator*.

Etc.

CHOLÈVE. (Choleva.)

Antennes de la longueur du corselet, quelquefois un peu plus longues, grossissant insensiblement vers le bout : les cinq derniers articles formant une masse allongée, perfoliée. Mandibules échancrées au bout. Le dernier article des palpes brusquement aigu, subulé.

Corps ovale, convexe, arqué en dessus : à tête penchée. Corselet transverse, plus large postérieurement.

Antennæ thoracis longitudine, interdum thorace paulo longiores, sensim versus apicem crassiores : articulis quinque ultimis clavam elongatam perfoliatam que formantibus. Mandibulæ apice emarginatæ. Palporum articulo ultimo abruptè scuto, subulato.

Corpus ovale, convexum, superne arcuatum. Capite cernuo. Thorax transversus, posticè latior.

OBSERVATIONS.

Parmi les nécrophages, les *cholèves* sont à-peu-près les seuls qui aient les palpes terminés en alène ou en pointe.

aciculée, ce qui les distingue éminemment. Leurs antennes les rapprochent des boucliers ; mais leurs mandibules ne sont point entières à leur extrémité. Ils ont des élytres aussi longues que l'abdomen et qui ne sont point tronquées au bout comme celles des scaphidiés. Ces insectes sont agiles et se trouvent par terre, sous les pierres ou parmi les ordures.

ESPECES.

1. Cholève triste. *Choleva tristis*.

Ch. nigra ; *antennis pedibusque concoloribus*.

Choleva morio. Latr. hist. nat., etc., 9. p. 251.

Choleva tristis. Lat. gén. 2. p. 28.

Helops tristis. Panz. fasc. 8. t. 1. *Catops morio*? Fab. él. 2. p. 564.

Dermestes. Degeer. ins. 4. p. 216. pl. 8. f. 15. a. b.

Habite en Europe.

2. Cholève soyeux. *Choleva sericea*.

Ch. nigricans, *holosericea* ; *antennis elytris pedibusque obscure fuscis*.

Helops sericeus. Panz. fasc. 73. t. 10.

Choleva sericea. Latr. hist. nat., etc., 9. p. 251.

Choleva villosa ejusd. gén. 2. p. 29.

Habite aux environs de Paris.

Etc. Voyez une monographie de ce genre, dans le volume des Actes de la société Linnéenne.

BOUCLIER. (Silpha.)

— Antennes de la longueur du corselet ou environ, à massue oblongue, grossissant insensiblement, formée de cinq ou six articles. Mandibules à pointe simple et arquée. Palpes filiformes.

— Corps ovale ou ovale-oblong, déprimé. Corselet

— Tome IV.

aplati, clypéiforme, suborbiculaire. Elytres bordées.

Antennæ thoracis circiter longitudine; clava oblonga, sensim crassiore, articulis quinque vel sex formatâ. Mandibulæ acumine simplici arcuatogue terminatæ. Palpi filiformes.

Corpus ovatum vel ovato-oblongum, depressum. Thorax planulatus, clypéiformis, suborbicularis. Elytra marginata.

OBSERVATIONS.

Quelques auteurs crurent trouver des rapports entre les boucliers et les cassides, et de là, pouvoir les réunir dans le même genre. On sait maintenant que les boucliers appartiennent à une division fort différente de celle qui comprend les cassides, et par suite à une autre famille.

Ces insectes ont la tête petite, étroite postérieurement, inclinée, prominente; la massue des antennes allongée, perfoliée; les bords latéraux du corselet un peu débordés; les élytres larges, débordant pareillement sur les côtés. Ils vivent dans les charognes, les fumiers, et ne se nourrissent que de matières animales.

ESPECES.

1. Bouclier à quatre points. *Silpha quadripunctata*.

S. nigra; elytris pallidis: puncto baseos medioque nigris thorace emarginato.

Silpha quadripunctata. Lin. Fab. éli. 1. p. 341.

Oliv. col. 2. n.º 11. pl. 1. f. 7. a. b.

Peltis. Geoff. 1. p. 122. n.º 7. pl. 2. f. 1.

Panz. fasc. 40. t. 18.

Habite en Europe, sur les chênes, y dévorant les chenilles.

2. Bouclier lisse. *Silpha lævigata*.

S. atra; elytris lævibus, subpunctatis.

Silpha lœvigata. Oliv. col. 2. n.º 11. pl. 1. f. 1. b.

Fab. él. 1. p. 340. *Peltis*. Geoff. 1. p. 122. n.º 8.

Habite en France, en Allemagne.

1. Bouclier obscur. *Silpha obscura*.

S. nigra; *elytris punctatis* : *lineis elevatis tribus*; *thorace anticæ truncato*.

Silpha obscura. Lin. Fab. él. 1. p. 340.

Oliv. col. 2. n.º 11. pl. 2. f. 18. Latr. gen. 2. p. 7.

Peltis. n.º 1. Var. B. Geoff. 1. p. 118.

Habite en France, dans les cadavres.

Etc.

N É C R O P H O R E. (Necrophorus.)

Antennes plus courtes que le corselet : à massue brusque, courte, subglobuleuse, perfoliée, quadriarticulée. Mandibules à pointe simple et arquée.

Corps oblong. Tête inclinée. Corselet subdéprimé, débordant, souvent inégal. Elytres tronquées au bout, à bords latéraux abaissés.

Antennæ thorace breviores : clavæ abruptæ, brevi, subglobosæ, perfoliatæ, quadriarticulatæ. Mandibulæ apice acuto simplici arcuato.

Corpus oblongum. Caput nutans. Thorax subdepressus, marginatus, sæpè inæqualis. Elytra apice truncata, marginibus lateralibus inflexis.

OBSERVATIONS.

Les *nécrophores*, très-voisins des boucliers par leurs rapports et par leurs habitudes, les surpassent par la taille ; mais, outre qu'ils ont le corps plus allongé, et que leurs élytres ne sont point bordées, ils en sont très-distingués par les caractères de leurs antennes. Leurs tarses antérieurs sont larges et très-garnis de houpes.

Ces insectes sont agiles, ont une odeur désagréable, et recherchent les corps morts des animaux pour en faire leur curée. On les a nommés *enterreurs*, *porte-morts*, parce qu'ils ont l'instinct d'enterrer les cadavres de petits quadrupèdes, tels que ceux des taupes et des souris dont ils se repaissent ensuite à loisir. C'est aussi dans ces cadavres qu'ils déposent leurs œufs, et que leurs larves doivent vivre.

ESPECES.

1. Nécrophore fossoyeur. *Necrophorus vespillo*.

N. ater, elytris fasciis duplici ferrugineis; antennarum clava rubra.

Silpha vespillo. Lin. *Necrophorus vespillo*. Fab. d. 1. p. 335.

Necrophorus vespillo. Oliv. col. 2. n. 10. pl. 1. f. 1.

Latr. gen. 1. p. 4. Panz. fasc. 2. t. 21.

Dermestes. Geoff. 1. p. 98. n. 1. pl. 1. f. 2.

Habite en Europe, dans les cadavres des taupes, etc.

2. Nécrophore germanique. *Necrophorus germanicus*.

N. ater; fronte margineque elytrorum ferrugineis.

Silpha germanica. Lin. *Necrophorus germanicus*. Fab. d. 1. p. 333.

Necrophorus germanicus. Oliv. 2. n. 10. pl. 1. f. 2.

Panz. fasc. 41. t. 1. *Dermestes*. Geoff. 1. p. 99. n. 2.

Habite en Europe, dans les cadavres.

Etc.

TROISIÈME DIVISION.

PENTAMÈRES LAMELLICORNES.

Leurs antennes sont terminées par une massue lamellée ou feuilletée.

Cette division de la cinquième section des coléoptères, les termine tous, ainsi que la classe des insectes. Elle est très-distincte par le caractère des antennes de ceux qui en font

partie ; et effectivement la massue de ces antennes est formée de lames ou de feuillets allongés, soit disposés en éventail ou comme les feuillets d'un livre, s'ouvrant et se fermant de même, soit rangés d'un côté sur un axe, comme les dents d'un peigne.

Les insectes qui appartiennent à cette division, ne sont plus des coléoptères de très-petite taille, comme la plupart des pentamères clavicornes. Ils sont au moins d'une taille moyenne, et beaucoup parmi eux nous offrent les plus grands et les plus singuliers des coléoptères, par les particularités de forme de leurs parties. Tous ont les tégumens durs, les articles de leurs tarses toujours entiers, et les trachées de l'insecte parfait vésiculaires. Leurs larves ont toujours six pattes, et vivent long-temps ; souvent plusieurs années, avant de se changer en nymphes.

Les *pentamères lamellicornes* sont fort nombreux, véritablement voisins les uns des autres par leurs rapports : en sorte qu'ils semblent ne constituer réellement qu'une seule et grande famille. On les a partagés néanmoins en deux coupes particulières, savoir : en *scarabéides*, et en *lucanides*.

Pour faciliter l'étude de leurs rapports et la connaissance de leurs habitudes diverses, je les ai distribués et divisés de la manière suivante.

DIVISION DES PENT. LAMELLICORNES.

§. *Massue des antennes feuilletée, plicatile. Ses feuillets, rapprochés à leur insertion, s'ouvrent et se ferment comme ceux d'un livre.*

[Les scarabéides.]

[*Ceux dont les larves et les insectes parfaits vivent dans les mêmes lieux.*]

* Partie terminale des mâchoires membraneuse, élargie, transversale. (Scarabéides coprophages.)

(1) Pattes intermédiaires plus écartées que les autres à leur insertion.

(a) Antennes de neuf articles.

Bousier.

Onite.

(b) Antennes de huit articles.

Sitrophe.

(2) Pattes intermédiaires non plus écartées que les autres à leur insertion.

Aphodius.

* Mâchoires longitudinales dont aucune n'est point élargie transversalement.

(1) Antennes de onze articles. (Scarabéides géotrupiens.)

Léthrus.

Géotrupe.

(2) Antennes ayant moins de onze articles.

(a) Labre découvert, saillant, et la lèvre inférieure cachée par le menton.

Trox.

[*Ceux dont les insectes parfaits vivent ailleurs que leurs larves.*]


(b) Labre couvert, et les mandibules entièrement ou en partie membraneuses.

(+) Lèvre inférieure cachée par le menton. Mandibules membraneuses.

Goliath.

Cétoine.

Trichie.



SANS VERTIÈRES.

567

(-+-) Lèvre inférieure saillante, bilobée.

Anisomys.

(c) Labre découvert, saillant, et la lèvre inférieure saillante, bilobée.

Glaphyre.

(d) Labre couvert, apparent ou non apparent, et les mandibules tout-à-fait cornées.

(-+) Labre couvert, mais apparent.

Hanneton.

Rutèle.

Héxodon.

(-+-) Labre non apparent et comme nul.

Scarabé.

§§. *Massue des antennes pectinée. Ses feuillets, un peu écartés à leur insertion. Contenance des dents de peigne, perpendiculaires à l'axe.*

[Les lucanides.]

(1) Antennes non coudées.

Passale.

(2) Antennes coudées.

(a) Corps convexe.

Sinodendre.

Lamprime.

Esale.

(b) Corps déprimé.

Lucane.

LES SCARABÉIDES.

Massue des antennes feuilletée, plicatile.

Ce n'est point par un ensemble de caractères que les scarabéides diffèrent des lucanides, mais seulement par

une particularité de la massue de leurs antennes. Ainsi l'on peut regarder les pentamères lamellicornes comme constituant une grande famille véritablement naturelle. Néanmoins, dans cette grande famille, on en distingue quelques autres, d'un ordre secondaire, qui sont assez distinctes, ce qui montre que, dans ces insectes, les rapports ont été partout bien mis.

En effet, en commençant les scarabéides par ceux dont les insectes parfaits vivent à peu près dans les mêmes lieux que leurs larves, on rencontre d'abord les *coprophages* que M. Latreille a fait connaître et si bien caractérisés. L'on trouve ensuite ses *géotrupiens*, desquels nous rapprochons les *trécs*, comme il l'a fait lui-même, leurs habitudes étant assez analogues à celles des précédents.

Viennent après eux les *scarabéides* dont les insectes parfaits vivent, en général, ailleurs que leurs larves. Or, les premiers de ceux-ci nous offrent, dans les *goliaths*, *cétaines*, *trichies* et *anisonyx*, des *anthophages*, les insectes parfaits de ces scarabéides se trouvant ordinairement sur les fleurs; on rencontre, après ces premiers, des scarabéides vraiment *phyllophages*, tels que les *glaphyres*, *hannetons*, *rutèles* et *hexodons*, les insectes parfaits de ces genres se trouvant sur les feuilles des plantes et surtout des arbres, dont souvent ils les dépouillent en les dévorant rapidement. Enfin, les scarabéides se terminent par le beau genre des scarabés qui, fort nombreux en espèces diverses, ressemble lui-même à une petite famille, et paraît conduire aux *lucanides* par l'analogie des habitudes, les larves des uns et des autres vivant dans les troncs d'arbres, et se nourrissant de leur substance ligneuse plus ou moins décomposée; aussi en trouve-t-on dans le tan.

BOUSIER. (Copris.)

Antennes très-courtes, de neuf articles; à massue vilamellée. Labre caché par le chaperon. Mandibules membranenses. Palpes labiaux velus. Chaperon en demi-cercle.

Corps en ovale court, convexe, très-obtus postérieurement. Corselet grand, large. Ecusson nul ou à peine distinct. Pattes intermédiaires plus écartées entre elles à leur insertion que les autres.

Antennæ brevissimæ, novem articulatæ; clavæ vilamellatæ. Labrum clypeo occultatum. Mandibulæ membranaceæ. Palpi labiales valde hirsuti. Clypeus semi-circularis.

Corpus ovato-abbreviatum, convexum, posticè obusissimum. Thorax magnus, latus. Scutellum nullum ut vix distinctum. Pedes intermediï insertione magis inter se distantes quàm alii.

OBSERVATIONS.

Les bousiers constituent un genre nombreux en espèces, et très-remarquable par la forme particulière de ces insectes. Ils ont le corps court, très-obtus au bout; le corselet grand, large, convexe ou gibbeux; l'abdomen large, court, presque carré; les jambes antérieures dentées en dehors; les pattes postérieures fort longues, à insertion écartée de celle des autres, et rapprochée de l'anus. L'écusson manque ou paraît à peine. La massue de ces insectes est ovale.

C'est dans les bouses de vaches et dans les fientes des animaux que l'on trouve ces insectes; et c'est dans ces

fientes qu'ils déposent leurs œufs et que leurs larves se nourrissent.

Ceux qui forment avec ces fientes, ou même avec des excréments humains, des boules en forme de pillules, en les roulant avec leurs pattes postérieures, et y déposant leurs œufs, ont été distingués sous le nom d'*ateuchus*. Leurs pattes postérieures sont longues et peu dilatées à leur extrémité.

On a conservé le nom de *copris* à ceux dont les pattes antérieures sont un peu longues, et les postérieures un peu dilatées à leur extrémité; ils ne forment point de boules. Néanmoins, on en a séparé, sous le nom d'*onthophages*, ceux qui ont le dernier article des palpes labiaux presque nul ou peu distinct.

Les bousiers sont très-nombreux et constituent un genre si naturel qu'il est difficile de le diviser nettement.

E S P E C E S.

Bousiers rouleurs, à jambes postérieures plus longues.

1. Bousier sacré. *Copris sacer*.

C. clypeo sexdentato; thorace inermi crenulato; tibiis porticis ciliatis; elytris lævibus.

Scarabæus sacer. Lin. *Ateuchus sacer*. Fab. él. 1. p. 54.

Ateuchus sacer. Lat. gen. 2. p. 77.

Scarabæus sacer. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 8. f. 59. a. b.

Habite l'Europe australe, l'Afrique.

2. Bousier flagellé. *Copris flagellatus*.

C. niger; clypeo emarginato; thorace olyfrique scabris.

Scarabé flagellé. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 7. f. 51.

Ateuchus flagellatus. Fab. él. 1. p. 59. Latr. gen. 2. p. 78.

Habite l'Afrique, l'Europe australe. On en fait un *gymno-pleurus*, parce qu'il a un anneau à la base externe des élytres.

3. Bousier rouleux. *Copris volvens*.

C. niger, opacus, lævis; clypeo emarginato; thorace posticè rotundato; elyfris integris.

Ateuchus volvens: Fab. él. 1. p. 60. Latr. gen. 2. p. 78.

Scarabæus volvens. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 10. f. 89.

Habite l'Amérique septentrionale.

Bousiers non rouleux, à jambes antérieures un peu longues.

4. Bousier lunaire. *Copris lunaris*.

C. thorace tricorni: medio obtuso bifido; capitis cornu erecto; clypeo emarginato.

Scarabæus lunaris. Lin. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 5. f. 36. a. b.

Copris lunaris. Fab. él. 1. p. 36. Latr. gen. 2. p. 75.

Bousier capucin. Geoff. 1. p. 88. n.º 1.

Habite en Europe, dans les fientes.

5. Bousier taureau. *Copris taurus*.

C. thorace mutico; occipite cornubus duobus reclinatis arcuatis.

Scarabæus taurus. Lin.

Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 8. f. 63. a. b. Geoff. 1. p. 92. n.º 10.

Copris taurus. Fab. él. 1. p. 45. Panz. fasc. 12. t. 3.

Habite en Europe. *Onthophagus*. Lat.

Etc.

O N I T E. (Onitis.)

Antennes très-courtes, de neuf articles; à massue ovale, subtuniquée. Labre caché sous le chaperon. Mandibules petites, membraneuses.

Corps ovale-oblong; corselet grand, convexe. Insertion des pattes comme dans les bousiers. Jambes antérieures longues, étroites, et sans tarsi dans les mâles.

Antennæ brevissimæ, novem-articulatæ; clava ovata, subtunicata. Labrum clypeo occultatum. Mandibulæ parvæ, membranaceæ.

Corpus ovato-oblongum; thorax magnus, convexus. Pedum insertio ut in copripis. Tibiae anticae longae, angustae; tarsi nulli in maribus.

OBSERVATIONS.

Les *onites* sont médiocrement distingués des bousiers, et même leur ressemblent entièrement par les habitudes. Cependant ils offrent un caractère assez singulier, celui d'avoir les deux pattes antérieures à jambes longues, grêles et plus ténues, au moins dans les mâles. Ces insectes ont la plupart un écusson très-petit.

ESPECES.

1. *Onite imma. Onitis inuus.*

O. nigro-aneus; capite quadrilobulato.

Scarabaeus inuus. Oliv. col. 1. n.º 3. p. 138. pl. 14. f. 133.

Onitis inuus. Fab. él. 1. p. 28.

Habite en Afrique et au Bengale.

2. *Onite aygule. Onitis aygulus.*

O. soutellatus; capite tuberculato; elytris testaceis.

Scarabaeus aygulus. Oliv. col. 1. n.º 3. p. 137. pl. 13. f. 120, et pl. 4. f. 28. a b.

Onitis aygulus. Fab. él. 1. p. 27.

Habite en Afrique et dans l'Inde.

3. *Onite mœris. Onitis mœris.*

O. ater, soutellatus; capitis cornu brevissimo; elytris subcostatis.

Scarabaeus mœris. Oliv. col. 1. n.º 3. p. 136. pl. 21. f. 193.

Onitis clinius. Fab. él. 1. p. 27.

Habite l'Europe australe.

Etc.

SISYPHE. (Sisyphe.)

Antennes très-courtes, de huit articles. Bouche des bousiers.

Corps court, épais. Corselet grand, convexe. Pattes postérieures beaucoup plus longues que les autres.

Antennæ brevissimæ, octo-articulatæ. Os coprorum.

Corpus breve, crassum. Thorax magnus, convexus. Pedes postici aliis multò longiores.

OBSERVATIONS.

Les *sisyphes* ont été distingués des bousiers à cause du nombre moindre des articles de leurs antennes, et de la longueur considérable de leurs pattes postérieures; cette longueur surpassant celle du corps.

ESPECES.

1. *Sisyphus* de Schœffer. *Sisyphus Schœfferi*.

S. clypeo emarginato, thorace rotundato; elytris triangularis; femoribus posticis elongatis dentatis.

Scarabæus Schœfferi. Lin. *Copris*. Geoff. 1. p. 92. n.º 9.

Oliv col 1. n.º 3. pl. 5. f. 41. *Ateuchus Schœfferi*. Fab. p. 59.

Sisyphus Schœfferi. Latr. gén. 2. p. 80.

Habite l'Europe australe.

2. *Sisyphus* d'Helwig. *Sisyphus Helwigii*.

S. gibbosum, læve, atrum; clypeo emarginato; pedibus elongatis.

Ateuchus Helwigii. Fab. el. 1. p. 60.

Habite au Bengale.

APHODIE. (Aphodius.)

Antennes courtes, de neuf articles; à massue trilamellée, arrondie. Labre caché sous un chaperon demi-circulaire. Mandibules membraneuses.

Corps ovale , convexe. Corselet subtransverse. Un écusson. Toutes les pattes séparées à leur insertion par des intervalles égaux.

Antennæ breves , novem-articulatæ ; clavæ trimellatæ, rotundatæ. Labrum clypeo semi-circulari occultatum. Mandibulæ membranaceæ.

Corpus ovatum, convexum. Thorax subtransversus. Scutellum. Pedes omnes insertioni intervallis œqualibus inter se distantes.

OBSERVATIONS.

Les *aphodies* sont de vrais coprophages , vivent, en effet, comme les bousiers, dans les fientes, les excréments, et, comme eux aussi, ont la partie terminale des mâchoires membraneuses, large, transversale. Ces insectes en sont néanmoins bien distingués, 1.^o par leurs palpes labiaux peu velus, composés d'articles presque semblables; 2.^o par leurs pattes toutes séparées à leur insertion par des intervalles égaux; 3.^o et parce qu'ils ont un écusson bien distinct.

ESPECES.

1. Aphodie fimétaire. *Aphodius fimetarius.*

A. ater ; capite tuberculato ; elytris rufis.

Scarabæus fimetarius. Lin. Geoff. 1. p. 81. n.^o 18.

Oliv. col. 1. n.^o 3. p. 78. pl. 18. f. 167.

Aphodius fimetarius. Fab. él. 1. p. 72. Lat. gen. 2. p. 90.

Panz. fasc. 31. t. 2.

B. var. *Aphodius fatens.* Fab. *ibid.* p. 69.

Habite en Europe, dans les fientes.

2. Aphodie fossoyeur. *Aphodius fossor.*

A. thorace retuso ; capite tuberculis tribus : medio sub-cornuto.

Scarabæus fossor. Lin. Geoff. 1. p. 62. n.^o 20.

Oliv. col. : 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Antennæ filum Tab. d. 2. 3. 4.

habitus en Europe. dans les lacs.

1. *Aphidius terrestris*. *Aphidius terrestris*.

A. caput subrotundum, antennis apiculatis : apiculi truncato-
stratis. ciliatissimus.

Scutellum convexum. Oliv. col. : 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Antennæ terrestris. Tab. d. 2. 3. 4.

habitus en Europe, dans les lacs. Plus petit que le précédent.

Ex.

LÉTHRUS. (Lethrus.)

Antennes de onze articles, le neuvième enveloppant les deux derniers, et formant avec eux une massue tuniquee, tronquée obliquement. Labre échancré. Mandibules cornées, fortes, saillantes, comme cornues, et dentelées au côté interne. Mâchoires à pièce terminale étroite, pectinée par des spinules.

Corps ovale. Corcelet large. Elytres connées.

Antennæ undecim-articulatæ ; articulo nono duobusque sequentibus clavam tunicatam obliquè truncatam efficientibus. Labrum emarginatum. Mandibulæ corneæ, validæ, exsertæ, subcornutæ, intus denticulatæ. Maxillæ processu terminali angusto, hinc spinulis pectinato.

Corpus ovatum. Thorax latissimus. Elytra connata.

OBSERVATIONS.

Le *léthrus* semble presque se rapprocher des *lucanes* par le caractère de ses mandibules arquées et très - prominentes; mais la forme de ses antennes à onze articles et dont la massue est tuniquee, et son labre, l'en distinguent

fortement. La lèvre inférieure, cachée par le menton, n'est point bifide comme dans les géotrupes.

La tête du léthrus est grosse, munie d'antennes qui paraissent composées seulement de neuf articles. Le corselet est fort large, convexe, gibbeux. L'écusson est fort petit, presque nul. L'abdomen est tout-à-fait recouvert par les élytres. On ne connaît de ce genre que l'espèce suivante:

ESPÈCE.

1. Léthrus céphalote. *Lethrus cephalotes*. Fab. él. 1. p. 1.

Oliv. coléopt. 1. n.º 2. pl. 1. f. 1. Pans. fasc. 28. t. 1.

Lat. gén. crust. et ins. 2. p. 95.

Habite dans l'Autriche, la Hongrie, les déserts de la Tartarie. Il est noir et aptère. Le *lethrus æneus* de Fabricius est une lamprime.

GÉOTRUPE. (Geotrupes.)

Antennes courtes, de onze articles; à massue ovale, trilamellée. Labre avancé. Mandibules cornées, arquées au sommet. Lèvre inférieure à deux divisions allongées.

Corps ovale, très-obtus au bout. Corselet large, un peu plus court que l'abdomen. Un écusson.

Antennæ breves, undecim-articulatæ: clavæ ovatæ, trilamellatæ. Labrum porrectum. Mandibulæ corneæ, ad apicem arcuatæ. Labium laciniis duabus elongatis ultrà mentum exsertis.

Corpus ovale, posticè valdè obtusum. Thorax latus, abdomine paulò brevior. Scutellum.

OBSERVATIONS.

Geotrupes reconnus et déterminés par M. Latreille, été confondus parini les scarabés ; mais leur lèvre inférieure et leurs mandibules, avancées au-delà du chapelet en distinguant éminemment. Ces parties avancées de leur bouche ne permettent pas qu'on les confonde avec les bousiers, dont ils se rapprochent d'ailleurs par leur forme générale. Néanmoins, leur corselet est un peu plus étroit que l'abdomen.

Ces insectes vivent dans les fientes des animaux, et creusent la terre au-dessous pour y déposer leurs œufs.

ESPECES.

Geotrupes disparate. *Geotrupes dispar.*

Geotrupes thoracis cornu subulato, protasseo, capitis subulato subrecurvo; scutello cordato.

Geotrupes arabæus dispar. Fab. él. 1. p. 22.

iv. col. 1. n.º 3. pl. 3. f. 29. a. b. c.

Habite la Russie méridionale, l'Espagne.

Geotrupes stercoraire. *Geotrupes stercorarius.*

Geotrupes muticus, ater; clypeo rhombeo; vertice prominulo; elytris sulcatis.

Geotrupes arabæus stercorarius. Lin. Fab. él. 1. p. 24.

v. col. 1. n.º 3. pl. 5. f. 39. a. b. c. d.

Geotrupes ottrupes stercorarius. Lat. gén. 2. p. 92.

az. fasc. 49. t. 1.

Habite en Europe. Très-commun.

Geotrupes printanier. *Geotrupes vernalis.*

Geotrupes muticus; elytris glabris levissimis; clypeo rhombeo.

Geotrupes arabæus vernalis. Lin. Fab. él. 1. p. 25.

Geotrupes arabæus. Geoff. 1. p. 77. n.º 10. Le petit pillulaire.

v. col. 1. n.º 3. pl. 4. f. 23.

Geotrupes ottrupes vernalis. Latr. gén. 2. p. 94.

Habite en Europe.

Fin de l'ouvrage IV.

4. Géotrupe phalangiste. *Geotrupes typhaeus*.

G. thorax tricornis : intervallo minori, lateralibus par-
rectis magnitudine capitis multo.

Scarabæus typhaeus. Linn. Fab. G. 1. p. 23.

Scarabæus. Geoff. 1. p. 72. n.º 4. pl. 1. f. 3.

Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 7. f. 52.

Geotrupes typhaeus. Lat.

Habite en Europe, dans les lieux sablonneux.

Etc.

T R O X. (Trox.)

Antennes courtes, de dix articles, dont le premier est grand et très-velu, se terminant en massue lamellée. Labre court, mais saillant. Mandibules cornées, simples. Mâchoires bifides, à lobe externe pointu.

Tête retirée sous le corselet. Chaperon très-court. Corselet débordant sur les côtés. Elytres convexes, recouvrant tout-à-fait l'abdomen.

Antennæ breves, decem-articulatæ, clavæ lamellatâ terminatæ; articulo primo magno valdè piloso. Labrum breve at prominulum. Mandibulæ cornæ, simplices. Maxillæ bifidæ, lobo exteriori acuto.

Caput in thorace penitus ferè intrusum. Clypeus brevissimus. Thorax lateribus productis depressis. Elytra convexa, postice involuto-inflexa, abdomen omnino gentia.

OBSERVATIONS.

Les trox, que l'on confondait avec les scarabés, en furent séparés par Fabricius. Ils en diffèrent par leur lèvre supérieure bien apparente; par le premier article de leurs antennes qui est gros et velu; enfin par leurs mâchoires comme bifides, ayant un lobe externe, pointu et en forme

e corne. Ces insectes se rapprochent des boucliers par leur manière de vivre. Leur tête est, en grande partie, enfoncée dans le corselet qui la cache. Ce corselet est large, mince, débordant et cilié sur les côtés. Les élytres sont grandes et chagrinées ou raboteuses.

On rencontre les trox par terre, dans les champs, les lieux un peu secs et sablonneux. On les voit sur les substances animales desséchées, occupés à en ronger les parties endurcies.

ESPECES.

1. Trox sabuleux. *Trox sabulosus*. Fab.

T. niger; capite thoraceque rugosis, elytris tuberculis rotundatis.

Oliv. coléopt. 1. n.º 4. p. 8. pl. 1. f. 1.

Scarabæus sabulosus. Lin.

Panz. fasc. 7. f. 1.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

2. Trox hispide. *Trox hispidus*. Fab.

T. niger; thorace rugoso, ciliato; elytris subpunctatis lineisque quatuor elevatis hispidis. Oliv. *ibid.* p. 9. pl. 2. f. 9.

Trox hispidus. Latr. gen. crust. et ins. 2. p. 99.

Habite en France, etc., aux lieux sablonneux.

3. Trox perlé. *Trox gemmatus*.

T. cinereus; thorace scabro, elytris striato-punctatis tuberculisque nitidis. Oliv. *ibid.* p. 7. pl. 1. f. 3.

Mus. n.º

Habite au Sénégal.

Nota. L'*ægialia* de M. Latreille me paraît pouvoir être réuni aux trox, quoique ses antennes n'aient que neuf articles.

GOLIATH. (Goliathus.)

Antennes courtes; à massue ovale, trilamellée. Labre caché. Mandibules cornées. Menton large, transverse.

Tête droite, à chaperon très-avancé, fourchu ou bifide. Corselet grand, arrondi, subtrigone. Elytres élargies vers leur base, un peu sinuées sur les côtés.

Antennæ breves; clavæ ovata, trilamellata. Labrum occulatum. Mandibulæ corneæ. Mentum latum, transversum.

Caput rectum; elytræ valde pectate; furcata aut bifida. Thorax magnus, rotundatus, subtrigonus. Elytra versùs basim latiora, lateribus subsinuata.

OBSERVATIONS.

Les *Goliaths* avaient été confondus avec les *Cetoniæ*, et ont en effet beaucoup de rapports avec ces insectes. Néanmoins on les en distingue facilement au premier aspect, par leur chaperon très-avancé et fourchu ou partagé en deux lobes qui divergent souvent comme des cornes. La base des élytres est dilatée en dehors d'une manière remarquable. Elle offre souvent une pièce écailleuse voisine des angles postérieurs du corselet. La plupart des espèces sont d'une assez grande taille.

ESPECES.

1. Goliath géant. *Goliathus giganteus*.

G. niger; thorace albo lineato.

Scarabæus goliathus. Lin.

Cetonia goliathus. Oliv. col. 1. pl. 5. f. 33. et pl. 9. f. 33.

Cetonia goliathus. Fab. él. 2. p. 135.

Habite en Afrique.

2. Goliath cacique. *Goliathus cacicus*.

G. thorace flavescente, nigro-lineato; elytris albis, nigro marginatis.

Cetonia cacicus. Oliv. col. 1. n.º 6. pl. 4. f. 22.

Cetonia cacicus. Fab. él. 2. p. 135.

Habite l'Amérique méridionale.

3. Goliath polyphème. *Goliathus polyphemus*.*G. viridis* ; thorace albo-lineato ; elytris luteo-maculatis.*Cetonia polyphemus*. Oliv. col. 1. n.º 6. pl. 7. f. 61.

Fab. él. 2. p. 136.

Habite en Afrique.

Etc. Ajoutez les *cetonia micans*, *c. ynca* de Fabricius, et le *cetonia bifida* d'Olivier, n.º 43.CÉTOINE. (*Cetonia*.)

Antennes courtes, terminées en massue trilamellée. Labre caché. Mandibules petites, membraneuses, au moins à leur côté interne. Mâchoires membraneuses et velues à leur sommet. Palpes labiaux sur les côtés de la lèvre.

Tête inclinée, étroite ; chaperon court, entier ou échancré ; corselet trigone, tronqué et plus large postérieurement. Une pièce triangulaire à la base externe des élytres.

Antennæ breves, clavæ trilamellatæ terminatæ. Labrum absconditum. Mandibulæ perparvæ, latere interno saltem membranaceæ. Maxillæ apice membranaceæ, villosæ. Palpi labiales ad latera labii.

Caput nutans, subangustum. Clypeus brevis, integer aut emarginatus. Frustum triangulare ad basim externam elytrorum.

OBSERVATIONS.

Les cétoines avaient été confondues avec les scarabées par Linné et presque tous les entomologistes ; mais elles en ont été séparées par Fabricius, et, depuis, ce genre est généralement adopté. Degeer avait déjà distingué ces insectes, et en avait formé une division sous le nom de *scarabées des fleurs*.

Les cétoïnes, en effet, fréquentent les fleurs, s'y reposent, et paraissent se nourrir de quelques parties de leur substance, soit de leur nectar, soit de la poussière de leurs étamines.

Le corps des cétoïnes est ordinairement plus large et plus aplati que celui des hannetons et des scarabés. La tête est penchée, assez étroite; le chaperon est médiocrement avancé, et échancré dans la plupart des espèces. Les élytres, dans le repos, présentent une forme carrée, et sont ordinairement un peu plus courtes que l'abdomen. Une pièce trigone et surnuméraire se trouve de chaque côté enchassée entre les élytres et le corselet.

On trouve les cétoïnes sur les fleurs composées, sur celles des ombelles, sur les buissons fleuris, les saules, etc. Ces insectes ne sont point malfaisans, et ne causent aucun dommage. Leurs larves vivent dans la terre grasse et humide. On en connaît beaucoup d'espèces.

ESPECES.

1. Cétoïne dorée. *Cetonia aurata*.

C. viridi-ænea; elytris albo-maculatis.

Cetonia aurata. Fab. Oliv. col. 1. n.º 6. p. 12. pl. 1. f. 1.

L'éméraudine. Geoff. 1. p. 73. n.º 5.

Panz. fasc. 41. f. 15.

Habite en Europe, sur les fleurs. Commune.

2. Cétoïne verte. *Cetonia viridis*.

C. viridis opaca subtilior; elytris albo-maculatis.

Fab.

Panz. fasc. 41. f. 18.

Lat. gén. crust. et ins. 2. p. 129.

Habite en Hongrie.

3. Cétoïne fastueuse. *Cetonia fastuosa*. Fab.

C. viridi-ænea, nitidissima, immaculata.

Panz. fasc. 41. f. 16.

Latr. hist. nat. des crust. et des ins. 10. p. 222.

Habite l'Allemagne, le midi de la France.

4. Cétoine marbrée. *Cetonia marmorata*. Fab.*C. ænea*; thorace elytrisque atomis albis sparsis.

Panz. fasc. 41. f. 17.

Habite en France, en Allemagne.

5. Cétoine morio. *Cetonia morio*.*C. nigra obscura*; corpore subtus nitidior. Fab.

Oliv. coléopt. 1. n.º 6. p. 27. pl. 2. f. 3.

Habite les provinces méridionales de la France.

6. Cétoine stictique. *Cetonia stictica*. Fab.*C. nigra albo-maculata*; abdomine subtus punctis quatuor albis.

Oliv. coléopt. 1. n.º 6. p. 53. pl. 7. f. 57.

Le drap mortuaire, Geoff. 1. p. 79. n.º 14.

Panz. fasc. 1. f. 4.

Habite en Europe, sur les chardons.

Etc.

TRICHIE. (Trichius.)

Antennes courtes, en massue trilamellée. Labre caché sous le chaperon. Mandibules submembraneuses. Mâchoires allongées, membraneuses et frangées au bout.

Corps ovale, déprimé. Elytres simples à leur base.

Antennæ breves, clavæ trilamellatæ terminatæ. Labrum sub clypeo absconditum. Mandibulæ submembranaceæ. Maxillæ elongatæ, ad apicem membranaceæ pilis fimbriatæ.

Corpus ovale, depressum. Elytra basi simplicia.

OBSERVATIONS.

Les *trichies* ressemblent aux cétoines à beaucoup d'égards, et je n'en avais d'abord formé qu'une section du même genre. Néanmoins leurs élytres n'offrant point à leur

base latérale, cette pièce subtriangulaire que l'on trouve dans les cétoines, et leur corselet étant, en général, moins large postérieurement que celui des cétoines, je suivrai les entomologistes qui les en séparent. On les trouve aussi le pluspart sur les fleurs.

ESPECES.

1. Trichie ermite. *Trichius eremita*.

T. sparsus, thorax inégal; scutelle plus longilinéale.

Trichius eremita. Fab. El. 2. p. 130. Latr. gén. 2. p. 125.

Cétoine ermite. Oliv. col. 1. n. 6. pl. 3. f. 10.

Panz. fasc. 41. t. 12.

Habite en Europe, sur les masses granuleuses des arbres.

2. Trichie noble. *Trichius nobilis*.

T. curvatus, viridis, nitens; abdomine postice albo-punctato; elytris rugosis.

Scarabæus nobilis. Lin. Geoff. 1. p. 73. n. 6.

Trichius nobilis. Fab. El. 2. p. 130. Latr. gén. 2. p. 124.

Panz. fasc. 41. t. 13.

Cétoine noble. Oliv. col. 1. n. 6. pl. 3. f. 10. a. b. c.

Habite en Europe, sur les fleurs.

3. Trichie fasciée. *Trichius fasciatus*.

T. niger, tomentosus-flavus; elytris fasciis tribus, abbreviatis, nigris.

Scarabæus fasciatus. Lin. Geoff. 1. p. 80. n. 16.

Trichius fasciatus. Fab. El. 2. p. 131. Latr. gén. 2. p. 124.

Cétoine fasciée. Oliv. col. 1. n. 6. pl. 3. f. 84.

Habite en Europe, sur les fleurs.

Etc.

ANISONYX. (Anisonyx.)

Antennes très-courtes, à massue ovale, lamellée. Labre non saillant. Mandibules non dentées, en partie membraneuses. Palpes filiformes. Chaperon étroit, avancé.

orps ovale; corselet presque carré, plus étroit que l'omen.

Antennæ brevissimæ : clavæ ovatæ , lamellatæ. Labrum non exsertum. Mandibulæ simplices , partim ibranaceæ. Palpi filiformes. Clypeus porrectus , cæ angustior.

Corpus ovatum ; Thorax subquadratus , abdomine istior.

OBSERVATIONS.

Les *Anisonyx* avoisinent les hannetons, et n'en ont été distingués que par M. Latreille. Ils en diffèrent cependant leurs mandibules très-minces et en partie membranées; par leurs palpès grêles, longs, à dernier article cycloïque; enfin, parce que la languette de leur lèvre inférieure s'avance au-delà du menton, et est divisée en deux.

ESPÈCES.

Anisonyx chevelu. Anisonyx crinitum.

A. hirtum, supra viride, subtus nigrum.

Scarabæus longipes. Lin. *Melolontha crinita*. Fab. 61. 2. p. 184.

Oliv. col. 1. n.º 5. p. 57. pl. 2. f. 16.

Anisonyx crinitum. Latr. gen. 2. p. 120.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

Anisonyx ours. Anisonyx ursus.

A. lûrsutissimum, atrum ; pedibus quatuor anticis testaceis.

Melolontha ursus. Fab. 61. 2. p. 184.

Oliv. col. 1. n.º 5. p. 88. pl. 8. f. 88.

Anisonyx. Latr.

Habite au Cap de Bonne-Espérance.

Etc.

GLAPHYRE. (*Glaphyrus* .)

Antennes courtes, à massue ovale ou subglobuleuse. Labre saillant. Mandibules cornées. Mâchoires membraneuses au sommet. Lèvre inférieure bilobée, s'avancant au-delà du menton.

Corps ovale-oblong. Elytres s'ouvrant ou s'écartant postérieurement dans plusieurs.

Antennae brevès, clavæ ovali aut subglobosæ. Labrum exsertum. Mandibulæ cornææ. Maxillæ ad apicem membranaceæ. Labium extrâ mentum prominulum, bilobum.

Corpus ovato-oblongum. Elytra extremitate postici in pluribus deluscentia.

OBSERVATIONS.

Les *glaphyres*, auxquels je réunis les *amphicomés* de M. Latreille, avaient été confondus parmi les hannetons. Mais les insectes parfaits de ce genre, vivent plus sur les fleurs que sur les feuilles des arbres, et n'ont pas leurs mâchoires entièrement cornées. Ils offrent une transition des *anthophages* aux *phyllophages*. Ces insectes sont d'ailleurs remarquables par leur labre saillant, ainsi que par la languette de leur lèvre inférieure qui s'avance en deux lobes au-delà du menton. Dans les *glaphyrés* de M. Latreille, les mandibules sont dentées; elles ne le sont pas dans les *amphicomés*. Les uns et les autres ont dix articles aux antennes.

ESPECES.

1. Glaphyre maure. *Glaphyrus maurus*.

G. glabra, viridi-anea; abdomine rufo, cinereo-villosa

Scarabæus maurus. Lin.

Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 8. f. 90. a. b.

Melolontha cardui Fab. él. 2. p. 172.

Glaphyrus maurus. Latr. gen. 2. p. 117.

Habite en Barbarie, sur le chardon pycnocéphale.

2. Glaphyre de la serratule. *Glaphyrus serratulæ*.

G. sericeo-viridis, *subtius luteo-tomentosus*; *femoribus posticis incrassatis*.

Glaphyrus serratulæ. Latr. gén. 1. tab. 9. f. 6, et vol. 2. p. 118.

An melolontha serratulæ? Fab. él. 2. p. 173.

Habite en Barbarie.

3. Glaphyre pntois. *Glaphyrus melis*.

Gl. fulvus, *hirtus*; *elytris abbreviatis atris*; *abdomine ferrugineo*.

Amphicoma melis. Latr. gén. 2. p. 118.

Melolontha melis. Fab. él. 2. p. 185.

Habite en Barbarie.

Etc. Les *melolontha abdominalis*, *m. bombylius*, *m. hirta* de Fabricius sont de ce genre.

HANNETON. (*Melolontha*.)

Antennes de neuf ou dix articles, à massue oblongue, plicatile, de trois à sept articles. Mandibules courtes, intérieures, recouvertes par les mâchoires, cornées. Mâchoires cornées, dentées au sommet.

Corps ovale-oblong, le plus souvent un peu convexe. Elytres de la longueur de l'abdomen, quelquefois un peu plus courtes.

Antennæ novem aut decem-articulatæ; *clavæ oblongæ*, *plicatili*: *lamellis tribus ad septem*. *Mandibulæ corneæ*, *breves*, *inclusæ*, *maxillis obtectæ*. *Maxillæ corneæ*, *apice dentatæ*.

Corpus ovato-oblongum, *sæpius convexiusculum*.

Elytra abdominis longitudine, interdum abdomine paulò breviora.

OBSERVATIONS.

Le genre des *hannetons* est fort nombreux en espèces, et avait été confondu d'abord avec celui des scarabés par Linnæus ; mais Fabricius l'en a distingué. Dans les espèces de ce genre, le labre, quoique ne dépassant point le chaperon, est apparent, et il ne l'est pas dans les scarabés. Ici, les antennes varient beaucoup selon le sexe. Leur massue, dans les mâles, a souvent plus de lames que dans les femelles.

Je n'en distingue point les holiies, quoiqu'elles aient le corps plus aplati et écailléux ; mais on en pourra séparer les *anoplogonathes* de M. Leach, dont l'extrémité des mâchoires n'offre pas de dents.

Les hannetons sont fort nuisibles dans l'état de larves et dans l'état parfait, et font beaucoup de tort aux végétaux, surtout aux arbres. Dans leur premier état, ils vivent au moins deux années, et rongent les racines des plantes ; ils dévorent les feuilles des arbres dans leur dernier état, et les en dépouillent en peu de temps.

Ces insectes ont la démarche lente, le corps mutique, c'est-à-dire, sans cornes ni pointes sur leur corselet ou leur chaperon ; mais souvent leur corps est velu ou pubescent.

ESPECES.

1. Hanneton commun. *Melolontha vulgaris*.

M. testacea ; thorace villosa ; incisuris abdominis albis.

Scarabæus melolontha. Lin. Geoff. 1. p. 70. n.º 3.

Melolontha vulgaris. Fab. él. 2. p. 161. Latr. gen. 2. p. 107. Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 1. f. 1. a. b. c. d.

Habite en Europe, sur les arbres, au mois de mai.

3. Hanneton cotonneux. *Melolontha villosa*.
M. testacea; clypeo marginato reflexo; corpore subhis
lanato; scutello albo.
Melolontha villosa. Fab. Latr. gén. 2. p. 108.
Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 1. f. 4. a. b. c.
Panz. fasc. 31. t. 19.
Habite l'Europe australe, la France.
3. Hanneton solsticial. *Melolontha solstitialis*.
M. testacea; thorace villosa; elytris luteo-pallidis: lineis
tribus pallidioribus.
Scarabæus solstitialis. Lin. *Melolontha solstitialis*. Fab. él.
2. p. 164.
Latr. gén. 2. p. 109. Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 2. f. 8 et 11.
Scarabæus. Geoff. 1. p. 74. n.º 7.
Habite en Europe, au mois d'août.
4. Hanneton horticole. *Melolontha horticola*.
M. nigro-ænea; capite thoraceque viridi-cæruleis; elytris
testaceis immaculatis. Oliv.
Scarabæus horticola. Lin. Geoff. 1. p. 75. n.º 8.
Melolontha horticola. Fab. él. 2. p. 175.
Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 2. f. 17. Panz. fasc. 47. t. 15.
Habite en Europe.
5. Hanneton foulon. *Melolontha fullo*.
M. testacea, albo-maculata; scutello macula duplici; an-
tennis heptaphyllis.
Scarabæus fullo. Lin. Geoff. 1. p. 89. n.º 2.
Melolontha fullo. Fab. él. 2. p. 160.
Oliv. col. 1. n.º 5. pl. 3. f. 28.
Habite l'Europe australe, la France. Grande espèce, remar-
quable par ses antennes.
Etc.

RUTÈLE. (Rutela.)

Antennes un peu plus courtes que le corselet, à mas-
sue oblongue, trilamellée. Mandibules cornées, compri-
mées, à côté extérieur dentelé, ayant trois dents sous

leur sommet interne. Mâchoires cornées, dentées, arquées à leur sommet.

Corps ovale, légèrement convexe. Elytres à bord externe non dilaté ni canaliculé. Pattes fortes.

Antennae thorace paulo breviores; clavi oblongi trilamellati. Mandibulae corneae, compressae, lateri externo subdentato; apice interno dentibus tribus. Maxillae corneae, dentatae, apice arcuatae.

Corpus ovatum, plano-subconvexum. Elytra margini externo nec dilatato nec canaliculato. Pedes robusti.

OBSERVATIONS.

Cette coupe générique de M. Latreille me paraît peu tranchée, et comprend des insectes à peine distincts des hannetons. Néanmoins M. Latreille les regarde comme intermédiaires entre les hannetons et les hexodons. Ces insectes sont exotiques.

ESPECES.

1. Rutèle convexe. *Rutela convexa*.

R. viridis, glabra; clypeo rotundato; scutello magno triangulo.

Cetonia convexa. Oliv. col. 1. n.º 6. p. 72. pl. 6. f. 48.

Habite à Saint-Domingue, et dans l'Amérique septentrionale.

2. Rutèle émeraude. *Rutela smaragdula*.

R. ferrugineo-flavescens; elytris virescentibus; sterno cornuto.

Cetonia smaragdula. Fab. él. 2. p. 143.

Oliv. col. 1. n.º 6. p. 73. pl. 10. f. 90.

Habite l'Amérique méridionale.

Etc. Ajoutez le *melolontha punctata* de Fabricius, ses *cetonia chrysis*, *c. splendida*, *c. gloriosa*, *c. lincolni*, etc.

HEXODON. (Hexodon.)

Antennes de dix articles , terminées par une massue
vale , petite , lamellée. Mandibules cornées , avancées ,
tridentées et arquées au sommet. Mâchoires cornées , à
six dents.

Corps elliptique , suborbiculaire ; corselet large ,
échancré antérieurement. Elytres à bord extérieur dilaté
, canaliculé. Pattes grêles.

*Antennæ decem-articulatæ , clavâ ovatâ , parvâ ,
lamellatâ. Mandibulæ corneæ , porrectæ ; apice ar-
uato tridentato. Maxillæ corneæ sexdentatæ.*

*Corpus ellipticum , suborbiculatum. Thorax trans-
versus , anticè emarginatus. Elytra margine externo
dilata to , canaliculato. Pedes graciles.*

OBSERVATIONS.

Les *hexodons* sont des insectes exotiques et fort rares ,
qui semblent rapprochés des hannetons par leurs rapports.
Mais ils s'en éloignent par la forme de leur corps , par leurs
mandibules avancées et tridentées au sommet , et par leurs
mâchoires à six dents. Leur corselet est échancré anté-
rieurement pour recevoir la tête , qui est petite , et y est
comme encadrée.

Ces insectes se trouvent dans l'île de Madagascar , sur
les arbres et les arbrisseaux , dont ils mangent les feuilles.

E S P È C E S.

1. Hexodon réticulé. *Hexodon reticulatum.*

H. atrum ; elytris reticulatis griseis.

Oliv. col. 1. n.º 7. pl. 1. f. 1, a. b. c. d. e.

Habite l'île de Madagascar.

2. *Hexodon unicolor*. *Hexodon unicolor*.*H. atrum*; *elytris immaculatis*.

Oliv. col. 1. n. 7. pl. 1. f. 2.

Habite à Madagascar. Il semble n'être qu'une variété du précédent.

SCARABÉ. (Scarabæus.)

Antennes courtes, de dix articles, à massue lamellée, plicatile, presque en forme de tête. Chaperon avancé; labre caché et comme nul. Mandibules cornées, souvent dentées au sommet. Mâchoires cornées, droites, velues, dentées ou lobées. Les palpes labiaux insérés au sommet de la lèvre.

Corps ovale, le plus souvent convexe. Un écusson; couleurs sombres.


Antennæ breves, decem-articulatæ; clavâ lamellatâ, plicatili, subcapitatâ. Clypeus productus: labro inconspicuo, subnullo. Mandibulæ corneæ, sæpè ad apicem dentatæ. Maxillæ corneæ, rectiusculæ, pilosæ, dentatæ vel lobatæ. Palpi labiales apice vel ad latera apicis labii inserti.

Corpus ovale, sæpiùs convexum. Scutellum; colores obscuri.

OBSERVATIONS.

La plupart des anciens naturalistes ont désigné presque tous les coléoptères sous le nom de *scarabés*. Les modernes ont conservé ce nom, mais ne l'ont plus assigné qu'à une partie des coléoptères dont ils ont formé un seul genre. Depuis *Linnaeus*, ce genre a subi d'assez nombreux démembrements et fut diversement institué.

Les *scarabés* ont la massue des antennes presque en forme



de tête : elle est formée de trois lames que l'insecte peut ouvrir ou resserrer à-peu-près comme les feuillets d'un livre ou les plis d'un éventail. Leur corps est ovale, souvent gibbeux, presque toujours glabre en dessus ; mais dans beaucoup d'espèces, surtout dans les mâles, le chaperon et même le corselet sont tuberculeux ou cornus, d'une manière fort remarquable. L'écusson est court ; les élytres sont dures, de la longueur de l'abdomen ; et les jambes antérieures sont dentées. Beaucoup de scarabés ayant le corselet ou le chaperon cornu, paraissent n'être pas sans rapports avec les coprophages ; néanmoins ces scarabés s'en éloignent sous d'autres rapports, et nous les croyons ici convenablement placés.

C'est dans le genre des scarabés qu'on voit, en général, les plus gros coléoptères, et surtout les plus singuliers relativement aux particularités, souvent très-curieuses, de leur forme.

On rencontre ces insectes voltant sur la terre, ou volant lourdement, surtout le soir, d'un endroit à l'autre. On les trouve ordinairement dans les lieux gras et humides, dans les couchés des jardins, dans les champs, près des racines des vieux arbres, dans les terreaux humides et les fumiers.

Le nombre des espèces connues étant considérable, je crois qu'il convient de les diviser de la manière suivante :

- 1.^o *Scarabés* cornus ou épineux, soit sur le chaperon, soit sur le corselet, au moins dans un sexe ;
- 2.^o *Scarabés* dont le chaperon et le corselet sont mutiques dans les deux sexes.

ESPECES.

[*Scarabés cornus.*]

1. Scarabé hercule. *Scarabæus hercules.*

♂: thoracis cornu incurvo, maximo, subtus barbato, utrinque unidentato, capitis recurvato dentato.

Scarabæus hercules. Lin. Oliv. col. 1. n.º 3. p. 6. pl. 1. f. 1. a. b. mas., et pl. 23. f. 1. femina.

Geotrupes hercules. Fab. él. 1. p. 2.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles. Espèce très grande et fort singulière.

2. Scarabé alcide. *Scarabæus alcides*.

S. thoracis cornu incurvo, subitè barbato, unidentato; capitis recurvato, mutico.

Scarabæus alcides. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 1. f. 2.

Geotrupes alcides. Fab. él. 1. p. 3.

Habite... aux Indes orientales. Fab. Il est moins grand que l'hercule. Le scarabé persée d'Olivier semble intermédiaire entre l'hercule et l'alcide.

3. Scarabé actéon. *Scarabæus actæon*.

S. glaber; thorace bicorni, capitis cornu unidentato, bifido; elytris lævibus.

Scarabæus actæon. Lin. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 5. f. 33, et pl. 6. f. 49.

Geotrupes actæon. Fab. él. 1. p. 8.

Habite l'Amérique méridionale. Espèce très-grosse et grande.

4. Scarabé éléphant. *Scarabæus elephas*.

S. villosus; thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido.

Scarabæus elephas. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 15. f. 138. a. b.

Geotrupes elephas. Fab. él. 1. p. 8.

Habite la Guinée.

5. Scarabé chorinée. *Scarabæus chorinæus*.

S. thoracis cornu incurvo crassissimo apice bifido, capitis longiorè bifido.

Scarabæus chorinæus. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 2. f. 7. a. b.

Geotrupes chorinæus. Fab. él. 1. p. 5.

Habite l'Amérique méridionale.

6. Scarabé porte-clef. *Scarabæus claviger*.

S. rufus; thoracis cornu apice trübò incurvo, capitis subulato recurvo.

Scarabæus claviger. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 5. f. 40. a. b.

Geotrupes claviger. Fab. él. 1. p. 6.

Habite à Cayenne, Oliv.; dans les Indes, Fab.

Etc.

[*Scarabés mutiques.*]

Scarabé longimane. *Scarabæus longimanus*.

S. muticus; *pedibus anticis arcuatis longissimis*.

Scarabæus longimanus. Lin. Fab. él. 1. p. 24.

Oliv. col. 1. n.º 3. p. 48. pl. 4. f. 27 et pl. 27. f. 27. b.

Habite les Indes orientales. Très-singulier par ses pattes antérieures.

Scarabé pointillé. *Scarabæus punctatus*.

S. thoracis inermi punctato, capitis clypeo integro: dentibus duobus elevatis obtusis.

Scarabæus punctatus. Fab. él. 1. p. 18. Latr. gen. 2. p. 104.

Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 8. f. 70.

Habite l'Europe australe.

Scarabé couronné. *Scarabæus coronatus*.

S. thoracis inermi, capitis clypeo posticè emarginato.

Scarabæus coronatus. Oliv. col. 1. n.º 3. pl. 12. f. 110.

Geotrupes coronatus. Fab. él. 1. p. 17.

Habite l'île de Java.

Etc.

LES LUCANIDES.

Massue des antennes pectinée.

Les *lucanides* peuvent être encore regardés comme de véritables scarabéides, mais distingués des autres par la massue de leurs antennes. Ce sont effectivement des lamellicornes, et ils tiennent aux scarabéides par tous les rapports généraux. Ici, néanmoins, la massue des antennes est pectinée, c'est-à-dire, que ses feuillets, un

peu écartés à leur insertion, semblent presque disposés comme les dents d'un peigne.

Ceux dont on connaît les habitudes, étant dans l'état de larve, vivent dans les trones d'arbres, et, comme les scarabés, se nourrissent de leur tan. On les rencontre ordinairement dans les bois, et c'est toujours vers le soir qu'on les voit voler.

Plusieurs de ces insectes sont singulièrement remarquables par la taille et l'énorme grandeur de leurs mandibules, surtout de celles des mâles.

Les antennes des lecanides n'ont que six articles, dont les trois à cinq derniers forment la massue. Elles ne sont jamais plus longues que le corselet.


Ce sont ces insectes qui, dans notre méthode, terminent l'ordre nombreux des *coléoptères*, et par suite la classe même des insectes. Ils n'offrent point de transition aux animaux des classes suivantes. On y rapporte les genres *passale*, *sinodendre*, *écéale*, *lamprime* et *lucane*.

PASSALE. (*Passalus*.)

Antennes courtes, arquées; à massue trilamellée, pectinée. Labre saillant. Mandibules fortes, cornées, dentées. Mâchoires écailleuses, dentées.

Corps oblong, parallélipipède, déprimé. Corselet presque carré, séparé des élytres par un étranglement.

Antennæ breves, arcuatae; clava trilamellata, pectinata. Labrum exsertum. Mandibulae validae, corneae, dentatae. Maxillae coriaceae, dentibus aut processibus corneis.



SANS VERTÈBRES.

597

*Corpus oblongum , parallelipipedum , depressum.
Thorax subquadratus , ab abdomine intervallo pos-
se disjunctus.*

OBSERVATIONS.

Les *passales*, d'abord confondus parmi les *lucanes*, constituent un genre bien distingué par ses caractères et facile à reconnaître au premier aspect. Ils ont les antennes velues, simplement arquées, mais point coudées. Leur labre est saillant et très-distinct. Leur corps parallipède et déprimé, offre une interruption remarquable entre le corselet et les élytres; leur écusson, très-petit presque nul, se trouve enchâssé sur le pédicule qui unit l'abdomen au corselet; enfin leurs élytres couvrent tout l'abdomen et embrassent ses côtés. Ces insectes sont trop communs.

ESPÈCES.

Passale interrompu. *Passalus interruptus*.

P. ater; vertice tuberculis tribus elevatis : intermedio majori compresso.

Passalus interruptus. Fab. él. 2. p. 255.

Latr. gén. 2. p. 137. et hist. nat., etc., 10. p. 254.

Lucanus interruptus. Lin.

Oliv. col. 1. n.º 1. pl. 3. f. 5. d.

Habite les Antilles.

Passale cornu. *Passalus cornutus*.

P. ater; verticis cornu elevato incurvo; elytrorum striis omnibus levibus. F.

Passalus cornutus. Fab. él. 2. p. 256.

Habite la Caroline.

Passale échancré. *Passalus emarginatus*.

P. capite inæquali; mandibulis emarginatis; thorace levissimo.

Passalus emarginatus. Fab. él. 2. p. 255.

Habite aux Indes orientales.

Etc.

SINODENDRE. (*Sinodendron*.)

Antennes très-courtes, de dix articles, dont le premier est fort allongé, les trois derniers formant une massue subpectinée. Labre caché par le chaperon. Mandibules non saillantes dans les deux sexes.

Corps ovale, convexe.

Antennes brevissimas decem-articulatas, articulo primo valde elongato, tribus ultimis clavatis, dentibus pectinatis formantibus. Labrum clypeo occultatum. Mandibulae in utroque sexu non exsertae.

Corpus ovatum, convexum.

OBSERVATIONS.

La massue des antennes étant comprimée, dentée en scie d'un côté, et par-là pectinée, a fait reporter le *sinodendre* parmi les lucanides, ce que les habitudes de l'insecte ne contrarient point. Effectivement, dans l'état de larve, il vit dans le tronc des arbres, et dans l'état parfait, il paraît se nourrir de la liqueur qui s'écoule des plaies de ces arbres.

E S P E C E.

1. *Sinodendre cylindrique*: *Sinodendron cylindricum*.

S. atrum; thorace antice truncato, quinque dentato; capitis cornu erecto.

Sinodendron cylindricum. Fab. él. 2. p. 376.

Latr. gén. 2. p. 701. et hist. nat., etc. 10. p. 156. pl. 83. f. 4.

Scarabaeus cylindricus. Lin.

Oliv. col. 1. n.º 3. pl. g. f. 80. a. b. c.

Panz. fasc. 1. t. 1. mas. et fasc. 2. t. 2. femina.

Habite en Europe, sur les troncs des arbres.

OESALE. (OEsalus.)

Antennes condées; courtes; à massue petite, pectinée. Labre apparent. Mandibules arquées, pointues.èvre inférieure petite, entière. Mâchoires cachées.

Corps un peu court, très-convexe. Corcelet non bordé, concave antérieurement, recevant la tête.

Antennæ fractæ, breves; clavd parvd, pectinatâ. Labrum conspicuum. Mandibulæ arcuatæ, acutæ. Labium parvum, integrum. Maxillæ obtectæ.

Corpus breviusculum, valdè convexum. Thorax nmarginatus; margine antico concavo caput exciiente.

OBSERVATIONS.

L'œsale avoisine plus le sinodendre, par ses rapports, que s lucanes; il est néanmoins distinct du sinodendre, ayant

labre apparent et extérieur; les mandibules avancées, soique petites; les mâchoires cachées derrière le menton. a tête de cet insecte est profondément enfoncée dans l'chancrure du bord antérieur du corcelet.

ESPEC E.

OEsale scarabéoïde. *OEsalus scarabæoides.*


OEsalus scarabæoides. Fab. el. 2. p. 254. Latr. gén. 2. p. 133.

Panz. fasc. 40. t. 15. mas. et 16. femina.

Habite en Allemagne. Il est brun, très-pointillé; et a des lignes écaillenses sur les élytres.

LAMPRI ME. (Lamprima.)

Antennes condées, à massue de trois lames. Labre



...the following ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...



...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...











BRAND
GEOL


Standard University Libraries
3 6105 010 926 918

NON-CIRCULATING
This volume is for in-
only. It may not be c

Return this book on or before date

--





Standard University Libraries
3 6105 010 926 918

This volume is for
only. It may not

Return this book on or before

